

**Prospecto: información para el paciente**  
**Carbetocina GP-Pharm 100 microgramos solución inyectable en jeringa precargada**  
Carbetocina

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, matrona o enfermero.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, matrona o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Carbetocina GP-Pharm y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de que le administren Carbetocina GP-Pharm
3. Cómo se administra Carbetocina GP-Pharm
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Carbetocina GP-Pharm
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Carbetocina GP-Pharm y para qué se utiliza**

El principio activo de Carbetocina GP-Pharm es la carbetocina. Es similar a una sustancia llamada oxitocina, que es producida naturalmente por el cuerpo para contraer el útero durante el parto.

Carbetocina GP-Pharm se utiliza en el tratamiento de mujeres que acaban de tener un niño.

En algunas mujeres, después del parto el útero (la matriz) no se contrae suficientemente rápido. Esto hace más probable que sangren más de lo normal. Carbetocina GP-Pharm hace contraer el útero y así reduce el riesgo de sangrado.

#### **2. Qué necesita saber antes de que le administren Carbetocina GP-Pharm**

**No se debe utilizar Carbetocina GP-Pharm hasta que el niño haya sido extraído.**

Antes de usar Carbetocina GP-Pharm, su médico debe conocer las enfermedades que usted pueda tener. Debe decir a su médico cualquier síntoma nuevo que desarrolle mientras está siendo tratada con Carbetocina GP-Pharm.

#### **No use Carbetocina GP-Pharm**

- Si está embarazada
- Si está de parto y el niño aún no ha sido extraído
- Para inducir el parto
- Si es **alérgica** a la carbetocina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si es **alérgica** a la oxitocina (bien si se lo han administrado por goteo o bien por inyección durante o después del parto)
- Si tiene cualquier enfermedad de **riñón** o **hígado**.
- Si tiene cualquier enfermedad coronaria grave.

- Si tiene **epilepsia (episodios repetitivos de convulsiones, pérdida de conciencia)**.

Si sufre alguno de estos síntomas, consúltelo con su médico, matrona o enfermera.

### **Advertencias y precauciones**

Informe a su médico, matrona o enfermera antes de recibir Carbetocina GP-Pharm:

- Si tiene **migrañas (dolor de cabeza repetitivo)**.
- Si tiene **asma** (trastorno respiratorio con episodios repetitivos de dificultad respiratoria, pitos y tos).
- Si usted tiene preeclampsia (presión arterial elevada en el embarazo) o eclampsia (toxemia gravídica-agitación intensa, movimientos involuntarios).
- Si tiene problemas con su **corazón** o su **circulación** (tal como **tensión arterial elevada**).
- Si tiene cualquier otra enfermedad.

Si sufre alguno de estos síntomas, consúltelo con su médico, matrona o enfermera.

Carbetocina GP-Pharm puede causar una acumulación de agua en el cuerpo que puede provocar somnolencia, apatía y dolor de cabeza.

### **Niños y adolescentes**

No relevante en niños menores de 12 años.

La experiencia con adolescentes es limitada.

### **Uso de Carbetocina GP-Pharm con otros medicamentos**

Informe a su médico, matrona o enfermera si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

### **Embarazo y lactancia**

Carbetocina GP-Pharm no debe utilizarse durante el embarazo y el parto hasta que el niño haya sido extraído.

Se ha visto que pequeñas cantidades de carbetocina pasan de la sangre de madres en periodo de lactancia a la leche materna, pero se asume que se degrada en el intestino del lactante.

La lactancia materna no necesita ser restringida después del uso de Carbetocina GP-Pharm.

### **Carbetocina GP-Pharm contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por ml, es decir, es esencialmente “exento de sodio”.

## **3. Cómo se administra Carbetocina GP-Pharm**

**Carbetocina GP-Pharm se administra mediante una inyección** en una de sus venas o en uno de sus músculos, inmediatamente después de la extracción de su bebé. La dosis es una jeringa precargada (100 microgramos).

**Si se le administra más Carbetocina GP-Pharm de la que debiera**

Si se le ha administrado accidentalmente más Carbetocina GP-Pharm de la que debiera, puede sufrir hiperactividad uterina con contracciones fuertes que puede llevar a la rotura uterina o hemorragia postparto. Puede también sufrir somnolencia, apatía y dolor de cabeza, causada por la acumulación de líquidos. Se deberá tratar con otra medicación y posible cirugía.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

#### **Cuando se administra Carbetocina GP-Pharm en una de sus venas después de una cesárea**

Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 mujeres:

- Náuseas
- Dolor de estómago
- Prurito (picor)
- Rubor (piel roja)
- Sensación de calor
- Tensión arterial baja
- Dolor de cabeza
- Temblores

Frecuentes: hasta 1 de cada 10 mujeres:

- Vómitos
- Vértigo
- Dolor de espalda o pecho
- Sabor metálico en la boca
- Anemia (disminución de los glóbulos rojos)
- Disnea (dificultad respiratoria)
- Escalofríos
- Dolor general

No conocida: la frecuencia no puede estimarse en base a los datos disponibles

- Aceleración de los latidos del corazón

Efectos secundarios observados con productos similares que podrían esperarse con la carbetocina: Latidos cardíacos lentos, latidos cardíacos irregulares, dolor de pecho, desmayos o palpitaciones que puede significar que el corazón no está latiendo correctamente.

Ocasionalmente algunas mujeres podrían experimentar sudoración.

#### **Cuando se administra Carbetocina GP-Pharm en uno de sus músculos después del parto vaginal**

Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 mujeres

- Náuseas
- Dolor de estómago
- Vómitos
- Presión arterial baja
- Anemia
- Dolores de cabeza
- Mareos

- Latidos rápidos
- Dolor de espalda o pecho
- Debilidad muscular
- Escalofríos
- Fiebre
- Dolor general

Raras: pueden afectar a menos de 1 de cada 1,000 mujeres

- Rubor (piel roja)
- Disnea
- Temblores
- Dificultad para orinar

Efectos secundarios observados en productos similares a carbetocina:

Latidos cardíacos lentos, latidos cardíacos irregulares, dolor de pecho, desmayos o palpitaciones, que puede significar que el corazón no está latiendo correctamente.

### **Comunicación de efectos adversos:**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, matrona o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Carbetocina GP-Pharm**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Las jeringas precargadas de Carbetocina GP-Pharm se conservan en el embalaje original para protegerlas de la luz. Conservar en nevera (2°C – 8°C).

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Carbetocina GP-Pharm**

- El principio activo es la carbetocina. Cada jeringa precargada contiene un mililitro con 100 microgramos de carbetocina.
- Los demás componentes son: cloruro de sodio, ácido acético glacial para ajuste de pH, agua para preparaciones inyectables.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Carbetocina GP-Pharm es una solución clara e incolora, preparada para inyección intravenosa o intramuscular y proporcionada en envases que contienen cinco jeringas precargadas de 1 ml.

Carbetocina GP-Pharm debe ser usada sólo en unidades de obstetricia especializadas bien equipadas.

**Titular de la Autorización de Comercialización y responsables de la fabricación**  
**GP Pharm, S.A.**

**Pol. Ind. Els Vinyets – Els Fogars Sector 2. Carretera Comarcal C-244, Km. 22**  
**08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)**  
**España**

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

**España: Carbetocina GP-Pharm 100 microgramos solución inyectable en jeringa precargada**  
**Alemania : Carbetocin Aguettant 100 Mikrogramm/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze**  
**Austria : Carbetocin Aguettant 100 Mikrogramm/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze**  
**Italia : Carbetocina Aguettant**  
**Francia: Carbetocine Aguettant 100 microgrammes/ml, solution injectable en seringue pré-remplie**

**Fecha de la última revisión de este prospecto: septiembre 2020.**

**Otras fuentes de información**

**La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios <http://www.aemps.gob.es/>.**