

## Prospecto: información para el usuario

### Icatibanto GP-Pharm 30 mg solución inyectable en jeringa precargada EFG

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Icatibanto GP-Pharm y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Icatibanto GP-Pharm
3. Cómo usar Icatibanto GP-Pharm
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Icatibanto GP-Pharm
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Icatibanto GP-Pharm y para qué se utiliza

Este medicamento contiene el principio activo icatibanto.

Este medicamento se utiliza para el tratamiento de los síntomas del angioedema hereditario (AEH) en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años.

En el AEH aumentan las concentraciones de una sustancia presente en la sangre llamada bradicinina, lo que produce síntomas como hinchazón, dolor, náuseas y diarrea.

Este medicamento bloquea la actividad de la bradicinina y, por tanto, frena la progresión de los síntomas de una crisis de AEH.

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Icatibanto GP-Pharm

##### No use Icatibanto GP-Pharm

- si es alérgico a icatibanto o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

##### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a usar este medicamento

- Si sufre angina de pecho (disminución del flujo de sangre que llega al corazón).
- Si ha sufrido recientemente un ictus.

Los efectos adversos relacionados con este medicamento son similares a los síntomas de su propia enfermedad. Consulte inmediatamente con su médico si nota que los síntomas de la crisis se agravan después de que le administren este medicamento.

Además:

- Usted o su cuidador deben aprender la técnica de administración de inyecciones subcutáneas (bajo la piel) antes de autoadministrarse o de que su cuidador le administre icatibanto.
- Si inmediatamente después de autoadministrarse este medicamento o de que su cuidador le administre este medicamento experimenta una crisis laríngea (obstrucción de la vía aérea superior), deberá procurar atención médica en una institución médica.
- Si sus síntomas no se resuelven tras una inyección autoadministrada o administrada por su cuidador de este medicamento, debe consultar al médico sobre la administración de inyecciones adicionales de icatibanto. En pacientes adultos, se pueden administrar hasta 2 inyecciones adicionales en el plazo de 24 horas.

### **Niños y adolescentes**

No se recomienda el uso de este medicamento en niños menores de 2 años o que pesen menos de 12 kg porque no se ha estudiado en estos pacientes.

### **Otros medicamentos y Icatibanto GP-Pharm**

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

No se conocen interacciones de icatibanto con otros medicamentos. Si está tomando algún medicamento que sea un inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) (por ejemplo: captopril, enalapril, ramipril, quinapril, lisinopril) para reducir la presión arterial o por cualquier otro motivo, informe a su médico antes de utilizar este medicamento.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de empezar a usar este medicamento.

Si se encuentra en período de lactancia, no debe amamantar a su hijo durante las 12 horas siguientes a la última administración de icatibanto.

### **Conducción y uso de máquinas**

No conduzca ni maneje máquinas si se siente cansado o mareado como consecuencia de la crisis de AEH o después de utilizar este medicamento.

### **Icatibanto GP-Pharm contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por jeringa; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

### 3. Cómo usar Icatibanto GP-Pharm

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Si nunca se le ha administrado este medicamento previamente, la primera dosis de icatibanto siempre deberá ser inyectada por personal médico o de enfermería. El médico le dará el alta cuando considere seguro que se marche a casa. Tras analizarlo con su médico o enfermero, y tras aprender la técnica para inyecciones subcutáneas (bajo la piel), usted mismo o la persona que lo atiende pueden administrarle este medicamento si tiene una crisis de AEH. Es importante inyectar Icatibanto GP-Pharm por vía subcutánea (bajo la piel) tan pronto como advierta una crisis de angioedema. El personal sanitario le enseñara a usted y a quien lo atiende el modo de inyectar Icatibanto GP-Pharm de forma segura, siguiendo las instrucciones del prospecto.

#### ¿Cuándo y con qué frecuencia debe usar Icatibanto GP-Pharm?

Su médico ha determinado la dosis exacta de Icatibanto GP-Pharm y le dirá con qué frecuencia debe utilizarse.

#### Adultos

- La dosis recomendada de este medicamento es de una inyección (3 ml, 30 mg) administrada por vía subcutánea (debajo de la piel) tan pronto como usted advierta la crisis de angioedema (por ejemplo, con aumento de la hinchazón cutánea, sobre todo en la cara y el cuello, o aumento del dolor abdominal).
- Si no nota una mejoría de los síntomas, después de seis horas, debe procurar asesoramiento médico sobre la administración de inyecciones adicionales de Icatibanto GP-Pharm. En adultos, se pueden administrar hasta 2 inyecciones adicionales en el plazo de 24 horas.
- **No debe recibir más de 3 inyecciones en un período de 24 horas y si necesita más de 8 inyecciones en un mes, debe procurar asesoramiento médico.**

#### Niños y adolescentes de 2 a 17 años

- La dosis recomendada de este medicamento es una inyección de 1 ml hasta un máximo de 3 ml en función del peso corporal por vía subcutánea (bajo la piel) tan pronto como presente síntomas de una crisis de angioedema (por ejemplo, un aumento de la hinchazón cutánea, sobre todo en la cara y el cuello, o aumento del dolor abdominal).
- Consulte la sección de las instrucciones de uso para ver la dosis que debe inyectar.
- Si no está seguro sobre la dosis que debe inyectar, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- **Si sus síntomas empeoran o no mejoran, debe procurar asesoramiento médico inmediatamente.**

#### ¿Cómo debe administrarse Icatibanto GP-Pharm?

Este medicamento se administra mediante inyección subcutánea (debajo de la piel). Cada jeringa se debe utilizar solo una vez.

Este medicamento se inyecta con una aguja corta en el tejido graso situado debajo de la piel del abdomen (tripa).

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

**Las siguientes instrucciones paso a paso están previstas para:**


- **autoadministración (adultos)**
- **administración por parte de un cuidador o un profesional sanitario para adultos, adolescentes o niños mayores de 2 años (que pesen 12 kg como mínimo).**

Las instrucciones incluyen los siguientes pasos principales:

- 1) Información general
- 2a) Preparación de la jeringa para niños y adolescentes (2-17 años) que pesen 65 kg o menos
- 2b) Preparación de la jeringa y la aguja para la inyección (todos los pacientes)
- 3) Preparación del lugar de la inyección
- 4) Inyección de la solución
- 5) Desecho de los materiales de la inyección

**Instrucciones paso a paso para la inyección**

<b>1) Información general</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el área (superficie) de trabajo que se vaya a utilizar antes de empezar el proceso.</li> <li>• Lávese las manos con agua y jabón.</li> <li>• Retire la jeringa precargada de la bandeja.</li> <li>• Desenrosque y retire la tapa del extremo de la jeringa precargada.</li> <li>• Deje la jeringa precargada una vez desenroscada la tapa</li> </ul>
<b>2a) Preparación de la jeringa para niños y adolescentes (2-17 años) que pesen 65 kg o menos:</b>
<p style="text-align: center;"><b>Información importante para profesionales sanitarios y cuidadores:</b></p> <p>Cuando la dosis es inferior a 30 mg (3 ml), se necesita el siguiente equipo para extraer la dosis adecuada (ver información a continuación):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jeringa precargada de Icatibanto GP-Pharm (con solución de icatibanto)</li> <li>b. Conector (adaptador)</li> <li>c. Jeringa graduada de 3 ml</li> </ol> <div style="text-align: center;"> <p>The diagram shows two components. Component 'a' is a pre-filled syringe with a plunger and a needle. Component 'b' is a connector or adapter with a central opening and two side ports.</p> </div>



El volumen de inyección requerido en ml se debe preparar en una jeringa graduada de 3 ml vacía (ver tabla a continuación).

**TABLA 1: Pauta posológica para niños y adolescentes**

Peso corporal	Volumen de inyección
12 kg a 25 kg	1,0 ml
26 kg a 40 kg	1,5 ml
41 kg a 50 kg	2,0 ml
51 kg a 65 kg	2,5 ml

Los pacientes que pesen **más de 65 kg** usarán todo el contenido de la jeringa precargada (3 ml).




**Si no está seguro sobre el volumen de solución que debe extraer, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.**

- 1) Retire las tapas en cada extremo del conector.




**Evite tocar los extremos del conector y las puntas de las jeringas, para prevenir la contaminación**

- 2) Enrosque el conector sobre la jeringa precargada.
- 3) Acople la jeringa graduada al otro extremo del conector asegurándose de que ambas conexiones encajen de forma segura.




**Transferir la solución de icatibanto a la jeringa graduada:**

- 1) Para iniciar la transferencia de la solución de icatibanto, empuje el émbolo de la jeringa precargada (en el extremo izquierdo de la imagen que aparece a continuación).



- 2) Si la solución de icatibanto no empieza a transferirse a la jeringa graduada, tire un poco del émbolo de la jeringa graduada hasta que la solución de icatibanto empiece a fluir dentro de la jeringa graduada (ver la imagen a continuación).



3) Siga empujando el émbolo de la jeringa precargada hasta que el volumen de inyección requerido (dosis) se transfiera a la jeringa graduada. Consulte en la tabla 1 para obtener información sobre la dosis.

**Si hay aire en la jeringa graduada:**

- Gire las jeringas conectadas de forma que la jeringa precargada esté arriba (ver la imagen a continuación).




- Empuje el émbolo de la jeringa graduada para que el aire se transfiera de nuevo a la jeringa precargada (puede que este paso deba repetirse varias veces).
- Extraiga el volumen requerido de solución de icatibanto.

4) Retire la jeringa precargada y el conector de la jeringa graduada.

5) Deseche la jeringa precargada y el conector en el recipiente para objetos punzantes o cortantes.


**2b) Preparación de la jeringa y la aguja para la inyección:  
Todos los pacientes (adultos, adolescentes y niños)**

- Retire del blíster la aguja con bolsa de plástico.
- Abra la bolsa de plástico que contiene la aguja.




- Sostenga firmemente la jeringa. Conecte con cuidado la aguja a la jeringa precargada con la solución incolora.
- Atornille la jeringa precargada a la aguja, todavía fija en la tapa.
- Tire de la jeringa para retirar la aguja de la tapa. No tire del émbolo.
- La jeringa ya está lista para aplicar la inyección.

### 3) Preparación del lugar de la inyección




- Seleccione el lugar para la inyección. El lugar de la inyección debe ser un pliegue del abdomen, a una distancia aproximada de 5-10 cm (2-4 pulgadas) por debajo del ombligo, hacia uno u otro lado. El área debe estar como mínimo a 5 cm (2 pulgadas) de cualquier cicatriz. No escoja un área con hematomas, inflamada o dolorida.
- Limpie el lugar de la inyección frotando con un apósito con alcohol, y déjelo secar.

### 4) Inyección de la solución




- Sostenga la jeringa entre dos dedos, con el pulgar en el extremo del émbolo.
- Verifique que no haya aire en la jeringa, presionando el émbolo hasta que aparezca la primera gota en la punta de la aguja.



- Sostenga la jeringa con la aguja apuntando a la piel en un ángulo entre 45 a 90 grados.
- Manteniendo la jeringa en una mano, con la otra tome suavemente un pliegue de piel entre el pulgar y los dedos, en el lugar previamente desinfectado.
- Sostenga el pliegue de piel, acerque la jeringa e inserte rápidamente la aguja en el pliegue.
- Presione lentamente el émbolo con el pulso firme, hasta que todo el fluido se haya inyectado en la piel y no quede líquido en la jeringa
- Presione lentamente, de modo que el proceso demore aproximadamente 30 segundos.
- Suelte el pliegue de piel y retire la aguja con suavidad

### 5) Desecho de los materiales de la inyección



- Tire la jeringa, la aguja y la tapa de ésta en el recipiente para elementos cortantes destinado al desecho de residuos que pueden lesionar a terceros si no se manipulan correctamente.



#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Casi todos los pacientes que reciben icatibanto notan una reacción en el lugar de la inyección (como irritación cutánea, inflamación, dolor, prurito, enrojecimiento de la piel y ardor). Estos efectos suelen ser leves y mejoran sin necesidad de ningún tratamiento adicional.

##### Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

Reacciones adicionales en el lugar de la inyección (sensación de presión, moratón, disminución de la sensibilidad y/o entumecimiento, aumento de la erupción cutánea con picazón y calor).

##### Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

Nauseas

Dolor de cabeza

Mareo

Fiebre

Picor

Erupción

Enrojecimiento de la piel

Pruebas de función hepáticas anormales

##### Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Ronchas (urticaria)

Informe a su médico inmediatamente si observa que los síntomas de la crisis empeoran después de haber recibido Icatibanto GP-Pharm.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### **5. Conservación de Icatibanto GP-Pharm**


Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación.

Conservar en la caja original para protegerlo de la luz.

No utilice este medicamento si observa que el envase de la jeringa o de la aguja está dañado o si observa signos visibles de deterioro; por ejemplo, si la solución está turbia, si contiene partículas flotantes o si ha cambiado el color de la solución.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Icatibanto GP-Pharm

El principio activo es icatibanto. Cada jeringa precargada contiene 30 mg de icatibanto (en forma de acetato). Los demás componentes son cloruro sódico, ácido acético glacial, hidróxido sódico y agua para preparaciones inyectables.

### Aspecto de Icatibanto GP-Pharm y contenido del envase

Icatibanto GP-Pharm se presenta como solución inyectable transparente e incolora en una jeringa de vidrio precargada de 3 ml. El envase contiene una aguja hipodérmica.

Icatibanto GP-Pharm está disponible en envase unitario de una jeringa precargada con una aguja o en envase múltiple de tres jeringas precargadas con tres agujas.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

GP-PHARM, S.A.  
Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, Sector 2,  
Carretera Comarcal C-244, Km 22,  
08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona),  
España

### Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:

Dinamarca: Icatibant GP Pharm 30 mg Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  
Francia: ICATIBANT GP PHARM 30 mg, solution injectable en seringue pré-remplie  
Alemania: Icatibant GP Pharm 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze  
Italia: Icatibant GP Pharm  
España: Icatibanto GP-Pharm 30 mg solución inyectable en jeringa precargada EFG

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** abril 2022.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>)