

Prospecto: información para el usuario

Linitul Pomada

Bálsamo del Perú / Aceite de ricino

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después 15 días.

Contenido del prospecto

1. Qué es Linitul Pomada y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Linitul Pomada
3. Cómo usar Linitul Pomada
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Linitul Pomada
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Linitul Pomada y para qué se utiliza

Pertenece a un grupo de medicamentos que se utilizan como cicatrizantes, y actúa estimulando el flujo de sangre y reduciendo la desecación en la zona afectada.

Linitul Pomada está indicado para promover la cicatrización de heridas, úlceras por presión (de decúbito) y úlceras varicosas.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Linitul Pomada

No use Linitul

- Si es alérgico a los principios activos o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si sufre dermatosis inflamatoria (inflamación superficial de la piel, con rojez, humedad, retención de líquido, escamas, picor, etc.).
- Sobre coágulos de sangre arteriales (producido en una arteria) de reciente aparición.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Linitul Pomada.

- No debe utilizar este medicamento sobre piel con acné o grasa.
- No aplicar en los ojos.
- Debe consultar al médico si padece alguna enfermedad con falta de hemoglobina (como en algunas anemias) o zinc y en caso de retraso en la cicatrización de su lesión.

Niños y adolescentes

Linitul Pomada no debe aplicarse en niños porque no se tienen datos sobre su uso en ellos.

Uso de Linitul con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando otros medicamentos.

No se han realizado estudios de interacciones.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período de lactancia o cree que podría estar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Antes de utilizar Linitul Pomada durante el embarazo o la lactancia se deben tener en cuenta los beneficios potenciales frente a los posibles riesgos.

Conducción y uso de máquinas

Linitul Pomada no afecta a su capacidad para conducir o manejar maquinaria.

Linitul Pomada contiene bálsamo del Perú

Este medicamento puede producir reacciones en la piel porque contiene bálsamo del Perú.

El bálsamo del Perú puede presentar en las personas sensibles, reacciones cruzadas con el bálsamo de Tolú y con algunos aceites esenciales utilizados como aromatizantes.

3. Cómo usar Linitul Pomada

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

-Adultos:

Extender una delgada capa de pomada sobre la zona afectada al menos 2 veces al día, pudiendo repetirse cuando sea necesario.

Uso cutáneo (sobre la piel).

Tras la aplicación de la pomada se puede cubrir el área con vendaje protector. Se debe lavar la zona suavemente con solución limpiadora (como suero salino) cuando se renueve la pomada. Repetir la operación cuando sea necesario.

Uso en niños y adolescentes

No se dispone de datos sobre su uso en niños.

Si usa más Linitul Pomada de lo que debe

Es improbable que se produzca una sobredosis con el uso normal.

Sin embargo en caso de ingestión accidental puede producir náuseas, vómitos, cólicos y fuertes diarreas.

En caso de ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda a un centro médico, o llame al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si olvidó usar Linitul Pomada

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Linitul puede producir efectos adversos aunque no todas las personas los sufran.

Con frecuencia no conocida exactamente se podrían producir: reacciones alérgicas como dermatitis de contacto y sensación de escozor en el lugar de aplicación.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

5. Conservación de Linitul Pomada

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Linitul Pomada

- Los principios activos: Bálsamo del Perú y Aceite de ricino. Cada gramo de pomada contiene la fracción soluble de 20 mg de bálsamo del Perú y 150 mg de aceite de ricino.
- Los demás componentes son: vaselina filante, vaselina líquida, dimeticona, cera de abejas y parafina sólida.

Aspecto del producto y contenido del envase

Linitul Pomada es una pomada blanca translúcida.

Se presenta en un tubo de aluminio que contiene 30 g de pomada.

- Otras presentaciones de Linitul:

Linitul Apósito impregnado, 10 sobres unidos con apósitos de 5,5x8 cm

Linitul Apósito impregnado, 20 apósitos de 8,5 x 10 cm

Linitul Apósito impregnado, 20 sobres unidos con apósitos de 9x15 cm

Linitul Apósito impregnado, 20 sobres unidos con apósitos de 15x25 cm.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular

Alfasigma España, S.L.

Avda. Diagonal, 490

08006 Barcelona

Responsable de la fabricación

Alfasigma España, S.L.

Naus 301-304 Polig. Ind. Baix Ebre.

Campredo, Tortosa (Tarragona) España

Fecha de la última revisión de este prospecto: Febrero 2017

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.