

## Prospecto: información para el usuario

### Morfina Kalceks 10 mg/ml solución inyectable EFG

Hidrocloruro de morfina

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### Contenido del prospecto

1. Qué es Morfina Kalceks y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Morfina Kalceks
3. Cómo usar Morfina Kalceks
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Morfina Kalceks
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Morfina Kalceks y para qué se utiliza

Morfina Kalceks contiene el principio activo morfina, que pertenece a un grupo de medicamentos denominados *alcaloides naturales del opio*. Este medicamento se emplea en el alivio del dolor intenso cuando otros analgésicos no poseen el efecto suficiente.

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Morfina Kalceks

##### No use Morfina Kalceks:

- si es alérgico al hidrocloruro de morfina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si padece trastornos con presencia de gran cantidad de mucosidad en las vías respiratorias.
- si padece insuficiencia respiratoria.
- si padece una enfermedad aguda del hígado.
- si padece trastornos de ansiedad durante el efecto del alcohol o los somníferos.

#### Advertencias y precauciones

Existe el riesgo de hacerse adicto a Morfina Kalceks.

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Morfina Kalceks, si:

- Es adicto a otros analgésicos (opioides).
- Está recibiendo diálisis peritoneal.
- Padece asma.
- Padece espasmos de las vías respiratorias.
- Tiene lesiones craneales.
- Tiene la tensión arterial baja y un volumen de sangre reducido.
- Padece insuficiencia tiroidea.
- Padece insuficiencia hepática o renal.

- Padece una enfermedad inflamatoria intestinal.
- Padece una inflamación del páncreas.
- Padece espasmos de los conductos biliares o las vías urinarias.
- Padece un aumento del tamaño de la próstata
- Padece una debilidad muscular denominada *miastenia grave*.
- Está en tratamiento simultáneo con inhibidores de la MAO (un medicamento para tratar la depresión).

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas mientras usa Morfina Kalceks:

- Aumento de la sensibilidad al dolor a pesar de tomar dosis cada vez mayores (hiperalgesia). Su médico decidirá si necesita un ajuste de dosis o cambiar a un analgésico potente (ver sección 2).
- Debilidad, cansancio, apetito disminuido, náuseas, vómitos o presión arterial baja. Esto podría indicar que las glándulas suprarrenales producen una cantidad insuficiente de la hormona cortisol y es posible que tenga que tomar suplementos hormonales.
- Pérdida de la libido, impotencia, cese de la menstruación. Esto se podría deber a una menor producción de hormonas sexuales.
- Si tiene antecedentes de alcoholismo o drogadicción. Informe también a su médico si cree que está empezando a depender de Morfina Kalceks mientras está usándolo. Es posible que haya empezado a pensar demasiado sobre cuándo puede tomar la siguiente dosis, aunque no la necesite para el dolor.
- Síntomas de abstinencia o dependencia. Los síntomas de abstinencia más frecuentes se describen en la sección 3. Si aparecen, puede que su médico cambie de medicamento o modifique el intervalo entre dosis.

En el tratamiento de las personas de edad avanzada se recomienda una dosis menor de Morfina Kalceks.

Este medicamento no se debe emplear en el tratamiento del dolor de origen desconocido ni en el dolor asociado a trastornos mentales.

Este medicamento no se debe administrar en monoterapia durante los ataques de los cólicos biliares o renales, ya que podrían aumentar los espasmos. En estos casos, Morfina Kalceks se debe administrar en combinación con un medicamento que alivie los espasmos (espasmolítico).

Los efectos de este medicamento pueden potenciarse después de una encefalitis (inflamación del cerebro).

### **Uso de Morfina Kalceks con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Esto es especialmente importante si está tomando:

- Rifampicina, por ejemplo, para tratar la tuberculosis.
- Algunos medicamentos utilizados en el tratamiento de coágulos sanguíneos (por ejemplo, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) pueden tener un efecto retardado y reducido cuando se toman junto con morfina.
- El uso concomitante de Morfina Kalceks y sedantes como benzodiazepinas u otros medicamentos relacionados aumenta el riesgo de somnolencia, dificultad para respirar (depresión respiratoria), coma y puede ser potencialmente mortal. Por este motivo, solo se debe considerar el uso concomitante cuando no sean posibles otras opciones de tratamiento. Sin embargo, si su médico le prescribe Morfina Kalceks junto con medicamentos sedantes, deberá limitar la dosis y la duración del tratamiento concomitante. Informe a su médico de todos los medicamentos sedantes que esté

tomando y siga de forma estricta las recomendaciones de su médico acerca de la dosis. Puede ser útil informar a los amigos o familiares para que reconozcan los signos y síntomas indicados anteriormente. Póngase en contacto con su médico si tiene estos síntomas.

Si se toma Morfina Kalceks de forma simultánea con otros medicamentos, su efecto se puede ver afectado.

*Combinaciones que deben evitarse con Morfina Kalceks:*

- Tranquilizantes y somníferos que contengan barbitúricos (metohexital, pentotal, fenobarbital).
- Medicamentos para tratar la depresión o la enfermedad de Parkinson (inhibidores de la MAO) (moclobemida, selegilina).

Estos medicamentos pueden disminuir la función respiratoria si se emplean en combinación con Morfina Kalceks.

*Combinaciones que podrían precisar un ajuste de la dosis:*

- Medicamentos para tratar la epilepsia (gabapentina).
- Medicamentos para tratar la depresión (clomipramina, amitriptilina, nortriptilina).
- Algunos otros medicamentos para aliviar el dolor (buprenorfina, nalbufina, pentazocina).

*Otros medicamentos que pueden afectar a o verse afectados por Morfina Kalceks:*

- Antiespasmódicos (baclofeno).
- Tranquilizantes que contienen benzodiazepinas (nitrazepam, flunitrazepam, triazolam, midazolam).
- Tranquilizantes que reducen el picor (hidroxicina).
- Medicamentos que estimulan el sistema nervioso central (metilfenidato).
- Medicamentos para tratar hemorragias en las membranas cerebrales (nimodipina).
- Medicamentos para tratar la infección por el VIH (ritonavir).

### **Toma de Morfina Kalceks con alcohol**

Debe evitarse la combinación con alcohol, ya que se puede deteriorar la función respiratoria.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

#### *Fertilidad*

En los estudios realizados en animales, este medicamento mostró efectos adversos en la fertilidad en animales y podría dañar al feto en desarrollo. Por tanto, las mujeres y los hombres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces. Hable sobre este asunto con su médico.

#### *Embarazo*

Si se utiliza Morfina Kalceks de forma prolongada durante el embarazo, existe el riesgo de que el recién nacido presente síntomas de abstinencia, que deben ser tratados por un médico. El empleo de morfina durante el parto podría provocar una insuficiencia respiratoria al recién nacido.

#### *Lactancia*

La morfina se excreta en la leche materna. Por tanto, Morfina Kalceks no se debe usar durante la lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

No debe conducir ni usar máquinas mientras esté recibiendo Morfina Kalceks. El medicamento puede afectar a su capacidad de reacción.

### **Morfina Kalceks contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por ml de solución; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

### **3. Cómo usar Morfina Kalceks**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis es individual y la determinará su médico. Depende de su edad, peso, intensidad del dolor y los medicamentos que haya tomado y los dolores que haya experimentado anteriormente.

#### **Pacientes de edad avanzada**

Se recetará una dosis más baja.

#### **Insuficiencia hepática y renal**

Se recetará una dosis más baja.

En el caso de pacientes con asma bronquial, obstrucción de las vías respiratorias, traumatismos craneales, diálisis peritoneal, hipotensión asociada a hipovolemia, hipotiroidismo, enteropatías inflamatorias, pancreatitis o espasmos de los conductos biliares o uretrales, es posible que sea necesario reducir la dosis.

El medicamento se puede administrar por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea.

#### **Si usa más Morfina Kalceks del que debe**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Los signos de sobredosis son pupilas puntiformes, hipotensión, dificultad para respirar que provoque la pérdida del conocimiento o incluso la muerte. Las personas que hayan tomado una sobredosis pueden sufrir neumonía por inhalación del vómito o de partículas extrañas; los síntomas pueden consistir en falta de aire, tos y fiebre. En casos graves se pueden producir trastornos circulatorios y coma.

#### **Si olvidó usar Morfina Kalceks**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **Si interrumpe el tratamiento con Morfina Kalceks**

Si deja de usar Morfina Kalceks bruscamente o si usa otros analgésicos determinados, pueden producirse síntomas de abstinencia.

No interrumpa el tratamiento con Morfina Kalceks a menos que lo apruebe su médico. Si desea interrumpir el tratamiento con Morfina Kalceks, pregunte a su médico cómo reducir de manera paulatina la dosis para evitar síntomas de abstinencia. Los síntomas de abstinencia pueden ser dolores generalizados, temblores, diarrea, dolor de estómago, náuseas, síntomas de tipo gripal, palpitaciones y dilatación de las pupilas. Los síntomas psicológicos consisten en una profunda sensación de insatisfacción, ansiedad e irritabilidad.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

#### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

La insuficiencia respiratoria es un efecto adverso grave y poco frecuente de la morfina, que puede afectar hasta 1 de cada 100 personas. Si tiene problemas respiratorios, póngase en contacto con un médico de inmediato para recibir tratamiento para la insuficiencia respiratoria.

Si sufre una reacción alérgica grave que causa dificultad para respirar o mareo, consulte a un médico de **inmediato**.

*Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):* somnolencia, mareo, pupilas estrechadas, náuseas, vómitos, estreñimiento, dificultad para orinar, aumento de la liberación de la ADHD (una hormona).

*Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):* estado de ánimo depresivo, confusión, espasmos en las vías respiratorias, espasmos en las vías urinarias o los conductos biliares, picor, sensación de mareo.

*Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):* palpitaciones, latido rápido del corazón (taquicardia), desmayo, mareo al levantarse rápido, hipertensión, hipotensión, hinchazón de los pies y las manos.

*Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):* euforia (sensación de felicidad), sueño, alteraciones de la memoria y la concentración, espasmos, boca seca, erupción urticarial, espasmos involuntarios de los músculos (mioclonía), aumento de la sensibilidad al dolor, sudoración, síntomas de abstinencia o dependencia (para consultar los síntomas, ver sección 3: Si interrumpe el tratamiento con Morfina Kalceks).

#### Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### 5. Conservación de Morfina Kalceks

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesite en el punto SIGRE  de la farmacia o en cualquier otro sistema de recogida de residuos de medicamentos. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de

los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Morfina Kalceks

- El principio activo es hidrocloreuro de morfina.  
Morfina Kalceks contiene 10 mg/ml de hidrocloreuro de morfina, lo que equivale a 7,6 mg/ml de morfina.
- Los demás excipientes son cloruro de sodio, ácido clorhídrico concentrado (para ajustar el pH) y agua para preparaciones inyectables.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Ampollas de vidrio incoloro (de tipo I) que contienen 1 ml de solución inyectable transparente, incolora o amarillenta.

Tamaños de envase: 10 ampollas

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

AS KALCEKS  
Krustpils iela 71E,  
Rīga, LV-1057,  
Letonia

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

Kern Pharma, S.L.  
Venus, 72 - Pol. Ind. Colón II  
08228 Terrassa – Barcelona  
España  
Tel: +34 93 700 25 25

### Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:

|                  |   |
|------------------|---|
| Suecia:          | Morfin Kalceks, 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning |
| Países Bajos:    | Morfine Kalceks 10 mg/ml, oplossing voor injectie   |
| Polonia:         | Morphine Kalceks                                    |
| República Checa: | Morphine Kalceks                                    |
| Hungría:         | Morphine Kalceks 10 mg/ml oldatos injekció          |
| Portugal:        | Morfina Kalceks                                     |
| Eslovaquia:      | Morphine Kalceks                                    |
| España:          | Morfina Kalceks 10 mg/ml solución inyectable EFG    |

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** marzo de 2022

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.