

## **Prospecto: información para el paciente**

### **Moviprep Sabor Naranja polvo para solución oral**

Macrogol 3350, Sulfato de sodio anhidro, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Ácido ascórbico y Ascorbato de sodio

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Moviprep Sabor Naranja y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Moviprep Sabor Naranja
3. Cómo tomar Moviprep Sabor Naranja
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Moviprep Sabor Naranja
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Moviprep Sabor Naranja y para qué se utiliza**

Moviprep Sabor Naranja es un laxante con sabor a naranja que se encuentra contenido en cuatro sobres. Hay dos sobres grandes (“sobre A”) y dos sobres pequeños (“sobre B”). Necesita la totalidad de ellos para un tratamiento.

Moviprep Sabor Naranja está indicado en adultos para limpiar el intestino de modo que esté listo para una exploración. Moviprep Sabor Naranja actúa vaciando el contenido de su intestino, de modo que usted debe esperar sentir movimientos de evacuación en el mismo.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Moviprep Sabor Naranja**

##### **No tome Moviprep Sabor Naranja:**

- si usted es alérgico a los principios activos o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6);
- si usted tiene una obstrucción en el intestino (tracto gastrointestinal);
- si usted tiene una perforación en la pared de su tracto gastrointestinal;
- si usted tiene alteraciones del vaciamiento gástrico;
- si usted tiene parálisis del tracto gastrointestinal (a veces ocurre tras una operación en el abdomen);
- si usted sufre de fenilcetonuria. Esto es una incapacidad hereditaria del organismo para el empleo de un aminoácido en particular. Moviprep Sabor Naranja contiene una fuente de fenilalanina;
- si su cuerpo es incapaz de producir suficiente glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa;
- si usted tiene megacolon tóxico (una complicación severa de una colitis aguda).

## **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Moviprep Sabor Naranja. Si usted tiene una salud delicada o una condición médica grave, debe ser consciente de los posibles efectos adversos indicados en la sección 4. Si es su caso, contacte con su médico o farmacéutico.

Usted debería consultar a su médico antes de tomar Moviprep Sabor Naranja si presenta alguna de las siguientes situaciones:

- tendencia a regurgitar las bebidas ingeridas, comida o ácido desde el estómago, o si tiene dificultades para tragar (ver también Toma de Moviprep Sabor Naranja con alimentos y bebidas),
- enfermedad renal,
- fallo cardíaco o enfermedades cardíacas incluyendo hipertensión arterial, latidos cardíacos irregulares o palpitaciones,
- enfermedad tiroidea,
- deshidratación,
- episodios agudos o enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).

Moviprep Sabor Naranja no debería ser administrado a pacientes con alteraciones de la consciencia sin supervisión médica.

Si padece un dolor abdominal o una hemorragia rectal repentinos al tomar Moviprep Sabor Naranja para la preparación intestinal, póngase en contacto con su médico o acuda a un médico de inmediato.

## **Niños y adolescentes**

Moviprep Sabor Naranja no debe ser empleado en niños de edad inferior a 18 años.

## **Toma de Moviprep Sabor Naranja con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico o farmacéutico que está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento.

Si usted está tomando otros medicamentos por vía oral (por ejemplo, anticonceptivos orales), no debe tomarlos desde una hora antes, durante y hasta una hora después de la toma de Moviprep Sabor Naranja ya que éstos pueden ser eliminados del tracto digestivo y no actuar correctamente.

## **Toma de Moviprep Sabor Naranja con alimentos y bebidas**

No tomar ningún alimento sólido desde que comience a tomar Moviprep Sabor Naranja hasta después de la exploración médica.

Si usted necesita espesar líquidos para poder tragarlos de forma segura, Moviprep Sabor Naranja puede neutralizar el efecto del espesante.

Cuando tome Moviprep Sabor Naranja debe seguir ingiriendo líquidos en abundancia. El contenido líquido de Moviprep no reemplaza su ingesta habitual de líquidos.

## **Embarazo, lactancia y fertilidad**

No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de Moviprep Sabor Naranja durante el embarazo o lactancia y sólo deberá ser empleado en caso de que el médico lo considere esencial.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

Moviprep Sabor Naranja no afecta a la capacidad para conducir o uso de máquinas.

### **Moviprep Sabor Naranja contiene sodio, potasio, aspartamo y glucosa**

Este medicamento contiene 8,4 g de sodio (componente principal de la sal de mesa/para cocinar) en cada tratamiento (un tratamiento consiste en dos litros de Moviprep Sabor Naranja). Esto equivale al 420% de la ingesta diaria máxima de sodio recomendada para un adulto. Lo que debe tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas bajas en sal (sodio). Sólo una porción (hasta 2,6 g por tratamiento) del sodio es absorbida.

Este medicamento contiene 1,1 g de potasio por tratamiento (un tratamiento consiste en dos litros de Moviprep Sabor Naranja). Lo que debe tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal o con dietas pobres en potasio.

Este medicamento puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria porque contiene aspartamo que es una fuente de fenilalanina.

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### **3. Cómo tomar Moviprep Sabor Naranja**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de dos litros de solución, la cual se prepara como sigue:

Este envase contiene dos bolsas transparentes con un par de sobres cada una: sobre A y sobre B. Cada par de sobres (A y B) deben ser disueltos en agua para preparar un litro de solución. Este envase contiene por lo tanto cantidad suficiente para preparar dos litros de solución Moviprep Sabor Naranja.

Antes de tomar Moviprep Sabor Naranja, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones. Usted necesita saber:

- Cuándo tomar Moviprep Sabor Naranja.
- Cómo preparar Moviprep Sabor Naranja.
- Cómo beber Moviprep Sabor Naranja.
- Qué debe esperar que ocurra.

### **Cuándo tomar Moviprep Sabor Naranja**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico. En caso de duda, pregunte a su médico. Su tratamiento con Moviprep Sabor Naranja debe haber sido completado antes de que se lleve a cabo el examen.

Este tratamiento se puede tomar ya sea en dosis divididas o en una única dosis, como se describe a continuación:

### **Para procedimientos realizados cuando se le duerme (utilizando anestesia general):**

1. Dosis divididas: un litro de Moviprep Sabor Naranja en la noche anterior y un litro de Moviprep Sabor Naranja temprano en la misma mañana del día del examen. Asegúrese de que el consumo de

Moviprep Sabor Naranja, así como cualquier otro líquido claro, haya terminado al menos dos horas antes del inicio del examen.

2. Dosis única: dos litros de Moviprep Sabor Naranja en la noche anterior al examen o dos litros de Moviprep Sabor Naranja la mañana del examen. Asegúrese de que el consumo de Moviprep Sabor Naranja, así como cualquier otro líquido claro, haya terminado al menos dos horas antes del inicio del examen.


#### **Para procedimientos realizados sin necesidad de dormirle (sin anestesia general):**

1. Dosis divididas: un litro de Moviprep Sabor Naranja en la noche anterior y un litro de Moviprep Sabor Naranja temprano en la misma mañana del día del examen. Asegúrese de que el consumo de Moviprep Sabor Naranja, así como cualquier otro líquido claro, haya terminado al menos una hora antes del inicio del examen.
2. Dosis única: dos litros de Moviprep Sabor Naranja en la noche anterior al examen o dos litros de Moviprep Sabor Naranja la mañana del examen. Asegúrese de que el consumo de Moviprep Sabor Naranja, haya terminado al menos dos horas antes del inicio del examen. Asegúrese que el consumo de cualquier líquido claro haya terminado al menos una hora antes del examen.

**Importante: No tomar ningún alimento sólido desde el comienzo de la toma de Moviprep Sabor Naranja hasta después de la exploración.**

#### **Cómo preparar Moviprep Sabor Naranja**

- Abrir una de las bolsas transparentes y extraer los sobres A y B
- Añadir el contenido de AMBOS, sobre A y sobre B, en una jarra de medición con capacidad de un litro.
- Añadir agua en el recipiente hasta la línea que marca un litro y agitar hasta que todo el polvo se haya disuelto y la solución de Moviprep Sabor Naranja sea clara o ligeramente turbia. Esto puede llevar hasta cinco minutos.



#### **Cómo beber Moviprep Sabor Naranja**

Beba el primer litro de la solución de Moviprep Sabor Naranja a lo largo de una o dos horas. Intente beber un vaso completo cada 10-15 minutos.

Cuando se encuentre listo, prepare y beba el segundo litro de la solución de Moviprep Sabor Naranja, preparado con el contenido de los sobres A y B de la bolsa restante.

Durante el curso de este tratamiento, se recomienda que se beba un litro más de un líquido claro, con objeto de prevenir la sensación de encontrarse sediento y prevenir la deshidratación. Agua, caldo, zumos de frutas (sin pulpa), bebidas suaves, té o café (sin leche) son adecuados. Estas bebidas pueden tomarse hasta dos horas antes del examen bajo anestesia general y hasta una hora antes del examen sin anestesia general.

## **Qué debe esperar usted que ocurra**

Cuando comience a beber la solución de Moviprep Sabor Naranja, es importante que se encuentre cerca de un aseo. En algún momento, comenzará a sentir movimientos intestinales. Esto es completamente normal y ello indica que Moviprep Sabor Naranja está funcionando. Los movimientos de su intestino cesarán enseguida tras haber terminado de beberlo.

Si sigue estas instrucciones, su intestino quedará limpio, y esto ayudará a que tenga una correcta exploración. Debe reservar el tiempo suficiente para llegar a la unidad de colonoscopia desde la última vez que beba.

## **Si usted toma más Moviprep Sabor Naranja del que debe**

Si usted toma más Moviprep Sabor Naranja del que debe, puede padecer diarrea excesiva que puede dar lugar a deshidratación. Tome abundantes líquidos, especialmente zumos de frutas. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

## **Si olvidó tomar Moviprep Sabor Naranja**

Si usted olvida tomar Moviprep Sabor Naranja tome la dosis tan pronto como se dé cuenta de que no la ha tomado. Si han transcurrido varias horas desde que tuviera que haberlo tomado, pida consejo a su médico o farmacéutico. Cuando tome Moviprep Sabor Naranja en dosis divididas es importante que complete la administración de Moviprep Sabor Naranja al menos una hora antes del examen (sin usar anestesia general) o dos horas antes del examen (usando anestesia general). Cuando tome todo el Moviprep Sabor Naranja en la mañana del examen como dosis única es importante que usted complete la administración de Moviprep Sabor Naranja al menos dos horas antes del examen.

Si usted tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos Moviprep Sabor Naranja puede producir efectos adversos aunque no todas las personas los sufran.

Es normal que aparezca diarrea cuando usted toma Moviprep Sabor Naranja.

Deje de tomar y dígame a su doctor inmediatamente si usted tiene cualquiera de los siguientes efectos adversos:

- sarpullido o picazón
- hinchazón de la cara, tobillos u otra parte del cuerpo
- palpitaciones
- cansancio extremo
- dificultad para respirar

Estos son síntomas de una reacción alérgica grave.

Si no tiene movimiento intestinal dentro de las 6 horas tras la toma de Moviprep, detenga el consumo y póngase en contacto con su médico inmediatamente.

Otros efectos adversos incluyen:

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes) son: dolor abdominal, distensión abdominal, cansancio, malestar general, irritación en el ano, náuseas y fiebre.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 pacientes) son: hambre, alteraciones del sueño, mareo, dolor de cabeza, vómitos, indigestión, sed y escalofríos.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 100 pacientes) son: malestar, dificultades para tragar y cambios en las pruebas de función hepática.

Los siguientes efectos adversos han ocurrido alguna vez aunque su frecuencia no es conocida ya que ésta no puede ser estimada con los datos disponibles: flatulencias (gases), incremento temporal de la presión sanguínea, latidos cardíacos irregulares o palpitaciones, deshidratación, arcadas (ganas de vomitar), niveles de sodio sanguíneo muy bajos que pueden causar convulsiones y cambios en los niveles de sales en sangre como disminución del bicarbonato, incremento o disminución del calcio, incremento o disminución del cloruro y disminución del fosfato. Los niveles sanguíneos de potasio y sodio pueden también disminuir.

Estas reacciones normalmente sólo aparecen mientras dura el tratamiento. Si persisten consulte con su médico.

Reacciones alérgicas que pueden causar una erupción cutánea, picazón, enrojecimiento de la piel o urticaria, inflamación de manos, pies o tobillos, dolores de cabeza, palpitaciones y dificultad para respirar.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano. Website: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Moviprep Sabor Naranja**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el estuche después de EXP. Tenga en cuenta que las fechas de caducidad pueden ser diferentes para los distintos sobres. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar Moviprep Sabor Naranja a temperatura ambiente (por debajo de 25 °C).

Después de preparar la solución de Moviprep Sabor Naranja en agua, la solución puede guardarse (manteniéndola cubierta) a temperatura ambiente (por debajo de 25° C). También puede guardarse en nevera (entre 2 y 8° C). No la guarde más de 24 horas.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Moviprep Sabor Naranja

Los principios activos son:

**Sobre A contiene los siguientes principios activos:**

Macrogol (también conocido como polietilenglicol) 3350	100 g
Sulfato de sodio anhidro	7,500 g
Cloruro de sodio	2,691 g
Cloruro de potasio	1,015 g

**Sobre B contiene los siguientes principios activos:**

Ácido ascórbico	4,700 g
Ascorbato de sodio	5,900 g

La concentración de electrolitos cuando ambos sobres se han disuelto en un litro de solución es la siguiente:

Sodio	181,6 mmol/l (de los cuales no más de 56,2 mmol son absorbibles)
Sulfato	52,8 mmol/l
Cloruro	59,8 mmol/l
Potasio	14,2 mmol/l
Ascorbato	56,5 mmol/l

Los demás componentes (excipientes) son:

Aroma de naranja (sustancias y preparados aromatizantes naturales, maltodextrina, dextrosa), aspartamo (E951) y acesulfamo de potasio (E950) como edulcorantes. Para mayor información consulte la sección 2.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Este envase contiene dos bolsas transparentes con un par de sobres cada una: sobre A y sobre B. Cada par de sobres (A y B) debe disolverse en un litro de agua.

Moviprep Sabor Naranja polvo para solución oral se encuentra disponible en estuches de 1, 10, 40, 80, 160 y 320 tratamientos. Envase hospitalario de 40 tratamientos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

#### Titular de la autorización de comercialización:

Norgine BV  
Antonio Vivaldistraat 150  
1083 HP Ámsterdam  
Países Bajos

#### Responsable de la fabricación:

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Reino Unido.

o

SOPHARTEX, 21 rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Francia.

o

Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Ámsterdam, Países Bajos.

**Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:**

Norgine de España, S.L.U.  
C/ Julián Camarillo nº 21  
28037, Madrid  
España

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido (Irlanda del Norte) con los siguientes nombres:**

<u>País</u>	<u>Nombre</u>
Alemania	MOVIPREP Orange
Austria	MOVIPREP Orange
Bélgica	MOVIPREP Sinaas/ Orange
Dinamarca	MOVIPREP Appelsin
España	MOVIPREP Sabor Naranja
Finlandia	MOVIPREP Appelsiini
Francia	MOVIPREP Orange
Países bajos	MOVIPREP Orange
Irlanda	MOVIPREP Orange
Italia	MOVIPREP Arancio
Luxemburgo	MOVIPREP Sinaas/ Orange
Reino Unido (Irlanda del Norte)	MOVIPREP Orange
Suecia	MOVIPREP APELSIN

**Fecha de la última revisión de este prospecto: 11/2022**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>

Esta información está destinada únicamente a profesionales del sector sanitario:

Moviprep Sabor Naranja debe ser administrado con precaución en caso de pacientes delicados con salud delicada o en pacientes con alteraciones clínicas graves tales como:

- alteraciones en el reflejo de deglución o con tendencia a la aspiración o regurgitación
- alteraciones de la consciencia
- insuficiencia renal severa (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min)
- insuficiencia cardíaca (grados III o IV de NYHA)
- que tengan riesgo de arritmia, por ejemplo, aquellos con tratamiento para enfermedades cardiovasculares o que tengan enfermedad tiroidea
- deshidratación
- enfermedad inflamatoria aguda grave del intestino

La presencia de deshidratación o desequilibrios electrolíticos debe ser corregida antes del uso de Moviprep Sabor Naranja.

Pacientes semi-inconscientes o pacientes con riesgo de aspiración o regurgitación, deberán ser cuidadosamente observados durante la administración, especialmente si ésta tiene lugar mediante vía nasogástrica.

Moviprep Sabor Naranja no debe ser administrado a pacientes inconscientes.