

## Prospecto: información para el usuario

### Ácido Fusídico 20 mg/g crema Ácido fusídico

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema y para qué se utiliza
2. Antes de usar Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema
3. Cómo usar Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es **Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema** y para qué se utiliza

Grupo farmacoterapéutico: otros antibióticos para uso tópico, código ATC: D06AX01.

Este medicamento es un antibiótico; su principio activo es ácido fusídico.

Este medicamento se recomienda para el tratamiento de infecciones de la piel causadas por bacterias de la familia de estafilococos o estreptococos.

#### 2. Antes de usar **ACIDO FUSIDICO ISDIN 20 mg/g crema**

##### **No use Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema**

- si es alérgico al ácido fusídico o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento, incluidos en la sección 6 de este prospecto.

##### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar **Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema**

- Debido a la presencia de alcohol cetílico, sorbato de potasio este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto).
- Debido a la presencia de butilhidroxianisol (E320) puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas .
- Este medicamento debe utilizarse con cuidado cuando se aplica cerca de los ojos.

### Niños

No relevante.

### **Otros medicamentos y Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

### **Uso de Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema con alimentos y bebidas**

No relevante.

### **Embarazo y lactancia**

Este medicamento puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia, debiéndose evitar la aplicación sobre las mamas durante el periodo de lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

El tratamiento tópico con Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

### **Información importante sobre algunos componentes de Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema**

Este medicamento contiene butilhidroxianisol, sorbato de potasio y alcohol cetílico que puede producir reacciones alérgicas locales en la piel.

### **3. Cómo usar Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema**

Siga exactamente las instrucciones de uso de Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema indicadas por su médico. Consulte con su médico o farmacéutico si tiene dudas.

#### **Dosis**

Aplicaciones tópicas con o sin apósito, una o dos veces al día, después de limpiar el área infectada. Evite aplicarlo en una capa gruesa.

#### **Duración del tratamiento**

Para información, el tratamiento se limita a una semana

#### **Si usa más Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema del que debe**

La sobredosis es poco probable.

Si usa más Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema del que debe, contacte con su médico o farmacéutico.

#### **Si olvidó usar Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema**

No utilice una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

#### **Si interrumpe el tratamiento con Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema**

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema puede provocar efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- reacciones cutáneas locales (incluyendo dermatitis de contacto y eccema)
- erupción cutánea (rash)
- picor (prurito), enrojecimiento de la piel (eritema)
- dolor en el lugar de aplicación (incluyendo sensación de quemazón), irritación en el lugar de aplicación

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):

- reacciones alérgicas
- conjuntivitis
- hinchazón de cara/ garganta
- urticaria
- ampollas en la piel

Pueden aparecer trastornos cutáneos como dermatitis de contacto, eccema (inflamación cutánea).

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:


<https://www.notificaRAM.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Acido Fusídico Isdin 20 mg/g crema**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el tubo después de EXP.

La crema es estable durante 6 meses tras la primera apertura del tubo.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Información adicional**

#### **Composición de Acido Fusídico Isdin 20 mg/g crema**

- El principio activo es ácido fusídico. Cada gramo contiene 20 mg de ácido fusídico.
- Los demás componentes son: butilhidroxianisol (E320), alcohol cetílico, glicerol, parafina líquida, polisorbato 60, sorbato de potasio (E202), agua purificada, parafina blanda blanca, ácido clorhídrico.

#### **Aspecto de Acido Fusídico Isdin 20 mg/g crema y contenido del envase**

Crema homogénea y blanca en un tubo de aluminio con tapón de rosca blanco de polietileno.

Contenido: 10 g, 15 g y 30 g.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

#### **Titular de la autorización de comercialización**

ISDIN SA

Provençals 33

08019 Barcelona  
España

**Responsable de la fabricación**

Laboratoires Chemineau  
93 route de Monnaie  
37210 Vouvray  
Francia

ó

Kymos, S.L.  
Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallés)  
Cerdanyola del Vallés  
08290 Barcelona  
Spain

ó

**Misom labs Ltd.**

Malta Life Sciences Park  
LS2.01.06, Industrial Estate  
San Gwann, SGN 3000  
Malta

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

España: Acido Fusidico Isdin 20 mg/g crema

Francia: Acide Fusidique BGR 2%, crème

Grecia: Emfucin 2%, κρέμα

Italia: Fusaret

Polonia: Dermafusin

**Fecha de la última revisión de este prospecto: junio 2020**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>