

Prospecto: información para el paciente

Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster 3,27 g supositorio

glicerol

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su médico o farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

CONTENIDO DEL PROSPECTO

1. Qué es Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster
3. Cómo usar Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster y para qué se utiliza

El glicerol, principio activo de este medicamento, es un laxante que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol de ablandar las heces que, junto a una ligera acción irritante local, consigue estimular los movimientos del intestino.

Está indicado para el alivio local sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional para adultos y adolescentes mayores de 12 años.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster

NO USE SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS ADULTOS BLÍSTER

- Si es alérgico al glicerol o a alguno de los demás componentes (excipientes) de este medicamento incluidos en la sección 6.
- Si padece alguna enfermedad anorectal, rectocolitis hemorrágica (un tipo de inflamación crónica del intestino) y hemorroides inflamadas.

- Si tiene retortijones, cólicos, náuseas, vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, enfermedades intestinales inflamatorias agudas o, en general, cualquier situación de dolor abdominal, sin conocer la causa que lo produce.
- En niños menores de 12 años.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster.

- En caso de la aparición de sangre en heces, irritación, dolor o que no mejora debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.
- No use este medicamento más de 7 días seguidos, salvo que su médico se lo indique.
- Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico en pacientes con cuadros patológicos graves, especialmente cardiovasculares (relativas al corazón o a los vasos sanguíneos).

NIÑOS Y ADOLESCENTES

No use Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster en niños menores de 12 años.

OTROS MEDICAMENTOS Y SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS ADULTOS BLÍSTER

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

El uso de este medicamento no afecta a la capacidad para conducir y/o utilizar máquinas.

3. Cómo usar Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos o adolescentes mayores de 12 años: 1 supositorio al día, cuando sea necesario, o según la prescripción del médico.

Forma de administración:

- El supositorio se administra por vía rectal
- Tras sacar el supositorio del blíster, para favorecer su manejo debe mantenerse el supositorio en agua fría durante medio minuto, aproximadamente, antes de introducirlo en el recto.
- Introduzca el supositorio profundamente en el recto.
- Reprimir la evacuación lo máximo posible con el fin de que el medicamento pueda ejercer su acción.
- Si en el momento de la administración nota resistencia, debe interrumpir la misma, ya que puede resultar perjudicial y dañina.
- No se debe utilizar el medicamento durante más de 7 días seguidos. Si los síntomas no mejoran debe suspender el tratamiento y consultar al médico.

SI USA MÁS SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS ADULTOS BLÍSTER DEL QUE DEBE

No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación debido a su uso.

El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar a un síndrome de “colon irritable” (síntomas o molestias como alternancia del estreñimiento y de la diarrea, espasmos intestinales, hinchazón, náuseas y gases).

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el período de utilización de Glicerol solución rectal como laxante, se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: picor, dolor e irritación del ano.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No se precisan condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

COMPOSICIÓN DE SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS ADULTOS BLÍSTER

- El principio activo es glicerol. Cada supositorio contiene 3,27 gramos de glicerol
- Los demás componentes (excipientes) son: ácido esteárico, hidróxido sódico y agua purificada.

ASPECTO DEL PRODUCTO Y CONTENIDO DEL ENVASE

Supositorios de glicerina Dr. Torrents adultos blíster son supositorios incoloros de superficie lisa y brillante, y que se presentan en blíster que contiene 12 supositorios.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Fleer Española S.L.
Rambla Catalunya n.º 53 Ático
08007, Barcelona
España

Responsable de la fabricación

Fleer Española, S.L.
Avda. Hospital s/n
08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona) España
Teléfono: 93 898 40 11 Telefax: 93 898 41 76

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DE ESTE PROSPECTO: DICIEMBRE 2020

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>