

Prospecto: información para el usuario

VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos vinpocetina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto:

1. Qué es Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos.
3. Cómo tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos.
6. Contenido del envase e información adicional.

1. Qué es VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos y para qué se utiliza

Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos está indicada para el tratamiento de los síntomas de deterioro cognitivo relacionados con patología vascular cerebral. Antes de empezar el tratamiento deberá descartarse enfermedad degenerativa de causa no vascular (enfermedad de Alzheimer).

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos

No tome Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos:

- Si es alérgico a la vinpocetina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si está embarazada o en período de lactancia.
- Si padece una hemorragia cerebral.
- Si tiene hipertensión craneal.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos

- Si padece problemas cardíacos.
- Si está en tratamiento con antiarrítmicos, antihipertensivos o anticoagulantes.
- Si padece insuficiencia hepática.
- Si ha experimentado intolerancia a otros alcaloides de la vinca.

Toma de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Aunque no se han descrito, no se puede descartar la posibilidad de interacción entre vinpocetina y fármacos antiarrítmicos, antihipertensivos o anticoagulantes. Si se considera necesario el tratamiento con vinpocetina en pacientes tratados con los medicamentos citados es conveniente efectuar un seguimiento del tratamiento.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se recomienda el uso de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos en embarazo y durante el período de lactancia.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento puede alterar la capacidad de reacción lo que perjudica la capacidad para conducir y utilizar maquinaria, sobre todo en los casos de ingestión del medicamento con alcohol.

Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos se administra por vía oral. La dosificación de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos es de 1 ó 2 comprimidos tres veces al día. Se recomienda la ingestión de los comprimidos durante las comidas, sin masticarlos.

Si toma más Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos del que debe

Si usted u otra persona ha ingerido una sobredosis de vinpocetina, por favor informe a su médico quien le indicará las medidas que debe tomar.

No se tiene constancia de casos de intoxicación por sobredosificación con Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos. En caso de sobredosis o intoxicación accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Si olvidó tomar Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Simplemente salte la dosis que olvidó y tome la dosis siguiente en su hora habitual.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Se han descrito episodios de caída leve de la tensión arterial, molestias gástricas e intestinales (sensación de plenitud o náuseas) y alteraciones cutáneas (exantema o prurito) como resultado de hipersensibilidad al preparado.

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de VINPOCETINA COVEX 5 mg comprimidos

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación.

No utilice Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Vinpocetina Covex 5 mg comprimidos:

- El principio activo es vinpocetina
- Los demás componentes son lactosa, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, estearato magnésico y talco.

Aspecto del producto y contenido del envase

Comprimidos blancos, redondeados, con el logo de Covex () en una de sus caras y una ranura en la otra.

Envase: los comprimidos se acondicionan en blisters de PVC/aluminio de 25 comprimidos y se presentan en estuches de 25 y 50 comprimidos

Titular de la autorización de comercialización

COVEX, S.A.

C/ Acero nº 25, Pol. Ind. Sur, 28770 COLMENAR VIEJO (Madrid).

Tfno: 91 845 02 00

Telefax: 91 845 02 08

e-mail: info@covex.com

Responsable de la fabricación

KERN PHARMA, S.L.

C/ Venus nº 72, Pol. Ind. Colón II, 08228 TERRASSA (Barcelona).

Tfno: 93 700 25 25

Telefax: 93 700 25 00

e-mail: info@kernpharma.com

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A.

C/ Laguna 66-68-70, Polígono Industrial Urtinsa II, 28923, ALCORCÓN, (Madrid).

Tfno: 91 486 29 90

Telefax: 91 486 29 91

e-mail: vir@vir.es

COVEX, S.A.

C/ Acero nº 25, Pol. Ind. Sur, 28770 COLMENAR VIEJO (Madrid).

Tfno: 91 845 02 00

Telefax: 91 845 02 08

e-mail: info@covex.com

Fecha de la última revisión de este prospecto: Junio 2020

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.