

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Allergopharma positieve priktest, oplossing voor huidpriktest 10 mg/ml  
 Allergopharma negatieve priktest, oplossing voor huidpriktest  
 Allergopharma priktest pollen, oplossing voor huidpriktest 50.000 SBE/ml  
 Allergopharma priktest mijten, oplossing voor huidpriktest 50.000 SBE/ml

### Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### In deze bijsluiter:

1. Wat zijn Allergopharma oplossingen voor de huidpriktest en waarvoor worden deze gebruikt.
2. Wat u moet weten voordat u Allergopharma oplossingen voor de huidpriktest gebruikt
3. Hoe worden Allergopharma oplossingen voor de huidpriktest gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Allergopharma oplossingen voor de huidpriktest
6. Aanvullende informatie

### 1. Wat zijn Allergopharma oplossingen voor de huidpriktest en waarvoor word deze gebruikt.

Allergopharma positieve en negatieve priktesten zijn controlevloeistoffen die nodig zijn om vast te stellen of de huidpriktest betrouwbaar reageert.

Allergopharma priktest pollen en mijten zijn testvloeistoffen die worden gebruikt om vast te stellen of u allergisch bent voor een van deze allergenen.

Verder in deze tekst wordt gesproken over "huidpriktest(en)".

Huidpriktesten bevatten extracten van verschillende soorten allergenen zoals pollen en mijten. Uitgangsmaterialen die zijn verwerkt in de huidpriktest pollen respectievelijk mijten;

Artikelnummer	Omschrijving	Sterkte
<b>006</b> bestaande uit: 133 140 157 177 178 179	<b>Graspollenmengsel</b> bestaande uit; <i>Echte witbol</i> <i>Kropaar</i> <i>Engels raaigras</i> <i>Timotheegras</i> <i>Veldbeemdgras</i> <i>Beemdlangbloem</i>	50.000 SBE/ml
158	Roggepollen	50.000 SBE/ml
108	Berkenpollen	50.000 SBE/ml
106	Bijvoetpollen	50.000 SBE/ml
708	Mijten	50.000 SBE/ml
725	Mijten	50.000 SBE/ml

Als er een vermoeden bestaat van een allergie, zal uw arts u hiermee onderzoeken.

Deze allergische klachten kunnen zijn: ontsteking van de neusslijmvliezen en/of benauwdheidsklachten (astma), huiduitslag (eczeem) als gevolg van de allergie.

Huidpriktesten kunnen worden gebruikt bij kinderen vanaf 1 jaar en bij volwassenen. In het algemeen wordt echter pas getest wanneer kinderen 4 tot 5 jaar oud zijn.

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik.

## **2. Wat u moet weten voordat u de huidpriktesten gebruikt.**

### **Gebruik de huidpriktesten niet wanneer:**

- u ziektes heeft die uw algehele toestand ernstig beïnvloeden
- u huidaandoeningen in het testgebied (arm of rug) heeft
- u bèta blokkers (tegen hoge bloeddruk) gebruikt
- u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de andere bestanddelen van de huidpriktest

Indien een van bovenstaande situaties voor u van toepassing is informeer dan uw arts.

### **Wees extra voorzichtig met de huidpriktest:**

- Niet wrijven of krabben over het testgebied, want hierdoor wordt de testuitslag onbetrouwbaar.
- U dient na een priktest minimaal 30 minuten onder toezicht van uw arts te blijven. In zeer zeldzame gevallen leidt de priktest tot het optreden van ernstige overgevoelighedsreacties. Uw arts dient bij het optreden van deze verschijnselen direct handelend op te treden.

### **Gebruik met andere geneesmiddelen**

Vertel uw arts wanneer u onderstaande of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen:

- geneesmiddelen die u gebruikt tegen uw allergische klachten, zoals antihistaminica of corticosteroiden
- Bloeddrukverlagers (Bèta-blokkers of ACE remmers)
- Afweersysteem-onderdrukkende geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van uw allergie verminderen de reactie van de huid op een priktest. Het gebruik hiervan dient tijdelijk gestaakt te worden. U dient uw arts te vragen of dit ook geldt voor de door u gebruikte geneesmiddelen en t ot hoelang u deze geneesmiddelen nog kunt gebruiken.

### **Gebruik van de huidpriktest met voedsel en drank.**

Niet van toepassing.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Het verdient de voorkeur om de huidpriktest niet tijdens de zwangerschap te gebruiken. Er is geen bezwaar om de huidtest uit te voeren in de periode dat u borstvoeding geeft.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend, het is echter niet te verwachten dat de huidpriktest hierop invloed heeft.

## **3. Hoe wordt de huidpriktest gebruikt.**

De huidpriktesten worden op de huid van de binnenzijde van de onderarm of de huid van de rug toegepast.

Er is geen speciale voorbereiding van de huid nodig. Echter bij extreme buitentemperaturen moet een korte tijd in acht worden genomen om te wennen aan de kamertemperatuur.

Wanneer de huid vooraf wordt schoongemaakt met alcohol moet 2 minuten gewacht te worden totdat de circulatie van de huid weer normaal is.

Bij iedere huidpriktest worden een positieve en negatieve controlestof gebruikt.

Deze testen zijn nodig om te controleren of u geen geneesmiddelen heeft gebruikt die de test kunnen beïnvloeden dan wel of u reageert op een van de hulpstoffen.

Met de druppelaar worden druppels van de verschillende oplossingen op de huid aangebracht.

De afstand tussen de afzonderlijke druppels dient minimaal 4 cm. te zijn.

De afzonderlijke druppels worden met behulp van een naald of lancet doorgeprik.

Voor iedere druppel wordt een nieuwe naald of lancet gebruikt.

Na circa 15 minuten kan de test worden afgelezen.

Een positieve reactie is te herkennen aan een duidelijk waarneembare zwelling, roodheid en jeuk.

**Wat moet u doen als u meer van de huidpriktest toegediend heeft gekregen dan u zou mogen.**

Omdat de huidpriktest onder streng gecontroleerde omstandigheden door een arts of verpleegkundige worden toegepast, is er weinig risico op een mogelijke overdosis.

**Wat moet u doen als u de huidpriktest vergeten bent.**

Niet van toepassing.

**Als u stopt met het gebruiken van de huidpriktest.**

In de regel verdwijnen de positieve reacties binnen korte tijd. Echter bij zeer gevoelige patiënten en wanneer zeer grote zwellingen optreden is het mogelijk dat enige uren na de huidpriktest er een late, nieuwe reactie optreedt.

Wanneer deze late, nieuwe reacties optreden dient u deze uw arts te melden (zie ook 4. Mogelijke bijwerkingen).

**4. Mogelijke bijwerkingen.**

Zoals alle geneesmiddelen kan de huidpriktest bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Allergische bijwerkingen worden zelden waargenomen tijdens huidpriktesten, na afloop van de huidpriktest kan in het testgebied de omvang van de huidreactie nog toenemen. Ook is het mogelijk dat de huidreacties enige uren na de huidpriktest opnieuw ontstaan.

Deze verschijnselen kunnen eventueel behandeld worden met een lokaal of oraal antihistaminicum.

Wanneer u binnen 30 minuten na de test last krijgt van een branderig of jeukend gevoel op en onder de tong en in de keel, of aan de handpalmen en de voetzolen, of wanneer uw ademhaling zich versnelt of u zich duizelig voelt of anderszins onwel voelt, moet u dit onmiddellijk aan de behandelend arts melden.

Waarschuw uw arts of apotheker ook indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

**5. Hoe bewaart u de huidpriktest**

Niet van toepassing, de huidpriktesten worden uitsluitend door artsen gebruikt en bewaard.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik de huidpriktesten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het flesje.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

**6. Aanvullende informatie**

**Wat bevat de huidpriktest?**

Het werkzame bestanddeel van de huidpriktest zijn extracten van verschillende soorten pollen of mijten. De hoeveelheid pollen of mijten wordt uitgedrukt in SBE (Standaard Biologische Eenheden) per ml. Het werkzame bestanddeel van de positieve testvloeistof is histaminedihydrochloride. De negatieve testvloeistof bevat geen werkzaam bestanddeel.

De andere bestanddelen zijn natriumchloride, fenol, glycerol en water voor injecties

**Hoe ziet de huidpriktest eruit en wat is de inhoud van de verpakking?**

De huidpriktest is een vloeistof verpakt in een bruin glazen flesje, afgesloten met een druppelpipet.

De concentratie van de verschillende huidpriktesten is als volgt:

Artikelnummer	Omschrijving	Sterkte
006	Graspollenmengsel	50.000 SBE/ml
158	Roggepollen	50.000 SBE/ml
108	Berkenpollen	50.000 SBE/ml
106	Bijvoetpollen	50.000 SBE/ml
708	Mijten	50.000 SBE/ml
725	Mijten	50.000 SBE/ml
901	Negatieve controle	
902	Histamine	10 mg/ml

Verpakkingsgrootte: per flesje 3 ml.

Allergopharma positieve priktest: heldere en kleurloze vloeistof

Allergopharma negatieve priktest: heldere en kleurloze vloeistof

Allergopharma priktest pollen / mijten: helder en kleurloos tot donkerbruine vloeistof

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Allergopharma GmbH & Co. KG  
Herrmann-Körner-Strasse 52  
21465 Reinbek / Hamburg  
Duitsland  
[info@allergopharma.com](mailto:info@allergopharma.com)

#### **Voor inlichtingen en correspondentie:**

Allergopharma b.v.  
Postbus 229  
NL-3700 AE Zeis  
Tel: + (31) 030 – 696 06 07  
Fax: + (31) 030 – 696 23 25  
[info@allergopharma.nl](mailto:info@allergopharma.nl)

#### **NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Allergopharma positieve priktest           RVG 16391  
Allergopharma negatieve priktest       RVG 16392  
Allergopharma priktest pollen           RVG 16407  
Allergopharma priktest mijten           RVG 16408

#### **Fabrikant**

Allergopharma GmbH & Co. KG  
Herrmann-Körner-Strasse 52  
21465 Reinbek / Hamburg  
Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2018