


Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
Module 1 Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1 Bijsluiter</b>	Rev.nr. 2305a      Pag. 1 van 9

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

**Aripiprazol Aurobindo 10 mg, tabletten**  
**Aripiprazol Aurobindo 15 mg, tabletten**  
**Aripiprazol Aurobindo 30 mg, tabletten**

aripiprazol

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Aripiprazol Aurobindo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. WAT IS ARIPIPRAZOL AUROBINDO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Dit middel bevat de werkzame stof aripiprazol en behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar en ouder die lijden aan een aandoening die wordt gekenmerkt door verschijnselen als het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, achterdochtigheid, onjuiste veronderstellingen, onsamenhangende spraak en gedrag, en onverschilligheid. Personen met deze aandoening kunnen zich ook teneergeslagen, schuldig, angstig of gespannen voelen.

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar en ouder die lijden aan een aandoening met kenmerken zoals: het gevoel "high" te zijn, excessief energiek zijn, minder slaap nodig hebben dan normaal, erg snel praten met vluchtige gedachten en soms ernstig prikkelbaar. Bij volwassenen voorkomt het tevens dat deze aandoening terugkeert bij patiënten die voorheen reageerden op de behandeling met dit middel.


### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> <b>RVG 115656, 115658, 115660</b>	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 2305a      Pag. 2 van 9

Gedachten aan en pogingen tot zelfmoord zijn gemeld tijdens behandeling met aripiprazol. Vertel het uw arts onmiddellijk als u gedachten of gevoelens heeft om uzelf iets aan te doen.

Vertel het uw arts, voordat de behandeling met Aripiprazol Aurobindo wordt gestart, als u last heeft van:

- Hoog bloedsuiker (gekenmerkt door symptomen, zoals extreme dorst, overmatig urineren, toegenomen eetlust en gevoel van zwakte) of een familiegeschiedenis van diabetes
- Toevallen/stuipen (epileptische aanvallen), omdat uw arts u dan misschien nauwlettender wil volgen
- Onvrijwillige, onregelmatige spiertrekkingen, met name in het gezicht
- Hart- en vaatziekten, bij u of in uw familie, beroerte of mini-beroerte, afwijkende bloeddruk
- Bloedpropvorming of een familiegeschiedenis van bloedpropvorming, aangezien antipsychotica in verband gebracht worden met bloedpropvorming
- Overmatig gokken in het verleden.

Indien u opmerkt dat uw gewicht toeneemt, u ongewone bewegingen ontwikkelt, u slapeeloesheid ervaart die invloed heeft op uw normale dagelijkse activiteiten, indien u ervaart dat u moeite heeft met slikken of allergische symptomen krijgt, informeer dan uw arts.

Wanneer u een oudere patiënt bent en aan dementie lijdt (het verlies van geheugen of andere geestelijke vermogens) en u ooit een beroerte of TIA heeft gehad, dient u of uw verzorger/familielid uw arts hierover te informeren.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u gedachten of gevoelens heeft om uzelf iets aan te doen. Gedachten aan en pogingen tot zelfdoding zijn gemeld tijdens het gebruik van aripiprazol.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u last heeft van spierstijfheid of starheid met hoge koorts, zweten, veranderde gemoedstoestand of een erg snelle of onregelmatige hartslag.

Vertel het uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u behoeftes of verlangens ontwikkelt om zich op bepaalde manieren te gedragen die ongebruikelijk voor u zijn en als u de impuls, prikkel of verleiding niet kunt weerstaan om bepaalde activiteiten uit te oefenen die schadelijk zouden kunnen zijn voor uzelf of voor anderen. Dit zijn zogeheten stoornissen in de impulsbeheersing en kunnen bestaan uit gedrag, zoals verslavend gokken, overmatig eten of uitgeven van geld, een abnormaal verhoogde seksuele drang of hierdoor volledig in beslag worden genomen met toename van seksuele gedachten of gevoelens.

Uw arts moet uw dosis mogelijk aanpassen of stopzetten.

Aripiprazol kan slaperigheid, bloeddrukdaling bij het overeind komen, duizeligheid en veranderingen in hoe goed u kunt bewegen en het bewaren van het evenwicht veroorzaken, wat tot vallen kan leiden.

Voorzichtigheid is geboden, vooral als u een oudere patiënt of verzwakt bent.


### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen en jongeren beneden de leeftijd van 13 jaar. Het is niet bekend of het veilig en werkzaam is bij deze patiënten.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Aripiprazol Aurobindo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken, inclusief geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Bloeddrukverlagende middelen: Aripiprazol Aurobindo kan de effecten van bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken. Informeer uw arts wanneer u geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk onder controle te houden.

<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1 Bijsluiter</b>	Rev.nr. 2305a      Pag. 3 van 9

Als u Aripiprazol Aurobindo samen met bepaalde andere geneesmiddelen inneemt, kan dat betekenen dat uw arts de dosis Aripiprazol Aurobindo of die van de andere geneesmiddelen moet aanpassen. Het is met name belangrijk om het uw arts te vertellen als u de onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

- Geneesmiddelen die het hartritme corrigeren (bijvoorbeeld kinidine, amiodaron, flecaïnide)
- Antidepressiva of kruidengeneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie en angst (bijvoorbeeld fluoxetine, paroxetine, venlafaxine, sint-janskruid)
- Geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol)
- Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hiv-infectie (bijvoorbeeld efavirenz, nevirapine, en proteaseremmers zoals indinavir, ritonavir)
- Middelen tegen epilepsie (anticonvulsiva) (bijvoorbeeld carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital)
- Bepaalde antibiotica die worden gebruikt om tuberculose te behandelen (rifabutine, rifampicine).

Deze geneesmiddelen kunnen de kans op bijwerkingen verhogen of het effect van Aripiprazol Aurobindo verkleinen; als u ongewone symptomen krijgt terwijl u een van deze geneesmiddelen samen met Aripiprazol Aurobindo gebruikt, moet u uw arts raadplegen.

Geneesmiddelen die het serotoninegehalte verhogen, worden vaak gebruikt bij aandoeningen zoals depressie, gegeneraliseerde angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en sociale fobie, en ook bij migraine en pijn:

- Triptanen, tramadol en tryptofaan, gebruikt voor aandoeningen, zoals depressie, gegeneraliseerde angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en sociale fobie, en ook bij migraine en pijn
- Selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) (zoals paroxetine en fluoxetine), gebruikt voor depressie, OCS, paniek en angst
- Andere antidepressiva (zoals venlafaxine en tryptofaan), gebruikt bij ernstige depressie
- Tricyclische antidepressiva (zoals clomipramine en amitriptyline), gebruikt bij depressieve stoornissen
- Sint-janskruid (*Hypericum perforatum*), gebruikt als kruidengeneesmiddel bij lichte depressie
- Pijnstillers (zoals tramadol and pethidine), gebruikt om pijn te verlichten
- Triptanen (zoals sumatriptan en zolmitriptan), gebruikt om migraine te behandelen.

Deze geneesmiddelen kunnen de kans op bijwerkingen verhogen; als u ongewone symptomen krijgt terwijl u een van deze geneesmiddelen samen met Aripiprazol Aurobindo gebruikt, moet u uw arts raadplegen.

### Waarop moet u letten met eten en alcohol?

Dit middel kan onafhankelijk van de maaltijden worden ingenomen.  
Het gebruik van alcohol dient te worden vermeden.

### Zwangerschap en borstvoeding


Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die dit middel in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Als u Aripiprazol Aurobindo inneemt, zal uw arts met u bespreken of u borstvoeding kunt geven, waarbij rekening wordt gehouden met de voordelen van de behandeling voor u en het voordeel van borstvoeding voor uw baby. U mag niet én borstvoeding geven én dit geneesmiddel krijgen. Overleg met uw arts wat de beste manier is om uw baby te voeden als u dit geneesmiddel inneemt.

### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en problemen met uw gezichtsvermogen kunnen voorkomen bij gebruik van dit geneesmiddel (zie rubriek 4). Hier moet u rekening mee houden in gevallen waarin u volledig alert moet zijn, bijvoorbeeld wanneer u

<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 2305a      Pag. 4 van 9

autorijdt of machines bedient.

### **Aripiprazol Aurobindo bevat lactosemonohydraat**

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

### **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**De aanbevolen dosering bij volwassenen is eenmaal daags 15 mg.** Echter kan uw arts een lagere of hogere dosis voorschrijven tot maximaal eenmaal daags 30 mg.

#### **Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar**

De behandeling met dit geneesmiddel kan gestart worden met een lage dosis van de orale (vloeibare) suspensie. De dosis kan dan langzaam verhoogd worden tot **de aanbevolen dosis voor jongeren van 10 mg eenmaal daags**. Uw arts kan echter een lagere of hogere dosis voorschrijven tot een maximum van 30 mg eenmaal daags.

Als u de indruk heeft dat de werking van dit middel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

**Probeer dit middel iedere dag rond dezelfde tijd in te nemen.** Het maakt niet uit of u deze met of zonder voedsel inneemt. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water.

**Ook al voelt u zich beter,** verander of stop niet met de dagelijkse dosering van dit middel zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

#### **Heeft u te veel van dit middel ingenomen?**

Wanneer u zich realiseert dat u meer van dit middel heeft ingenomen dan uw arts heeft aanbevolen (of wanneer iemand anders dit middel heeft ingenomen), neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Wanneer u uw arts niet kunt bereiken, ga dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en neem het doosje met u mee.

Patiënten die te veel aripiprazol hadden ingenomen, hadden de volgende symptomen:

- Snelle hartslag, opwinding/agressiviteit, spraakproblemen
- Ongewone bewegingen (vooral van het gezicht en de tong) en verlaagd bewustzijnsniveau.

Andere symptomen kunnen zijn:

- Acute verwardheid, toevallen/stuipen (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, transpireren
- Spierstijfheid, sufheid of slaperigheid, tragere ademhaling, verslikken, hoge of lage bloeddruk, afwijkend hartritme.


Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis als een van de bovenstaande symptomen bij u optreedt.

#### **Bent u vergeten dit middel in te nemen?**

Wanneer u een dosis bent vergeten, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het innemen van dit middel**

Stop niet met uw behandeling alleen omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u net zo lang doorgaat met het innemen van dit geneesmiddel als uw arts u heeft gezegd.

<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1 Bijsluiter</b>	Rev.nr. 2305a      Pag. 5 van 9

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

##### **Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10 mensen voorkomen):**


- Diabetes mellitus
- Slaapproblemen
- Angst
- Rusteloos gevoel, niet stil kunnen zitten
- Acathisie (een ongemakkelijk gevoel van rusteloosheid van binnen en een drang om voortdurend te bewegen)
- Oncontroleerbare trekkende of schokkende bewegingen, rusteloze benen
- Beven
- Hoofdpijn
- Moeheid
- Slaperigheid
- Licht gevoel in het hoofd
- Beven en wazig zien
- Minder vaak ontlasting of problemen bij de ontlasting
- Indigestie
- Misselijkheid
- Meer speeksel in de mond dan normaal
- Overgeven
- Moe gevoel.

##### **Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 100 mensen voorkomen):**


- Verhoogd of verlaagd gehalte van het hormoon prolactine in het bloed
- Te veel suiker in het bloed
- Depressie
- Veranderde of verhoogde seksuele interesse
- Ongecontroleerde bewegingen van de mond, tong en ledematen (tardieve dyskinesie)
- Spierstoornis die trekkende bewegingen veroorzaakt (dystonie)
- Rusteloze benen
- Dubbelzien, overgevoeligheid voor licht
- Snelle hartslag
- Bloeddruk daling bij het gaan staan, lichthoofdigheid of flauwvallen
- Hik.

##### **De volgende bijwerkingen zijn gemeld na het op de markt komen van orale aripiprazol, maar de frequentie ervan is niet bekend:**

- Laag aantal witte bloedcellen
- Laag aantal bloedplaatjes
- Allergische reactie (bijv. zwelling in mond, tong, gezicht en keel, jeuk, netelroos)
- Optreden of verergering van diabetes, ketoacidose (ketonen in het bloed en de urine) of coma
- Hoog bloedsuiker
- Niet genoeg natrium in het bloed

<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 2305a      Pag. 6 van 9

- Verminderde eetlust (anorexie)
- Gewichtsverlies
- Gewichtstoename
- Gedachten aan zelfdoding, poging tot zelfdoding en zelfdoding
- Gevoel van agressie
- Onrust
- Nervositeit
- Combinatie van koorts, spierstijfheid, sneller ademen, zweten, afgenomen bewustzijn en plotselinge veranderingen in bloeddruk en hartslag, flauwvallen (maligne neurolepticasyndroom)
- Convulsies (stuipen)
- Serotoninesyndroom (een reactie die gevoelens kan veroorzaken van grote vreugde, sufheid, onhandigheid, onrust, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren)
- Spraakstoornis
- Vastzitten van de oogbollen in één positie
- Plotseling onverklaarbaar overlijden
- Levensbedreigende onregelmatige hartslag
- Hartaanval
- Vertraagde hartslag
- Bloedpropen in de aderen, vooral in de benen (met symptomen als zwelling, pijn en roodheid in het been), die zich via de bloedvaten naar de longen kunnen verplaatsen en kunnen zorgen voor pijn op de borst en moeite met ademen (indien u een of meer van deze symptomen opmerkt, roep dan onmiddellijk medisch advies in)
- Hoge bloeddruk
- Flauwte
- Per ongeluk inademen van voedsel met het risico op longontsteking
- Spasmen van de spieren rond de stembanden
- Alveesklierontsteking
- Moeite met slikken
- Diarree
- Buikklachten
- Maagklachten
- Leverfalen
- Leverontsteking
- Geelkleuring van de huid en het oogwit
- Meldingen van afwijkende levertestwaarden
- Huiduitslag
- Overgevoeligheid voor licht
- Kaalheid
- Overmatig zweten
- Ernstige allergische reacties, zoals geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS). Initieel komt DRESS voor als griepachtige symptomen en huiduitslag op het gezicht, gevolgd door meer verspreide huiduitslag en hoge temperatuur, vergrote lymfeknopen, verhoogde waarden van leverenzymen in het bloed en een verhoging van het aantal van een bepaalde soort witte bloedcellen (eosinofilie)
- Abnormale spierafbraak die kan leiden tot nierproblemen
- Spierpijn
- Stijfheid
- Onvrijwillig urineverlies (incontinentie)
- Moeite met urinelozing
- Ontwenningssverschijnselen bij pasgeboren baby's na blootstelling tijdens de zwangerschap

<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 2305a      Pag. 7 van 9

- Langdurige en/of pijnlijke erectie
- Moeilijkheden bij het controleren van de standaardlichaamstemperatuur of oververhitting
- Pijn op de borst
- Zwelling van de handen, enkels of voeten
- Bij bloedonderzoek: bloedsuikerschommeling, verhoogd gehalte geglycosyleerd hemoglobine
- Onvermogen om de impuls, prikkel of verleiding te weerstaan om een daad uit te voeren die schadelijk kan zijn voor u of anderen, wat kan inhouden:
  - Sterke impuls om overmatig te gokken, ondanks ernstige persoonlijke of familiale gevolgen
  - Veranderde of verhoogde seksuele interesse en gedrag dat van grote zorg is voor u of voor anderen, bijvoorbeeld een verhoogde seksuele drift
  - Niet te beheersen overmatig winkelen
  - Eetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd), of dwangmatig eten (het eten van meer voedsel dan normaal en meer dan nodig is om uw honger te stillen)
  - Een neiging om rond te dwalen.

Vertel het uw arts als u een van deze gedragswijzen doormaakt; hij/zij zal manieren bespreken om met de symptomen om te gaan of deze te verminderen.

Bij oudere patiënten met dementie zijn bij gebruik van aripiprazol meer gevallen van overlijden gemeld. Tevens zijn gevallen van een beroerte of TIA gemeld.

#### **Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen**

Jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar en ouder kregen bijwerkingen vergelijkbaar met die bij volwassenen en in dezelfde mate. Uitzonderingen hierop zijn slaperigheid, ongecontroleerde, trekkende of schokkende bewegingen, rusteloosheid en vermoeidheid die zeer vaak voorkwamen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers). Vaak voorkomend waren pijn in de bovenbuik, droge mond, verhoogde hartslag, gewichtstoename, toegenomen eetlust, spiertrekkingen, ongecontroleerde bewegingen van de ledematen, en duizelig voelen, vooral bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers).

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**


Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na "Exp.:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1 Bijsluiter</b>	Rev.nr. 2305a      Pag. 8 van 9

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is aripiprazol.  
Elke Aripiprazol Aurobindo 10 mg tablet bevat 10 mg aripiprazol.  
Elke Aripiprazol Aurobindo 15 mg tablet bevat 15 mg aripiprazol.  
Elke Aripiprazol Aurobindo 30 mg tablet bevat 30 mg aripiprazol.
- De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

### Hoe ziet Aripiprazol Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tablet.

#### Aripiprazol Aurobindo 10 mg, tabletten

Witte, rechthoekige, niet-omhulde tabletten met de inscriptie “63” op één zijde en “H” op de andere zijde. De afmeting is 8 mm × 4.5 mm.

#### Aripiprazol Aurobindo 15 mg, tabletten

Witte, ronde (diameter 7 mm), niet-omhulde tabletten met de inscriptie “64” op één zijde en “H” op de andere zijde.

#### Aripiprazol Aurobindo 30 mg, tabletten

Witte, ronde (diameter 9 mm), niet-omhulde tabletten met de inscriptie “66” op één zijde en “H” op de andere zijde.

Aripiprazol Aurobindo tabletten zijn verkrijgbaar in polyamide / aluminium / PVC / aluminium blisterverpakkingen en HDPE-flessen met polypropyleen dop, met daarin silicagel als droogmiddel.

#### Verpakkingsgrootten

- Blisterverpakking: 14, 28, 30, 49, 56 en 98 filmomhulde tabletten.
- HDPE-fles: 30, 100, 250 en 500 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

#### Houder van de vergunning:

Aurobindo Pharma B.V.  
Baarnsche Dijk 1  
3741 LN  
Baarn

#### Fabrikant:


APL Swift Services (Malta) Limited  
HF26, Hal Far Industrial Estate  
Birzebbugia, BBG 3000  
Malta

#### Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

Aripiprazol Aurobindo 10 mg, tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 115656.  
Aripiprazol Aurobindo 15 mg, tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 115658.  
Aripiprazol Aurobindo 30 mg, tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 115660.

**Dit geneesmiddel is in lidstaten van de EEA geregistreerd onder de volgende namen:**



<b>Aripiprazol Aurobindo 10 mg, 15 mg en 30 mg, tabletten</b> RVG 115656, 115658, 115660	 <b>AUROBINDO</b>
<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information	
<b>1.3.1</b> Bijsluiter	Rev.nr. 2305a      Pag. 9 van 9

België:                    Aripiprazole AB 10 mg/ 15 mg/ 30 mg, tabletten  
Cyprus:                    Aripiprazole Aurobindo 10 mg/ 15 mg/ 30 mg δισκία  
Duitsland:                Aripiprazol Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 30 mg Tabletten  
Nederland:                Aripiprazol Aurobindo 10 mg/ 15 mg/ 30 mg tabletten  
Portugal:                 Aripiprazol Aurobindo

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2023.**