

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker



Hyperiforce®

Hypericum-extract

Tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit traditioneel kruidengeneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Hyperiforce zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter: het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts als klachten verergeren, indien na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van klachten wordt bemerkt of wanneer klachten terugkeren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel Hyperiforce® en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Hyperiforce® inneemt?
3. Hoe wordt A.Vogel Hyperiforce® ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Hyperiforce®?
6. Algemene informatie.

1. Wat is A.Vogel Hyperiforce® en waarvoor wordt het ingenomen?

Traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van tijdelijke nerveuze spanning en klachten als hoofdpijn, misselijkheid, overgevoeligheid, neerslachtigheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring en niet op klinisch bewijs.

Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Hyperiforce® inneemt?

Wanneer mag u Hyperiforce® niet innemen? Dit product dient niet te worden ingenomen bij overgevoeligheid voor *Hypericum perforatum* of voor een van de hulpstoffen. Dit product mag niet te worden ingenomen in geval van lichtovergevoeligheid. Niet gebruiken bij kinderen onder de 18 jaar.

- bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten: ciclosporine, tacrolimus;
- antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol en fenprocoumon;
 - anti-epileptica: fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine;
 - luchtwegverwijders: theofylline;
 - hartglycosiden bij hartfalen en hartritme-stoornissen: digoxine;
 - remmers van het HIV-virus: dit geldt voor zowel de protease remmers, zoals bijvoorbeeld indinavir, als voor non-nucleotide reverse transcriptase remmers zoals efavirenz en nevirapine;.
 - simvastatine;
 - oncolytica zoals imatinib en irinotecan;

Hyperiforce kan ook de werking van geneesmiddelen tegen depressiviteit van het SSRI-type beïnvloeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn paroxetine, sertraline en nefazodon. Gelijktijdige inname wordt afgeraden, vanwege een mogelijk ontstaan van het serotonine-syndroom.

Bij gelijktijdige inname van Hyperiforce en de orale anticonceptiepil, kan er sprake zijn van een verminderde bescherming tegen zwangerschap. Dit is gebaseerd op meldingen van doorbraakbloedingen en zeer incidenteel van gevallen van zwangerschap.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

3. Hoe wordt A.Vogel Hyperiforce® ingenomen?

Tenzij anders is voorgeschreven:

Volwassenen: 2 maal daags 1 tablet.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Hyperiforce® heeft ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering Hyperiforce heeft ingenomen, zijn in algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Het kan worden aangenomen dat overgevoeligheid voor licht toeneemt. In geval van blootstelling aan UV-licht gedurende 1-2 weken moeten worden vermeden.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Hyperiforce® in te nemen?

Wanneer u Hyperiforce vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten, maar wacht tot de eerstvolgende tijdstip en neem dan de gebruikelijke hoeveelheid A.Vogel Hyperiforce in.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Hyperiforce® wordt gestopt?

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. Indien u na het stoppen met Hyperiforce ook andere geneesmiddelen gebruikt en u wilt stoppen met de inname van Hyperiforce, wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Hyperiforce

6. Algemene informatie

A.Vogel Hyperiforce®

Het actieve bestanddeel is een ethanolextract van vers bloeiend Sint-Janskruid (*Hypericum perforatum* L.). Eén tablet (450 mg) bevat 66 mg gedroogd ethanolextract, overeenkomend met 425-1300 mg verse plant.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, silica, glyceroldistearaat.

Dit geneesmiddel wordt verpakt in een potje met 60 tabletten.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl

A.Vogel Hyperiforce is in het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 104186.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (<http://www.cbg-meb.nl>).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 3 januari 2020

