

Beclometasondipropionaat / formoterolfumaraatdihydraat
100/6 microgram/dosis Medcor, aerosol, oplossing
 beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat.
 Voor gebruik door volwassenen.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
- Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

1. Wat is dit middel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Als u merkt dat u meer inhalaties nodig heeft raadpleeg dan uw arts en vraag zijn advies.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

[illegible]