

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER****Canesten<sup>®</sup> gyno tablet**

Canesten gyno tablet, tablet voor vaginaal gebruik 100 mg

Werkzame stof: clotrimazol

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Canesten gyno en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u dit middel gebruikt
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAT IS CANESTEN GYNO TABLET EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Canesten gyno tablet bevat de werkzaam stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof, die bepaalde schimmels doodt of in de groei remt. Canesten gyno tablet is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, tenzij uw arts anders adviseert.

Canesten gyno tablet wordt toegepast bij infecties van de vagina of hiermee gepaard gaande infecties rond de vagina, die veroorzaakt worden door bepaalde schimmelsoorten. De meest voorkomende veroorzaker van een schimmelinfectie is *Candida albicans*. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig maar kan onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken, zoals het ontstaan van vaginale afscheiding, bekend als witte vloed.

**2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DIT MIDDEL GEBRUIKT**

**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?** Bij gebruik van rubberproducten zoals condooms en pessaria omdat Canesten gyno tablet de werking en veiligheid hiervan kunnen verminderen. Het effect is tijdelijk, alleen tijdens de behandeling.

Bij voorkeur niet tijdens de menstruatie gebruiken, omdat dan niet helemaal op de werkzaamheid kan worden vertrouwd. Zorg er daarom voor dat de kuur vóór die tijd is beëindigd.

**Gebruik van Canesten gyno tablet in combinatie met andere geneesmiddelen** Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.

**Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid****Zwangerschap**

Canesten gyno tablet kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht in de aanbevolen dosering worden gebruikt tijdens de zwangerschap, indien nodig. Het gebruik van de applicator moet dan worden vermeden. Behandeling met Canesten gyno tabletten verdient dan de voorkeur. De tabletten kunnen met de hand worden ingebracht.

**Borstvoeding**

Canesten gyno tablet kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

**Vruchtbaarheid**

Er zijn geen studies bij mensen uitgevoerd naar de effecten van clotrimazol op de vruchtbaarheid, maar dierstudies hebben geen effect van het geneesmiddel op de vruchtbaarheid aangetoond.

**3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**


Volg bij het gebruik van Canesten gyno tablet nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Het voorschrift van de arts zal in het algemeen zijn:

Gedurende zes opeenvolgende dagen eenmaal per dag - 's avonds vóór het slapen gaan - één Canesten gyno tablet zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.


**Gebruiksaanwijzing (volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar)**

Het inbrengen van Canesten gyno tablet kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen.




De applicator wordt gebruikt om de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, bij voorkeur voor het slapen gaan. Was uw handen voordat u de vaginale tablet en de applicator uit de verpakking haalt en nadat u de applicator heeft gebruikt. Canesten gyno *vaginale tablet* wordt als volgt toegediend:

### *Toediening met behulp van de bijgeleverde applicator*



1. Haal de applicator uit de verpakking en trek het staafje tot de rode vergrendeling uit.
2. Plaats de vaginale tablet in het open uiteinde van de applicator met de bolle kant van de vaginale tablet naar beneden. Duw op het staafje en vergrendel de applicator totdat het klikt.



3. Daarna verwijdert u de vergrendeling van het staafje en plaatst u de applicator voorzichtig in de vagina tot de inkeping



4. Houd de applicator vast bij de inkeping en duw om de vaginale tablet in te brengen het staafje voorzichtig helemaal naar binnen tot hij niet meer verder kan.




5. Haal na gebruik, de onderdelen uit elkaar en was ze grondig in warm (niet kokend) zeepwater. Spoel ze 30 seconden af met schoon water en veeg de onderdelen zorgvuldig af. Bewaar het op een schone en veilige plaats. Voor hergebruik, zorg ervoor dat de rode vergrendeling op het staafje wordt teruggeplaatst en herhaal het proces vanaf stap 2. Gooi de applicator na het laatste gebruik weg op een veilige plek, buiten het bereik van kinderen. De applicator mag niet door het toilet worden gespoeld.

### *Toediening zonder applicator*

Canesten gyno tablet wordt als volgt toegediend:

Houd de schaamlippen met de vrije hand uit elkaar en druk de tablet met de bolle kant naar boven en de vinger tegen de platte kant van de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen.



### **Hoe lang moet Canesten gyno tablet worden gebruikt?**

U moet de voorgeschreven kuur altijd afmaken. De klachten waarvoor u wordt behandeld, kunnen terugkomen als u de kuur niet afmaakt.

Als de klachten niet over zijn na een behandeling kan deze worden herhaald.

**Heeft u te veel van dit middel gebruikt?** Er zijn geen gevallen van overdosering bekend bij gebruik van Canesten gyno tablet volgens de gebruiksvorschriften. Raadpleeg uw arts, wanneer de tablet per ongeluk oraal is ingenomen.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

**Bent u vergeten dit middel te gebruiken** U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip toepassen.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van Canesten gyno tablet**

Het is belangrijk om de behandeling af te maken. Als u te vroeg stopt met de behandeling is het mogelijk dat de schimmelinfectie weer terugkomt.

### **Algemeen**

De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een anti-schimmel-crème om besmetting wederzijds te voorkomen.

Bij hardnekkige infecties moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via het rectum, dat dan behandeld moet worden.

De tabletten hebben vocht in de vagina nodig om geheel te kunnen oplossen. Onopgeloste delen van de tablet kunnen uit de vagina worden uitgescheiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, vóór het slapen gaan. Indien

de tablet niet in één nacht oplost, kan overwogen worden om een clotrimazol bevattende crème te gebruiken.

#### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno tablet bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Met onbekende frequentie zijn de volgende bijwerkingen vastgesteld tijdens het gebruik van clotrimazol.

Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheid in ernstige gevallen leidend tot opzwellen van de lippen, de tong en de keel of een anafylactische reactie (kan eventueel gepaard gaan met misselijkheid, diarree, verlaagde bloeddruk, moeite met ademen, , bewusteloosheid).

Huid- en onderhuidaandoeningen: rode huid, jeukende uitslag, huiduitslag, prikkend/branderig gevoel van de huid.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: irritatie of reactie op de toedieningsplaats, vochtophoping.

Bij gebruik van de tablet kan bij de partner irritatie van de penis optreden.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:vaginaal bloedverlies.

#### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

#### 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het vouwdoosje en op de strip (bij de tablet) achter de letters EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

#### 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

**Welke stoffen zitten er in dit middel?**De werkzame stof in dit middel is: clotrimazol.

Andere hulpstoffen in dit middel zijn:

Calciumlactaat (E327), colloïdaal siliciumdioxide (E551), crosprovidon (E1202), lactose, magnesiumstearaat (E470B), maïszetmeel, melkzuur (E270), microkristallijne cellulose (E460 (i)), hypromellose (E464).

**Hoe ziet Canesten gyno tablet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**verpakking

Canesten gyno tablet is verkrijgbaar in een verpakking met 6 tabletten.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Registratiehouder: Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp.

*Voor inlichtingen:* Bayer Consumer Care, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp.

Fabrikant: Bayer AG, Leverkusen, Duitsland.

Canesten gyno tablet, tablet voor vaginaal gebruik, is in het register ingeschreven onder RVG 06517.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in:** augustus 2022.