

verhoogt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

- Als u meer formoterol gebruikt dat u zou mogen, kan dat de volgende effecten hebben: misselijkheid, braken, snelle hartslag, hartkloppingen, hartritmestoomissen, bepaalde veranderingen van het electrocardiogram (ECG), hoofdpijn, trillen, slaperigheid, te veel zuur in het bloed, een lage kaliumspiegel van het bloed, en een hoge glucosespiegel van het bloed. Uw arts zal het misschien wenselijk vinden om een aantal bloedtesten uit te voeren om de kalium- en glucosespiegel van uw bloed te controleren.
- Indien u te veel beclometasondipropionaat gebruikt, kan dat leiden tot kortdurende problemen met de werking van uw bijniere. Dit wordt binnen enkele dagen beter, maar misschien zal uw arts de cortisolspiegel van het serum moeten controleren.

Laat het uw arts weten indien u een van deze verschijnselen heeft. Bent u vergeten

dit middel te gebruiken?

Gebruik het zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, gebruik dan niet meer de dosis die u vergeten bent, maar neem de volgende dosis gewoon op het juiste tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U mag de dosis niet verlagen of met de medicatie stoppen.

Ook als u zich beter voelt, mag u niet met Foster stoppen of de dosis verlagen. Indien u dit wilt doen, raadpleeg dan uw arts. Het is heel belangrijk dat u Foster regelmatig gebruikt, zelfs als u geen symptomen heeft.

Indien u ademhaling verslechtert:

Indien uw kortademigheid erger wordt of als u 'piept' (ademhaalt met een hoorbaar fluitend geluid) vlak nadat u uw medicatie heeft geïnhaald, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Foster inhalator en direct uw snelwerkende inhalator voor symptoomverlichting gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Uw arts zal uw symptomen beoordelen en u zo nodig een andere behandeling voorschrijven. Zie ook Rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen.

Indien uw astma erger wordt:

Indien uw symptomen erger worden of moeilijk onder controle te houden zijn (bijv. indien u vaker uw aparte inhalator of uw Foster inhalator voor symptoomverlichting gebruikt) of als uw inhalator voor symptoomverlichting of uw Foster inhalator geen verlichting biedt, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Misschien wordt uw astma erger en moet uw arts uw dosis Foster aanpassen of een andere behandeling voorschrijven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruiksaanwijzingen:

Dit middel zit in een aluminium spuitbusje onder druk die in een plastic aandrijfsdeel met mondstuk zit (dit vormt tezamen de inhalator).


Inhalator van 180 doses: Op de achterzijde van de inhalator zit een dosisindicator. Die geeft aan hoeveel doses (inhalaties) er nog over zijn. Iedere keer als u de inhalator indrukt, draait de dosisindicator een stukje verder. Het aantal overgebleven inhalaties tellt per 20 af. Let er op dat u de inhalator niet laat vallen omdat hierdoor de dosisindicator ook kan aftellen.

Testen van uw inhalator

Voordat u de inhalator voor de eerste keer gebruikt, of als u de inhalator 14 dagen of langer niet heeft gebruikt, moet u de inhalator testen om te controleren of de inhalator goed werkt


1. Verwijder de beschermkap van het mondstuk.
2. Houd de inhalator verticaal met het mondstuk aan de onderkant.
3. Richt het mondstuk van u af en druk de inhalator stevig in om een dosis af te geven.
4. Controleer de dosisteller/-indicatie.

Inhalator van 180 doses. Als u de inhalator voor de eerste keer getest moet deze '180' aangeven.



Gebruiksaanwijzing

Indien mogelijk moet u staan of rechtop zitten bij het inhaleren



1. Verwijder de beschermkap van het mondstuk en controleer of het mondstuk schoon is en vrij van stof en vuil of andere vreemde voorwerpen.
2. Adem zo langzaam en diep mogelijk uit.
3. Houd de inhalator verticaal met het mondstuk aan de onderkant, en plaats uw lippen om het mondstuk. Niet op het mondstuk bijten.
4. Adem langzaam en diep door uw mond in. Net nadat u bent begonnen met inademen, **drukt u stevig**

1. Verwijder het beschermkapje door deze vast te houden.
2. Maak de binnen- en buitenkant van het mondstuk schoon.
3. Doe het beschermkapje weer op het mondstuk.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel

Evenals bij andere inhalatiemiddelen bestaat het risico op bijwerkingen. Dit noemt men **paradoxie** met het gebruik van Foster **STOPPEN** en kortademigheidsklachten en het piepen te behouden.

Vertel uw arts direct als u verschijnselen van kortademigheid, pijn op de borst, rood worden van de huid, zwelling van de huid of

Andere mogelijke bijwerkingen worden hieronder

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten): rood worden van de mond en keel), hoofdpijn, heesheid, zere keel.

Pneumonie (longinfectie) bij COPD-patiënten met andere symptomen tijdens het gebruik van dit middel.

- koorts of koude rillingen
- verhoogde productie van slijm, verandering in slijmkleur
- vaker hoesten of meer ademhalingsmoeilijkheden

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten): Hartkloppingen, een abnormaal snelle hartslag, veranderingen in het electrocardiogram (ECG).

Griepverschijnselen, schimmelinfecties van de keel, irritatie van de keel, hoesten en slijm opgeven, ademhalingsmoeilijkheden, Misselijkheid, abnormale of verslechterde spijsverteringsproblemen, maagpijn, Spierpijn en spierkrampen, aanvallen van rootheid, overmatig zweten, trillen, rusteloosheid, Veranderingen van sommige componenten van het bloed, vermindering van bloedplaatjes, verlaging van de kaliumspiegel, verhoging van de bloedspiegel van insuline, verhoging van de bloedspiegel van cholesterol.

De volgende bijwerkingen zijn ook met de frequentie van longziekte:

- Afname van de hoeveelheid cortisol in het bloed, wat kan leiden tot problemen met de corticosteroiden op uw bijniere.
- Onregelmatige hartslag.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten): Benauwdheid, overslaand hart (wordt veroorzaakt door een stijging of daling van de bloeddruk, nierontsteking, of andere oorzaken).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten): Kortademigheid, verergering van de astma, verergering van de astma.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld)

Gebruik van hoge doses inhalatiecorticosteroïden systemische effecten veroorzaken: hiertoe behoort onder andere: bijniere-suppressie, afname van de botmineralisatie bij kinderen en adolescenten, verhoogde oogdruk, slaapproblemen, depressie of ongerustheid, maar ook andere effecten komen vaker voor bij kinderen, maar worden niet beschreven.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze lijst staan. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb kan u helpen meer informatie te verkrijgen over de bijwerkingen.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Verpakking met 1 spuitbusje met 180 doses

Gebruik dit geneesmiddel niet meer 3 maanden na de laatste dosis. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uitsluitingsdatum op het etiket achter 'EXP'. Daar staat een maand na de houdbaarheidsdatum.

De inhalator bewaren beneden 25°C.

Indien de inhalator aan extreme kou is blootgesteld, verwarm deze met uw handen. Nooit met kunstmatige middelen verwarmen.

Waarschuwing: Het spuitbusje bevat een vloeistof die kan vlammen vatten hoger dan 50°C. Het spuitbusje niet doorboren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen. Het afspuiten van wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet wilt gebruiken, vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN C

Welke stoffen zitten er in dit middel?