

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Minims Lidocaine/Fluoresceïne oogdruppels, oplossing

Lidocainehydrochloride / Fluoresceïnenatrium

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Minims Lidocaine/Fluoresceïne en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Minims Lidocaine/Fluoresceïne en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt voor bepaalde onderzoeken in het oog waaronder het meten van de oogdruk en de diagnose van hoornvliesdefecten. Het wordt eveneens gebruikt bij proefpassing van harde contactlenzen.

Het bevat als werkzame stof een lokaal verdovend middel en een kleurend middel.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor een ander lokaal verdovend middel van dezelfde familie.
- Bij het inzetten van zachte contactlenzen (absorptie van fluoresceïne door de lens).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

De verdoving van het oog kan 30 minuten en langer duren. In die periode kan het oog gemakkelijk beschadigd worden. De hoornvliesgevoeligheid kan in die periode ook niet getest worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Minims Lidocaine/Fluoresceïne nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het voorschrift van de arts gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloed worden door het gebruik van deze Minims.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is één of meerdere druppels in het oog indruppelen.

Gebruik bij kinderen

Eén of meerdere druppels in het oog indruppelen.

De Minims zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

Wijze van gebruik

Indruppelen in het oog.



Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, wordt de kans op ongewenste reacties verminderd.

Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Minims Lidocaine/Fluoresceïne heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Vanwege de geringe hoeveelheid lidocaïne en fluoresceïne in Minims Lidocaïne/Fluoresceïne zijn geen nadelige effecten te verwachten bij overdosering.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U kan na het indruppelen een brandend gevoel krijgen in het oog.

Bij veelvuldig gebruik kan het hoornvlies beschadigd worden met een blijvende vermindering van het zichtsvormogen tot gevolg.

Bij het optreden van pijn na indruppeling van het geneesmiddel dient men de behandeling te onderbreken.

Dit geneesmiddel kan allergische reacties veroorzaken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na gebruik onmiddellijk wegwerpen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn lidocainehydrochloride en fluoresceïnenatrium. Elke ml oplossing bevat 40 mg lidocainehydrochloride en 2,5 mg fluoresceïnenatrium.
- De andere stoffen in dit middel zijn polyvidon, waterstofchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Minims Lidocaine/Fluoresceïne er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims).

Doos met 20 Minims (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml vloeistof.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Ierland

Fabrikant

Laboratoire Chauvin
Zone Industrielle Ripotier Haut
07200 AUBENAS
Frankrijk

In het register ingeschreven onder RVG 10165

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2022