

Qvar Extrafijne Aërosol 50 Autohaler, 50 microgram/dosis, aërosol, oplossing
Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler, 100 microgram/dosis, aërosol, oplossing
 beclometasondipropionaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL AUTOHALER EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN GEBRUIKT?

Medicijnengroep

Beclometasondipropionaat behoort tot de groep van medicijnen die corticosteroïden wordt genoemd. Deze medicijnen hebben een ontstekingsremmende werking in de luchtwegen en worden gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen en is niet geschikt om een plotselinge benauwdheidsaanval te stoppen.

2. WANNEER MAG U DIT MEDICIJN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- In het geval van longtuberculose, herpes simplex infecties (groepjes blaasjes op huid en slijmvliezen die na 6-10 dagen indrogen) of astma aanvallen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Wanneer u dit medicijn met vaste regelmaat gebruikt, is het effect op de ademhaling binnen 10 dagen merkbaar. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met uw arts. Dit medicijn dat astma-aanvallen voorkomt, dient elke dag ingenomen te worden en is niet geschikt om acute benauwdheidsaanvallen te bestrijden.

Wanneer u voorheen een CFK-bevattende inhalator gebruikt heeft, bestaat de mogelijkheid dat Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler anders smaakt en aanvoelt dan uw vorige inhalator. Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar en verhoogde oogdruk. Het is daarom van groot belang dat de dosis inhalatiecorticosteroïden op de laagste waarde wordt ingesteld, waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Kinderen

Het is aanbevolen de groei van kinderen die lange tijd met inhalatiecorticosteroïden worden behandeld regelmatig te controleren. Indien de groei geremd wordt, dient de behandeling te worden herzien en, indien mogelijk, dient te worden getracht om de dosis inhalatiecorticosteroïden te verminderen tot de laagste mogelijke waarde waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor medicijnen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Sommige medicijnen kunnen de effecten van Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler vergroten en het kan zijn dat uw arts u zorgvuldig wil controleren als u deze medicijnen gebruikt (waaronder enkele medicijnen voor hiv: ritonavir, cobicistat).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Tijdens de zwangerschap kunt u dit medicijn voor zover bekend zonder bezwaar volgens het voorschrift van de arts gebruiken. Het is altijd raadzaam medicijngebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding te bespreken met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit medicijn op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler bevat ethanol

Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler
VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDEREN
 De geadviseerde dosis voor mild tot matig astma is één tot twee puffes per dag. Deze dosis kan verhoogd worden tot 2 puffes per dag. Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot maximaal 8 puffes per dag. Uw arts kan dus in totaal 8 puffes per dag voorschrijven.

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER
 Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler wordt gebruikt om astma te behandelen. De geadviseerde dosis is één puffe tweemaal per dag.

Indien u een inhalator gebruikt welke **budesonide** bevat, moet u de dosis van Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler volgens het volgende schema:

Budesonide	200
QVAR	100

Indien u een inhalator met **fluticason** gebruikt, moet u de dosis van Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler tot een maximum van 800 microgram per dag gebruiken.

Wijze van gebruik / hoe vaak in te nemen / dosering
 U dient dit medicijn regelmatig te gebruiken, derhalve alleen te stoppen wanneer uw arts u dat adviseert. Indien u van mening bent dat uw behandeling niet voldoende is, neem dan contact op met uw arts. Vraag uw arts om een nieuw recept voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn.

Als u merkt dat Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler niet werkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Het is belangrijk dat u de dosis gebruikt zoals u wordt geadviseerd. U mag de dosis niet verhogen.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Indien u vergeet uw puffe(s) op het gebruikelijke tijdstip te gebruiken, gebruik het niet. Indien u van mening bent dat u de dosis niet hebt gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis te compenseren.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

U dient dit medicijn regelmatig te gebruiken, derhalve eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.

- In een enkel geval kunnen heesheid, keelontsteking of hoest optreden. Dit kunt u tegengaan door na het gebruik van de inhalator water te drinken.
- Misselijkheid.
- Systemische effecten zoals remming van de groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar en verhoogde oogdruk (komt vooral voor bij hoge doses).
- Overgevoeligheidsreacties zoals rode plekken op de huid en slijmvliezen (bijv. oog, gezicht).
- Verstoorde slaap, depressie of een gevoel van angst. Deze effecten komen vaak voor bij hoge doses.
- Wazig zien.

Soms zult u kort na een inhalatie erg moeten hoesten. Het is niet nodig te stoppen met het gebruik van dit medicijn. Het is raadzaam contact opnemen met uw arts.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.centrumlareb.nl. Het is belangrijk informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. HOE BEWAART U DIT MEDICIJN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C, ter bescherming tegen vrieskou. Niet in de vriezer bewaren. De aërosol staat niet open.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste gebruiksdatum na 'EXP.'. Daar staat een maand en een jaar.

In het register ingeschreven onder

Qvar Extrafijne Aërosol 50 Autohaler, 50 microgram/dosis, aërosol, oplossing
RVG 129574//21939 L.v.h.: België


Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler, 100 microgram/dosis, aërosol, oplossing
RVG 129575//21940 L.v.h.: België

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2023.

GEBRUIKSAANWIJZING

Wanneer u uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler voor het eerst gebruikt of wanneer u hem gedurende 2 of meer weken niet gebruikt heeft, dan dient u 2 puffes in de lucht te sprayen alvorens u zelf inhaleert.


1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te duwen (fig. 1).
2. Houd het mondstuk van u af en zet de hefboom recht omhoog (fig. 2).
3. Beweeg het schuifje aan de onderzijde van de Autohaler in de door de pijl aangegeven richting waardoor het eerste puffje wordt afgegeven (fig. 3).
4. Voor de afgifte van het tweede puffje brengt u de hefboom naar beneden en herhaalt u stap 2 en 3. Na de afgifte van het tweede puffje brengt u de hefboom weer naar beneden, zodat u uw medicijn in kunt nemen.



Gebruik het schuifje aan de onderzijde niet om uw medicijn in te nemen, aangezien de Autohaler het puffje automatisch vrijgeeft op het moment dat u inademt.

Hieronder volgen de aanwijzingen om een puffje te nemen:

1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te duwen (fig. 1).
2. Houd de Autohaler rechtop en duw de hefboom omhoog (fig. 2). Zorg ervoor dat de luchtspleten aan de onderzijde van de inhalator vrij blijven.
3. Adem zo ver mogelijk uit en sluit dan meteen uw lippen stevig om het mondstuk (fig. 3, 4).
4. Adem langzaam en diep in door het mondstuk. Stop niet met inademen wanneer u een lichte klik hoort, deze geeft alleen aan dat de dosis afgegeven is, en ga door met inademen tot uw longen vol zijn.
5. Houd uw adem gedurende 10 seconden vast en adem langzaam uit (fig. 5). De hefboom moet na elk puffje weer in de horizontale stand gebracht worden (fig. 6). Wanneer uw arts meer dan één dosis voorgeschreven heeft, dient u stap 2-5 te herhalen. Na gebruik dient het beschermkapje teruggeplaatst te worden op het mondstuk.



Hoe constateert u dat uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler leeg is?

Wanneer uw Autohaler leeg is, voelt of hoort u geen drijfgas meer vrijkomen.

De verzorging van uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler

Schoonmaakinstructies:

Het verdient aanbeveling het mondstuk van uw Autohaler wekelijks te reinigen met een schoon, droog tissue of doekje. Uw Autohaler mag niet met water gewassen worden. Duw geen doekje of een ander voorwerp in het inwendige van de Autohaler omdat hij hierdoor kan beschadigen.

Overige informatie