

**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**  
*Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Sarixell 400 mg zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.*

- *Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.*
- *Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.*
- *Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.*

*Inhoud van deze bijsluiter*

- 1. Wat is Sarixell 400 mg en waarvoor wordt het gebruikt?*
- 2. Wat u moet weten voordat u Sarixell 400 mg gebruikt*
- 3. Hoe wordt Sarixell 400 mg gebruikt?*
- 4. Mogelijke bijwerkingen*
- 5. Hoe bewaart u Sarixell 400 mg?*

*SARIXELL® 400 mg, filmomhulde tabletten*

<u>Werkzaam bestanddeel:</u>	ibuprofen (400 mg), aanwezig in de vorm van ibuprofennatrium dihydraat.
<u>Andere bestanddelen (hulpstoffen):</u>	polyvidon (E1201), natriumwaterstofcarbonaat (E500), hypromellose (E464), lactosemonohydraat, polyethyleenglycol, titaandioxide (E171).

*Registratiehouder:* Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp  
*Voor inlichtingen:* Consumer Health Division, Postbus 88, 2130 AB Hoofddorp

*In het register ingeschreven onder RVG 28937.*

**1. Wat is Sarixell 400 mg en waarvoor wordt het gebruikt?**

Sarixell 400 mg is een geneesmiddel in de vorm van witte, ovale filmomhulde tabletten met een breukstreep. Het bevat ibuprofen in de vorm van ibuprofennatrium dihydraat om snelle opname in het lichaam mogelijk te maken. Sarixell 400 mg is verkrijgbaar in verpakkingen met 3, 10, 20, 30, 40 of 50 tabletten in blisterverpakking of in een plastic potje. Niet alle genoemde verpakkingsvormen worden in de handel gebracht.

Sarixell 400 mg behoort tot de groep van non-steroidal anti-inflammatoire drugs (NSAID's) die pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben.

Sarixell 400 mg kan men gebruiken ter verlichting van hoofdpijn, verlichting van migraine, spierpijn en pijn in de gewrichten, spit, menstratiepijn, kiespijn, pijn na

tandheelkundige ingrepen, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie.

## **2. Wat u moet weten voordat u Sarixell 400 mg gebruikt**

### **Gebruik Sarixell 400 mg niet**

- wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen, acetylsalicylzuur of andere koortsverlagende en ontstekingsremmende medicatie (NSAID's);
- als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten, een loopneus of zwelling van het gezicht na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur (aspirine) of andere soortgelijke pijnstillers (NSAID's);
- wanneer u eerder last heeft gehad van een maagdarmbloeding of perforatie na eerder gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's);
- wanneer u een actieve of in het verleden meer dan tweemaal terugkerende (recidiverende) maagzweer of een zweer in de twaalfvingerige darm heeft (gehad), terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed, maag-darmbloeding of andere bloedingen zoals een hersenbloeding;
- wanneer de werking van uw nieren en/of lever sterk is verminderd;
- wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen;
- wanneer u neiging tot bloedingen heeft of met antistollingsmiddelen wordt behandeld;
- wanneer u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent.

### **Wees extra voorzichtig met Sarixell 400 mg**

- wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft;
- wanneer u astma heeft of gehad heeft, of een allergische aandoening, omdat er benauwdheid kan optreden;
- als u lijdt aan systemische lupus erythematosus (SLE) of gemengde bindweefselziekte (mixed connective tissue disease);
- wanneer uw algehele conditie achteruit gaat;
- wanneer u vermoedt dat u een infectie heeft, omdat ibuprofen de objectieve en subjectieve ontstekingsverschijnselen kan maskeren waardoor eventuele infecties verborgen zouden kunnen blijven;
- wanneer u ouder bent;
- wanneer u last heeft van een hoge bloeddruk (hypertensie) of hartaandoeningen.
- Bij het optreden van bloedbeeldafwijkingen of aanzienlijke leverfunctiestoornis dient de behandeling met ibuprofen te worden gestaakt.

De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

Waarop moet u verder letten voorafgaand aan het gebruik van dit middel?

### **Maagdarm effecten**

Sarixell 400mg dient niet tegelijkertijd met andere pijnstillers uit groep pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID's) inclusief COX-2 remmers te worden gebruikt.

*Ouderen:* ouderen hebben meer risico op bijwerkingen bij het gebruik van pijnstillers uit de groep pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID's) met name op maagdarmbloedingen en perforatie.

*Maagdarmbloeding, zweervorming en perforatie:* Deze kunnen in de maag of darmen zonder waarschuwing ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn.

De kans op maagdarmbloedingen, zweervorming en perforatie neemt toe naarmate de dosis ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe wanneer er al eerder een zweervorming is opgetreden en bij ouderen (zie "Gebruik van Sarixell in combinatie met andere geneesmiddelen")

*Effect op het hart, bloedvaten en de hersenen*

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals Sarixell 400 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

- hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
- hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

### **Huidreacties**

Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn. Zie rubriek 4.

### **Overige opmerkingen**

Tijdens waterpokken wordt aangeraden het gebruik van Sarixell 400 mg te vermijden.

Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hoofdpijn, kan de hoofdpijn verergeren. Als u dit ervaart, of vermoedt, dan moet u stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

## **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

### **Vruchtbaarheid**

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAID's) die bij gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.

### **Zwangerschap**

Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap mag ibuprofen niet worden gebruikt tenzij dit strikt noodzakelijk is. Wanneer u zwanger probeert te worden of tijdens eerste en tweede trimester van de zwangerschap dient u de dosering zo lang mogelijk te houden. Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

### **Borstvoeding**

De werkzame bestanddelen van Sarixell 400 mg gaan over in de moedermelk. U mag Sarixell 400 mg niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft. Raadpleeg daarom eerst uw arts voordat u besluit Sarixell 400 mg te gebruiken als u borstvoeding geeft. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Sarixell 400 mg beïnvloedt de rijvaardigheid niet. In geval van duizeligheid bij het gebruik van ibuprofen wordt het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van potentieel gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden afgeraden.

### **Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Sarixell 400 mg**

Dit geneesmiddel bevat 72 mg natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdiet.

### **Gebruik van Sarixell 400 mg in combinatie met andere geneesmiddelen**

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan anticoagulantia (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bèta-blokkers zoals atenolol, angiotensine-II receptor-antagonisten, zoals losartan) en enkele andere middelen, kunnen ook invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel niet als u ook acetylsalicylzuur (aspirine) gebruikt in een dosis boven 75 mg per dag, of als u andere NSAID's (ontstekingsremmers en pijnstillers) gebruikt, omdat dit de kans op bijwerkingen kan verhogen. Als u een lage dosering acetylsalicylzuur gebruikt (maximaal 75 mg per dag), bespreek dat dan met uw arts voordat u Sarixell 400 mg gaat gebruiken.

Gebruikt u naast Sarixell 400 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Vertel het vooral als u een van de volgende middelen gebruikt:

- bloedverdunders of antistollingsmiddelen (anticoagulantia), zoals warfarine en ticlopidine;
- glucocorticosteroiden, omdat ze de kans op maagdarmszweren of -bloedingen kunnen verhogen;
- lithium (een geneesmiddel voor manisch-depressieve psychose en depressie), omdat ibuprofen het effect van lithium kan versterken;
- trombocytenuitstroomremmers en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), omdat deze de kans op bijwerkingen op de maag en darmen kunnen verhogen;
- methotrexaat (een geneesmiddel voor kanker of reuma), omdat het effect van methotrexaat versterkt kan worden;
- zidovudine: (een geneesmiddel voor de behandeling van hiv-infectie), omdat het gebruik van Nurofen kan leiden tot verhoogde kans op gewrichtsbloeding of een bloeding die leidt tot zwelling;
- ciclosporine en tacrolimus (voorkomen de afstoting van een transplantaat), omdat er een verhoogd risico voor de nieren zou kunnen zijn;
- geneesmiddelen voor hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers, angiotensine II-antagonisten) en diuretica (plaspillen), omdat NSAID's het effect van deze middelen kunnen verminderen, waardoor de kans op nierbeschadiging toeneemt;
- kaliumsparende diuretica, omdat de hoeveelheid kalium in het bloed kan toenemen;
- antibiotica uit de chinolongroep, omdat de kans op toevallen kan toenemen;
- hartglycosiden als digoxine (bij hartfalen), aangezien het effect van digoxine kan worden versterkt;
- mifepriston (wordt gebruikt voor zwangerschapsbeëindiging) omdat het effect verminderd kan zijn;
- sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen tegen diabetes), omdat er een wisselwerking met ibuprofen mogelijk is;
- probenecide en sufinpyrazon (geneesmiddelen tegen jicht), omdat ibuprofen dan langzamer door het lichaam wordt afgebroken;
- fenytoïne (bij epilepsie), aangezien het effect van fenytoïne kan worden versterkt.

### **3. Hoe wordt Sarixell 400 mg gebruikt?**

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

*Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar*

Bij symptomatische verlichting van migraine: 1 tablet per keer (1 tablet = 400 mg ibuprofen).

Bij overige toepassingen: ½ - 1 tablet per keer (1 tablet = 400 mg ibuprofen).

Wanneer nodig elke 4 tot 6 uur herhalen. Niet meer dan 3 tabletten (= 1200 mg ibuprofen) per 24 uur innemen.

Verdeel het innemen van de diverse doses zo gelijkmatig mogelijk over de dag.

*Kinderen jonger dan 12 jaar*

Sarixell 400 mg is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Raadpleeg uw arts.

*Wijze van gebruik*

De tablet tijdens of direct na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water doorslikken.

Gebruik pijnstillers zoals Sarixell 400 mg niet langer dan 14 dagen achtereen zonder een arts te raadplegen.

*In geval u bemerkt dat Sarixell 400 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

**Wat u moet doen wanneer u teveel Sarixell 400 mg heeft gebruikt**

Wanneer u teveel Sarixell 400 mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De volgende bijverschijnselen kunnen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken en diarree (mogelijk met bloed), hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid en gezichtsstoornissen.

**Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sarixell 400 mg in te nemen**

U kunt in dat geval de normale dosering op het door u gewenste tijdstip innemen. *Neem nooit een dubbele dosis van Sarixell 400 mg om zo de vergeten dosis in te halen.*

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals alle geneesmiddelen kan Sarixell 400 mg bijwerkingen veroorzaken.

Geneesmiddelen zoals Sarixell 400 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

De meest voorkomende bijwerkingen komen voor in het maag-darmstelsel. Maagzweren, perforaties of bloedingen, soms fataal, met name bij ouderen, kunnen voorkomen (zie: ‘Wat u moet weten voordat u Sarixell 400mg gebruikt’). Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid (flatulentie), verstopping (constipatie), gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), buikpijn, bloed in de ontlasting, bloedbraken, ontsteking van mondslijmvliezen, verergering van ontsteking van dikke darm en terugkerende, ernstige darmontsteking (ziekte van Crohn) zijn gemeld na inname. Minder vaak gemeld is darmontsteking.

Tijdens het gebruik van ibuprofen(natrium) zijn de volgende bijwerkingen waargenomen die niet altijd aanleiding gaven tot stoppen van het gebruik van ibuprofen(natrium).

*Incidenteel:*

Maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn of misselijkheid, hoofdpijn, overgevoeligheidsreacties gepaard gaand met galbulten en jeuk.

*Zelden:*

Diarree, winderigheid, verstopping, overgeven.

*Zeer zelden:*

Maag-darmzweren, soms met bloeding.

Vermindering van de urine uitscheiding en vasthouden van vocht (oedeem), acuut nierfalen, nierweefselafsterving (vooral bij langdurig gebruik).

Leveraandoeningen (vooral bij langdurig gebruik).

Bloedbeeldafwijkingen die kunnen leiden tot verschijnselen zoals koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige symptomen, oververmoeidheid, neus- en huidbloedingen.

Huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring of blaarvorming. Ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en ernstige, plotselinge allergische reactie met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

*Niet bekend:*

Een rode uitslag op uw huid met bultjes onder de huid en blaren. In de bultjes zit pus. De uitslag zit vooral bij uw huidplooien, romp en bovenste ledematen en gaan samen met koorts aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose AGEP). De huid kan gevoelig worden voor licht. Stop met het innemen van dit middel als u last krijgt van deze klachten en roep direct medische hulp in. Zie ook rubriek 2.

Gedurende behandeling met ibuprofen bij patiënten met bestaande auto-immuunziekten (systemische lupus erythematosus, mixed connective tissue disease) zijn in enkele gevallen symptomen als een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, koorts en desoriëntatie waargenomen.

Ernstige overgevoeligheidsreacties (verschijnselen kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand).

Verergering van asthma.

NSAIDs, zoals Sarixell 400 mg, kunnen in verband worden gebracht met oedeemvorming (gezwollen enkels en voeten), hoge bloeddruk en hartproblemen. Klachten waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen: oorsuizen, problemen met het zien en duizeligheid.

#### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. Hoe bewaart u Sarixell 400 mg?**

*Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.*

Bewaar Sarixell 400 mg tabletten in de originele verpakking.

**Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik Sarixell 400 mg niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter 'Niet te gebruiken na:' en op de doordrukstrip achter 'exp'.

*Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022*