

## Serevent 50 Diskus, inhalatiepoeder 50 microgram/dosis, voorverdeeld salmeterol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Serevent Diskus en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### 1. Wat is Serevent Diskus en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

- Serevent Diskus bevat het medicijn salmeterol. Dit is een langwerkende luchtwegverwijder. Deze helpt de luchtwegen van de longen open te houden, waardoor het gemakkelijker is om in en uit te ademen. De effecten kunnen gewoonlijk binnen 10 à 20 minuten worden gevoeld en houden gedurende 12 uur of langer aan.
- De arts heeft het voorgeschreven ter voorkoming van ademhalingsproblemen. Deze kunnen worden veroorzaakt door astma. Het regelmatig gebruiken van dit medicijn helpt astma-aanvallen voorkomen. Dit geldt ook voor inspanningsastma en nachtelijk astma.
- Het regelmatig gebruik van dit medicijn helpt ook ademhalingsproblemen als gevolg van andere longaandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) voorkomen.
- Dit medicijn helpt kortademigheid en een piepende ademhaling voorkomen. Het werkt niet als u al kortademig bent of al een piepende ademhaling hebt. In dat geval moet u een snelwerkend medicijn gebruiken zoals salbutamol.
- Dit medicijn wordt in een Diskus geleverd. U ademt het medicijn rechtstreeks via uw longen in.

Als u wordt behandeld voor astma moet u altijd naast een Serevent Diskus ook een steroid per inhalatie (blijven) gebruiken. Serevent kan niet de plaats innemen van een steroid.

### 2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- **Licht uw arts onmiddellijk in als uw astma of ademhaling verslechtert.** U ervaart misschien een piepende ademhaling, u bent benauwd of u moet meer van uw snelwerkende luchtwegverwijder gebruiken. In dat geval mag u het aantal inhalaties van dit medicijn niet verhogen. Uw aandoening kan erger worden en u kunt ernstig ziek worden. Neem contact op met uw arts; uw astmabehandeling moet wellicht worden aangepast.
- Als u dit medicijn krijgt voorgeschreven voor uw astma blijf dan de andere astma medicijnen die u gebruikt, zoals een steroid per inhalatie of steroidtabletten, innemen. Blijf dezelfde doseringen gebruiken als voorheen, tenzij uw arts anders zegt. Doe dit zelfs als u zich veel beter voelt. **Stop niet met het gebruik van uw steroiden per inhalatie (of eventuele steroidtabletten) als u Serevent gaat gebruiken.**
- Het kan zijn dat uw arts regelmatig uw gezondheid wil controleren als u een overactieve schildklier, diabetes mellitus (dit medicijn kan uw bloedglucose verhogen) of een hartaandoening, waaronder een onregelmatige of snelle hartslag, hebt.

### Gebruikt u nog andere medicijnen?

- Gebruikt u naast Serevent nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt voor medicijnen voor astma of alle andere medicijnen, die u zonder voorschrift kunt kopen. De reden is dat Serevent wellicht niet geschikt is voor gebruik met andere medicijnen.
- Voordat u Serevent gebruikt moet u uw arts informeren als u nu behandeld wordt voor schimmelinfecties met medicijnen die ketoconazol of itraconazol bevatten, of als u behandeld wordt voor HIV met ritonavir. Deze medicijnen kunnen het risico op bijwerkingen met Serevent verhogen, inclusief onregelmatige hartslag of kunnen bijwerkingen verergeren.
- Bètablokkers moeten worden vermeden als u Serevent gebruikt, tenzij uw arts u dit opdraagt. Bètablokkers, waaronder atenolol, propranolol en sotalol, worden meestal gebruikt voor hoge bloeddruk of andere hartaandoeningen. Licht uw arts in als u bètablokkers gebruikt of onlangs hebt gebruikt, ze kunnen de effecten van salmeterol verminderen of tenietdoen.
- Serevent kan de hoeveelheid kalium in uw bloed verlagen. Als dit gebeurt, voelt u wellicht een onregelmatige hartslag, spierzwakte of kramp. Dit komt eerder voor als u Serevent gebruikt in combinatie met medicijnen die worden gebruikt voor het behandelen van hoge bloeddruk (diuretica) en andere medicijnen die worden gebruikt voor het behandelen van ademhalingsproblemen, zoals theofylline of steroiden. Uw arts kan u vragen bloedtests te doen om de hoeveelheid kalium

### Volwassenen met chronische obstructieve

- De gebruikelijke startdosering is tweemaal

Niet van toepassing voor kinderen en jongeren

### Instructies voor een correct gebruik

- Uw arts, verpleegkundige of apotheker moet u uw Diskus. Zij moeten regelmatig controleren hoe u gebruikt zoals is voorgeschreven, kan dit anders als zou moeten. De Diskus bevat blisters met 5 en de nummers 5 tot 0 verschijnen in de over zijn. Zodra de teller op 0 staat, is uw

### Uw Diskus gebruiken

1. Om uw Diskus te openen, houdt u de buis vast en legt de duim van de andere hand op de buis. Het is mogelijk van u af. U zult een klik horen. Het is mogelijk in het mondstuk geopend.
2. Houd de Diskus met het mondstuk naar u toe en uw rechter- als linkerhand vasthouden. Schuift u de buis naar achteren. U hoort een klik. Dit plaatst de buis in het mondstuk. Iedere keer als het mondstuk wordt geopend wordt een blister binnen in de Diskus geopend om geïnhaleerd te worden. Speel niet met de blisters worden geopend en er medicijn v
3. Houd de Diskus van uw mond verwijderd. Adem niet in uw Diskus.
4. Zet het mondstuk aan uw lippen en adem het medicijn in de Diskus en niet door uw neus.

Haal de Diskus uit uw mond.

Houd uw adem in gedurende ongeveer 10 seconden. Het is mogelijk dat u veel moeite kunt. Adem langzaam uit. Het is mogelijk dat u het poeder op uw tong of op de juiste manier heeft gebruikt.

5. Spoel uw mond nadien met water en spuug het water uit de mond (spruw) en heesheid te voorkomen.
6. Om de Diskus te sluiten, schuift u de buis terug naar de uitgangspositie en is weer geopend.

### Uw Diskus schoonmaken

Maak het mondstuk van de Diskus met een

### Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Het is belangrijk de Diskus te gebruiken volgens de instructies. Het is mogelijk dat u dan aanbevolen, moet u uw arts of apotheker raadplegen. Het kan zijn dat u zich zwak en/of duizelig gaat voelen. U kunt d

### Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten medicijn op het voorgeschreven tijdstip.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van

### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Om de kans op bijwerkingen te verkleinen, moet u COPD te beheersen. De volgende bijwerkingen

### Allergische reacties: u kunt ervaren dat u

dit medicijn. U kunt een piepende ademhaling of een zwelling optreden (meestal van het gezicht)

## Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## 5. Hoe bewaart u dit medicijn?

### Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht (RVG 128220//18150).

Bewaren beneden 30°C (RVG 125727//18150 en RVG 126526//18150).

Bewaren op een droge plaats (RVG 125727//18150, RVG 126526//18150 en RVG 128220//18150).

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is salmeterol en elke inhalatie levert 50 microgram salmeterol.

- Elke Diskus bevat 60 inhalaties.
- De andere stof in dit medicijn is lactose (bevat melkeiwit).

### Hoe ziet Serevent Diskus eruit en wat zit er in een verpakking?

Inhalatiepoeder, voorverdeeld. De Diskus is verpakt in een kartonnen doosje met:

1 Diskus met 60 inhalaties.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder/ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V.

Artemisweg 232

8239 DE Lelystad

### Fabrikant:

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle 2, Rue Lavoisier 23

F-27000 Evreux, Frankrijk

(RVG 126526//18150, RVG 128220//18150,

en RVG 125727//18150)

### Ingeschreven in het register onder:

Serevent 50 Diskus, inhalatiepoeder 50 microgram/dosis, voorverdeeld

RVG 128220//18150 L.v.h.: Tsjechië

Serevent 50 Diskus, inhalatiepoeder 50 microgram/dosis, voorverdeeld

RVG 125727//18150 L.v.h.: Frankrijk

Serevent 50 Diskus, inhalatiepoeder 50 microgram/dosis, voorverdeeld

RVG 126526//18150 L.v.h.: Griekland

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2023.**