

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

AAS 150, 150 mg comprimidos
Ácido acetilsalicílico

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é AAS 150 e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar AAS 150
3. Como tomar AAS 150
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar o AAS 150
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é AAS 150 e para que é utilizado

O AAS 150 contém ácido acetilsalicílico em baixas dosagens e pertence ao grupo de medicamentos chamados antiagregantes plaquetários, que ajudam a prevenir a agregação das suas plaquetas sanguíneas (que são fragmentos de células que participam na coagulação sanguínea), prevenindo a formação de coágulos (trombos) sanguíneos.

É utilizado para ajudar a prevenir a formação de trombos em doentes que tiveram:

Acidente vascular cerebral

Ataque cardíaco

Cirurgia do bypass

Obstrução de um vaso sanguíneo (trombose ou embolismo) ou que tenham angina do peito

2. O que precisa de saber antes de tomar AAS 150

Estes comprimidos podem ser tomados por adultos e adolescentes com idade superior a 16 anos. No entanto, certas pessoas não devem tomar este medicamento ou devem primeiro consultar o seu médico ou farmacêutico.

Não tome AAS 150

Se tem alergia (hipersensibilidade) à aspirina (ácido acetilsalicílico) ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Se for alérgico a outros medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (também conhecidos como AINEs), que são usados para tratamento de dores e para reduzir

inflamações. (Se for alérgico pode ter tido falta de ar, comichão na pele ou corrimento nasal depois de ter tomado estes medicamentos).

Se tem asma.

Se tem uma úlcera no estômago, ou se já teve anteriormente.

Se tem hemofilia, outros distúrbios de coagulação sanguínea ou se está a tomar qualquer medicamento usado para tornar o sangue mais fluido.

Se tem gota.

Se está grávida ou a amamentar.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar AAS 150.

Informe o seu médico ou farmacêutico para saber se pode ou não tomar este medicamento se:

tem diabetes.

sofre de alguma doença alérgica.

tem problemas renais ou do fígado

sofre de desidratação.

tem uma condição chamada deficiência da glucose-6-fosfatase desidrogenase.

foi operado recentemente, incluindo uma operação dental.

está previsto ser operado dentro dos próximos 7 dias.

for idoso.

Se for realizar análises ao sangue, informe o seu médico que está a tomar aspirina (ácido acetilsalicílico).

Crianças e adolescentes

NÃO DÊ ESTE MEDICAMENTO A CRIANÇAS: é possível que a utilização da aspirina (ácido acetilsalicílico) esteja associada a uma doença muito rara em crianças, conhecida por Síndrome de Reye, que pode ser fatal. Por este motivo, as crianças com idade inferior a 16 anos não devem tomar aspirina (ácido acetilsalicílico), a não ser por indicação médica.

Outros medicamentos e AAS 150

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos que comprou sem receita médica:

Medicamentos usados para tornar o sangue mais fluido (como a varfarina).

Medicamentos para a diabetes (como a glibenclamida ou insulina).

Medicamentos utilizados para tratamento do cancro, problemas de pele ou reumáticos (como metotrexato).

Medicamentos para a gota (como a probenecida ou sulfimpirazona).

Medicamentos para o coração (como digoxina).

Medicamentos para epilepsia (como a fenitoína ou valproato de sódio).

Medicamentos para tratar a retenção de água, conhecidos como diuréticos (como a espironolactona ou acetazolamida).

Antibióticos (como as sulfonamidas).

Medicamentos usados para tratar doenças inflamatórias graves, conhecidos como esteróides (como prednisolona).

Medicamentos para interrupção da gravidez (como a mifepristone).

Medicamentos para tratamento da depressão.

Medicamentos para as dores e inflamações, incluindo medicamentos conhecidos como AINEs (anti-inflamatórios não esteróides), tal como o ibuprofeno.

Metamizol (substância para diminuir a dor e a febre) pode reduzir o efeito do ácido acetilsalicílico na agregação plaquetária (os glóbulos vermelhos colam-se entre si e formam coágulos sanguíneos) quando tomado concomitantemente. Por esta razão, esta associação deve ser tomada com precaução em doentes que tomam doses baixas de aspirina para a proteção cardíaca.

AAS 150 com álcool

Se bebe regularmente bebidas alcoólicas, este medicamento pode causar hemorragia no estômago.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

AAS 150 contém amarelo-sunset FCF (E110)

Este medicamento contém o corante amarelo-sunset FCF (E110), que pode causar reações alérgicas.

3. Como tomar AAS 150

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Tente tomar este medicamento regularmente sempre à mesma hora do dia.

Não tome mais do que a dose recomendada.

Adultos e adolescentes com idade superior a 16 anos: 1 comprimido por dia, antes ou durante as refeições e com uma bebida.

Se tomar mais AAS 150 do que deveria
Consulte o seu médico imediatamente.

Caso se tenha esquecido de tomar AAS 150

Se estiver próximo da hora de tomar o próximo comprimido, não tome o comprimido que se esqueceu.

Se não estiver próximo da hora de tomar o próximo comprimido, tome-o logo que se lembrar.

Não tome uma dose a dobrar para compensar um comprimido que se esqueceu de tomar.

SE UMA CRIANÇA INGERIR ESTES COMPRIMIDOS, PROCURE AJUDA MÉDICA IMEDIATAMENTE.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Caso tenha algum dos seguintes sintomas, pare de tomar imediatamente os comprimidos e consulte o seu médico imediatamente:

Reações alérgicas que se podem manifestar por:

- comichão, aparecimento de nódulos na pele
- corrimento nasal
- inchaço dos lábios, cara ou boca
- dificuldade em respirar
- Fezes escuras (ou melenas), fezes com sangue ou se estiver doente e aparecer sangue nas fezes.
- Sentir-se confuso (pode ocorrer raramente)
- Zumbidos nos ouvidos ou surdez (podem ocorrer raramente)

Outros efeitos indesejáveis podem ocorrer e não o incomodar. Mas se incomodarem fale com o seu farmacêutico:

- Reações na pele
- Sentir-se doente ou ficar doente
- Indigestão, dor ligeira
- Nódoas negras involuáres

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar AAS 150

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar na embalagem de origem.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na cartongem, após VAL/EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição do AAS 150

A substância ativa do AAS 150 é o ácido acetilsalicílico e cada comprimido contém 150 mg de ácido acetilsalicílico.

Os outros componentes são: ácido ascórbico (Vitamina C), celulose microcristalina, amido de milho, manitol (E421), ácido esteárico, sacarina sódica, aroma de laranja artificial, amarelo-sol FCF (E110), água purificada.

Qual o aspeto de AAS 150 e conteúdo da embalagem

Os comprimidos de AAS 150 são redondos, de cor laranja com a inscrição AAS numa das faces. Os comprimidos estão embalados em strips de alumínio, em embalagens contendo 20, 30 ou 40 comprimidos. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Perrigo Portugal, Lda.
Lagoas Park, Edifício 15, Piso 3
2740-262 Porto Salvo
Portugal

Fabricante:

Sofarimex Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Av. Das Indústrias – Alto de Colaride – Aqualva
2735 – 213 Cacém
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em