

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Acetilcisteína Farmoz, 40 mg/ml, solução oral
Acetilcisteína

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 a 7 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Acetilcisteína Farmoz e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Acetilcisteína Farmoz
3. Como tomar Acetilcisteína Farmoz
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Acetilcisteína Farmoz
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Acetilcisteína Farmoz e para que é utilizado

Acetilcisteína Farmoz está indicado como adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infeções respiratórias, em presença de hipersecreção brônquica.

A sua ação caracteriza-se pela diminuição da viscosidade da expetoração e melhoria da função mucociliar. Pelo seu carácter antioxidante, a acetilcisteína exerce uma ação protetora no aparelho respiratório, face aos fenómenos tóxicos que se desencadeiam pela libertação de diversas substâncias oxidantes (tóxicas).

Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 a 7 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Acetilcisteína Farmoz

Não tome Acetilcisteína Farmoz

- se tem alergia à acetilcisteína ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- se sofre de úlcera gastroduodenal;
- se estiver a ser medicado com nitroglicerina;
- em crianças com idade inferior a 2 anos.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Acetilcisteína Farmoz

- se é asmático ou tem crises de falta de ar (ver secção 4).
- se sofre de insuficiência respiratória grave.
- se se encontra debilitado. Neste caso pode ter o reflexo da tosse diminuído ou não ter força suficiente para tossir, não conseguindo expulsar a expetoração que se tornou menos viscosa e necessita de ser expulsa.
- se sofre de problemas gastroduodenais (estômago, intestino). Os mucolíticos, como têm a capacidade de destruir a barreira mucosa gástrica, deverão ser utilizados com precaução em indivíduos suscetíveis a úlceras gastroduodenais.

Crianças

Acetilcisteína Farmoz não deve ser tomado por crianças com idade inferior a 2 anos.

Outros medicamentos e Acetilcisteína Farmoz

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

A acetilcisteína pode interferir com:

- Nitroglicerina. A associação de acetilcisteína e nitroglicerina causa hipotensão significativa e dor de cabeça induzida pela nitroglicerina.
- Antitússicos e secantes de secreções, porque têm efeito contrário ao de Acetilcisteína Farmoz. Neste caso, não associar as duas medicações.
- Medicamentos contendo sais de ouro, cálcio ou ferro. Neste caso, a administração de acetilcisteína com estes medicamentos deve ser realizada a horas diferentes, devido a uma possível interação.
- Antibióticos do grupo das cefalosporinas. A acetilcisteína pode diminuir a quantidade de antibiótico que é absorvida, se administrada ao mesmo tempo, pelo que a administração deve ser efetuada a horas diferentes. No entanto, está demonstrado que a acetilcisteína não tem o mesmo comportamento com antibióticos tais como a amoxicilina, eritromicina, doxiciclina ou bacampicilina, nem com a associação amoxicilina + ác. clavulânico, podendo nestes casos, se necessário, ser administrada ao mesmo tempo.

Acetilcisteína Farmoz com alimentos e bebidas

Não se conhecem problemas relacionados com a administração de acetilcisteína e alimentos ou bebidas, pelo que pode ser tomado a qualquer refeição.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Embora não se tenha demonstrado que a acetilcisteína possua ação teratogénica, recomenda-se a sua administração com precaução durante a gravidez. De igual modo,

embora não se tenha demonstrado que a acetilcisteína se dissolva no leite materno, recomenda-se a sua administração com precaução durante a amamentação.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Acetilcisteína Farmoz contém para-hidroxibenzoato de metilo (E218) e o para-hidroxibenzoato de propilo (E216). Pode causar reações alérgicas (possivelmente retardadas).

Acetilcisteína Farmoz contém sorbitol. Este medicamento contém 1,8 g de sorbitol em cada 15 ml que é equivalente a 120 mg/ml.

O sorbitol é uma fonte de frutose. Se o seu médico lhe disse que tem (ou o seu filho tem) uma intolerância a alguns açúcares ou se foi diagnosticado com intolerância hereditária à frutose (IHF), uma doença genética rara em que a pessoa não consegue digerir a frutose, fale com o seu médico antes de você (ou o seu filho) tomar ou receber este medicamento.

Acetilcisteína Farmoz contém sódio. Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por 15 ml ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

Acetilcisteína Farmoz

É normal a presença de um leve cheiro a enxofre, uma vez que é próprio da acetilcisteína.

3. Como tomar Acetilcisteína Farmoz

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Acetilcisteína Farmoz pode ser tomada durante ou fora das refeições.

A dose recomendada é:

Adultos e crianças com mais de 12 anos:

- 600 mg (15 ml) de Acetilcisteína Farmoz uma vez por dia, de preferência à noite

ou

- 200 mg (5 ml) de Acetilcisteína Farmoz, 3 vezes por dia.

A dose máxima diária recomendada é 600 mg/dia.

Crianças dos 6 aos 12 anos:

- 300 a 400 mg (7,5 a 10 ml) de Acetilcisteína Farmoz, uma vez por dia, de preferência à noite

ou

- 100 mg (2,5 ml) de Acetilcisteína Farmoz 3 a 4 vezes por dia.

A dose máxima diária recomendada é 300 a 400 mg/dia.

Crianças dos 2 aos 6 anos:

- 300 mg (7,5 ml) de Acetilcisteína Farmoz, uma vez por dia, de preferência à noite ou

- 100 mg (2,5 ml) de Acetilcisteína Farmoz, 3 vezes por dia.

A dose máxima diária recomendada é 300 mg/dia.

Não administre este medicamento a crianças com menos de 2 anos.

Idosos:

Acetilcisteína Farmoz é apropriado para utilização no idoso. Recomenda-se precaução nos casos de existência de patologia ulcerosa péptica (ver “Não tome Acetilcisteína Farmoz” e ver “Advertências e precauções”).

Modo de administração

Meça a quantidade indicada de Acetilcisteína Farmoz com a ajuda do dispositivo de medida que se encontra na embalagem e beba de seguida. Feche bem o frasco após cada abertura.

Se tomar mais Acetilcisteína Farmoz do que deveria

A acetilcisteína foi administrada, no homem, em doses de até 500 mg/kg/dia sem se terem verificado efeitos secundários, pelo que é possível excluir a possibilidade de intoxicação por sobredosagem. No caso de se produzirem efeitos semelhantes aos descritos na secção 4. “Efeitos secundários possíveis” deverá contactar o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar Acetilcisteína Farmoz

Assim que se lembre que se esqueceu de tomar Acetilcisteína Farmoz, tome a dose em falta.

No entanto, caso a hora da próxima dose esteja próxima, não tome a dose em falta e mantenha o horário inicialmente previsto.

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Acetilcisteína Farmoz

A toma de Acetilcisteína Farmoz pode ser interrompida a qualquer momento.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Pare de tomar Acetilcisteína Farmoz e contacte o seu médico imediatamente se ocorrerem sinais de uma reação alérgica.

Pouco frequente (pode afetar até 1 em 100 pessoas)
reações alérgicas, com sinais como:
comichão, formação de urticária, erupção da pele
falta de ar
batimento cardíaco acelerado, descida da pressão arterial

Muito raro (pode afetar até 1 em 10.000 pessoas)
reações alérgicas graves, incluindo choque anafilático.

Outros efeitos secundários possíveis podem ocorrer com as seguintes frequências:

Pouco frequente (pode afetar até 1 em 100 pessoas)
dor de cabeça
febre
inflamação da mucosa oral
dor abdominal
náuseas, vômitos
diarreia
batimento cardíaco acelerado,
descida da pressão arterial
zumbidos nos ouvidos

Raro (pode afetar até 1 em cada 1.000 pessoas)
falta de ar
brôncoespasmo - predominantemente em doentes com sistema brônquico hiper-reativo na presença de asma brônquica
indigestão

Muito raro (pode afetar até 1 em 10.000 pessoas)
hemorragia, parcialmente relacionada com as reações de hipersensibilidade.

Muito raramente, a ocorrência de reações da pele graves, como síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica foi relatada em associação temporal com o uso de acetilcisteína. Na maioria destes casos, pelo menos um outro medicamento foi administrado em simultâneo, o que pode ter, eventualmente, aumentado os efeitos descritos.

Em caso de lesões recorrentes da pele e das mucosas, deve ser procurado aconselhamento médico urgente e parar imediatamente de tomar acetilcisteína.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Acetilcisteína Farmoz

Conservar a uma temperatura inferior a 30°C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo do frasco e na embalagem exterior, após "EXP.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

O prazo de validade após a primeira abertura do frasco é de 21 dias.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Acetilcisteína Farmoz

- A substância ativa é a acetilcisteína. Cada ml de solução oral contém 40 mg de acetilcisteína.
- Os outros componentes são sacarina sódica, sorbitol, líquido (não cristalizado), para-hidroxibenzoato de metilo (E218), para-hidroxibenzoato de propilo (E216), carmelose sódica, hidróxido de sódio (para ajuste de pH), edetato dissódico, aroma de morango e água purificada.

Qual o aspeto de Acetilcisteína Farmoz e conteúdo da embalagem

Acetilcisteína Farmoz apresenta-se como uma solução incolor a ligeiramente amarela e com aroma de morango.

Acetilcisteína Farmoz apresenta-se em frasco de vidro âmbar de 200 ml. Cada embalagem contém ainda um dispositivo de medida.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.
Rua da Tapada Grande, n.2
Abrunheira
2710-089 Sintra

Fabricante

Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lotes 8, 15 e 16
3450-232 Mortágua
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em