

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Ácido Valpróico Neogen 100 mg/ml solução injetável

Valproato de sódio

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos indesejáveis que tenha. Para saber como comunicar efeitos indesejáveis, veja o final da secção 4.

AVISO

Ácido Valpróico Neogen, ácido valpróico pode prejudicar gravemente o feto quando tomado durante a gravidez. Se é uma mulher em idade fértil, deve utilizar um método de controlo de natalidade efectivo (contraceção) sem interrupções durante todo o período de tratamento com Ácido Valpróico Neogen. O seu médico irá discutir isto consigo mas deve também seguir o conselho da secção 2 deste folheto.

Marque uma consulta urgente com o seu médico se quer ficar grávida ou se pensa que pode estar grávida.

Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen a não ser que o seu médico lhe diga para o fazer uma vez que a sua doença pode piorar.

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Conservar este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Ácido Valpróico Neogen e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Ácido Valpróico Neogen
3. Como utilizar Ácido Valpróico Neogen
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Ácido Valpróico Neogen
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Ácido Valpróico Neogen e para que é utilizado

O Ácido Valpróico Neogen pertence a um grupo de medicamentos utilizados no tratamento de epilepsia (generalizadas ou parciais associadas a crises do tipo: ausência,

mioclónica, tónico-clónica, atónica e mista; ou no quadro de epilepsias parciais: crises de sintomatologia simples ou complexa, crises secundariamente generalizadas, síndromes específicas (West, Lennox-Gastaut)).

O Ácido Valpróico Neogen está indicado em doentes nos quais a terapêutica oral não é temporariamente possível.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Ácido Valpróico Neogen

Não utilize Ácido Valpróico Neogen:

se tem alergia ao valproato de sódio ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6);

se tem hepatite ativa ou doença ativa do fígado;

se tem antecedentes pessoais ou familiares de hepatite grave, especialmente se for causada por medicamentos;

se tem porfiria hepática (uma doença metabólica bastante rara);

Perturbação bipolar

- Se está grávida, não deve utilizar Ácido Valpróico Neogen para a perturbação bipolar.

- Se é uma mulher que pode engravidar, não deve tomar Ácido Valpróico Neogen, para a perturbação bipolar, a não ser que utilize um método de controlo de natalidade eficaz (contraceção) durante todo o período de tratamento com Ácido Valpróico Neogen. Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen ou o seu contraceptivo, até ter discutido isto com o seu médico. O seu médico irá aconselhá-la melhor (ver secção abaixo "Gravidez, amamentação e fertilidade – Conselho importante para a mulher").

Epilepsia

- Se está grávida, não deve utilizar Ácido Valpróico Neogen para a epilepsia, a não ser que nenhum outro tratamento resulte.

- Se é uma mulher que pode engravidar, não deve tomar Ácido Valpróico Neogen para a epilepsia a não ser que utilize um método de controlo de natalidade eficaz (contraceção) durante todo o período de tratamento com Ácido Valpróico Neogen. Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen ou a sua contraceção, até discutir isto com o seu médico. O seu médico irá aconselhá-la melhor (ver secção abaixo "Gravidez, amamentação e fertilidade – Conselho importante para a mulher").

Se julga que sofre de algum destes problemas, ou se tem algumas dúvidas, consulte o seu médico antes de utilizar Ácido Valpróico Neogen;

se tem uma doença mitocondrial (exemplo: síndrome de Alpers-Huttenlocher) causada por um problema genético;

se tem patologias metabólicas, por exemplo patologia no ciclo da ureia.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico antes de usar Ácido Valpróico Neogen:

Se você ou a sua criança desenvolverem uma doença súbita, especialmente nos primeiros 6 meses de tratamento, e particularmente se inclui repetidamente vômitos, cansaço extremo, dor abdominal, sonolência, fraqueza, perda de apetite, dor no estômago, náuseas, icterícia (pele ou olhos de cor amarelada), inchaço das pernas, agravamento da epilepsia ou sentimento geral de não se sentir bem. Nestas

situações, deve informar o seu médico imediatamente. O Ácido Valpróico Neogen pode afetar o fígado (e raramente o pâncreas) num número pequeno de doentes;
Se o Ácido Valpróico Neogen for utilizado em crianças com menos de 3 anos que tomam outro anti-epilético ao mesmo tempo ou que sofram de outras doenças neurológicas ou metabólicas e casos graves de epilepsia;
Especialmente se a sua criança tem menos de 3 anos, o Ácido Valpróico Neogen não deverá ser administrado em simultâneo com outros medicamentos que contenham na sua composição ácido acetilsalicílico;
Se sofre de Lúpus Eritematoso (uma doença rara);
Se sofre de algum problema metabólico, particularmente alterações hereditárias de deficiência enzimática, tais como distúrbio no ciclo da ureia devido ao risco acrescido dos níveis de amónia no sangue;
Se sofre de alterações da função renal. O seu médico pode querer monitorizar os níveis de valproato de sódio ou adaptar a dose;
Se aumentar de peso, por aumento do apetite;
Um pequeno número de pessoas que iniciaram o tratamento com anti-epiléticos como o Ácido Valpróico Neogen teve pensamentos de autoagressão e suicídio. Se a qualquer momento tiver estes pensamentos deve contactar imediatamente o seu médico;
Se tem uma deficiência tipo II em carnitina palmitoiltransferase (CPT);
Se sabe da existência de uma doença mitocondrial na sua família causada por um problema genético;
Tal como acontece com outros medicamentos anti-epiléticos, as convulsões podem agravar-se ou aparecerem mais frequentemente enquanto toma este medicamento. Se isto acontecer contacte o seu médico imediatamente.

Outros medicamentos e Ácido Valpróico Neogen

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Alguns medicamentos podem influenciar o efeito do Ácido Valpróico Neogen ou vice-versa. Estes incluem:

Neurolépticos (utilizados no tratamento de distúrbios psicológicos);
Medicamentos utilizados no tratamento de depressão;
Benzodiazepinas, utilizadas no tratamento da ansiedade ou como comprimidos para dormir;
Outros medicamentos utilizados no tratamento de epilepsia incluindo fenobarbital, fenitoína, primidona, lamotrigina, carbamazepina, topiramato, felbamato;
Quetiapina, olanzapina (usado no tratamento de patologias psiquiátricas);
Zidovudina (utilizado no tratamento de infeções por HIV ou SIDA);
Mefloquina (utilizado na prevenção e no tratamento da malária);
Salicilatos (ver também secção "Advertências e precauções" na parte de crianças com menos de 3 anos);
Anticoagulantes (utilizado para prevenir a formação de coágulos);
Lítio;
Rufinamida;
Acetazolamida;
Inibidores de protease, tais como lopinavir, ritonavir (usados no tratamento do VIH);
Colestiramina;

Cimetidina (utilizado para tratar úlceras do estômago);
Eritromicina, rifampicina;
Carbapenemes tais como imipenem, panipenem e meropenem (antibióticos usados no tratamento de infecções bacterianas). A combinação de ácido valpróico com carbapenemes deve ser evitada, uma vez que pode levar à diminuição do efeito do valproato de sódio);
Propofol (usado para anestesia).

Estes medicamentos e outros poderão ser afetados pelo Ácido Valpróico Neogen, ou afetar o modo como atua. Poderá ter necessidade de reajustar a dose do seu medicamento, ou poderá ter necessidade de tomar medicamentos diferentes. O seu médico ou farmacêutico poderão aconselha-lo e dar-lhe mais informação sobre os medicamentos que deverá ter mais cuidado ou mesmo evitar durante o tratamento com Ácido Valpróico Neogen.

Ácido Valpróico Neogen com alimentos, bebidas e álcool
O Ácido Valpróico Neogen pode ser utilizado com alimentos e/ou bebidas. A ingestão de álcool durante o tratamento não é recomendada.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico antes de tomar este medicamento.

Conselho importante para a mulher

Perturbação bipolar

- Se está grávida, não deve utilizar Ácido Valpróico Neogen para a perturbação bipolar.
- Se é uma mulher que pode engravidar, não deve tomar Ácido Valpróico Neogen, para a perturbação bipolar, a não ser que utilize um método de controlo de natalidade eficaz (contraceção) durante todo o período de tratamento com Ácido Valpróico Neogen. Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen ou o seu contraceptivo, até ter discutido isto com o seu médico. O seu médico irá aconselhá-la melhor.

Epilepsia

- Se está grávida, não deve utilizar Ácido Valpróico Neogen para a epilepsia, a não ser que nenhum outro tratamento resulte.
- Se é uma mulher que pode engravidar, não deve tomar Ácido Valpróico Neogen para a epilepsia a não ser que utilize um método de controlo de natalidade eficaz (contraceção) durante todo o período de tratamento com Ácido Valpróico Neogen. Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen ou a sua contraceção, até discutir isto com o seu médico. O seu médico irá aconselhá-la melhor.

Riscos do valproato quando tomado durante a gravidez (independentemente da doença para a qual o valproato é utilizado)

Fale com o seu médico imediatamente se está a pensar engravidar ou se está grávida.

- O valproato apresenta risco se for tomado durante a gravidez. Quanto mais elevada for a dose, maiores os riscos, mas todas as doses têm um risco.

- Pode causar sérios defeitos congénitos e pode afetar a forma como a criança se desenvolve à medida que cresce. Os defeitos congénitos reportados com maior frequência incluem espinha bífida (onde os ossos da coluna vertebral não estão desenvolvidos devidamente); malformações faciais e cranianas; malformações coração, do rim, do trato urinário e dos órgãos sexuais; defeito dos nos membros e malformações múltiplas associadas, afetando vários órgãos e partes do corpo. Defeitos congénitos podem resultar em deficiências que podem ser graves.
- Foram reportadas malformações oculares em associação com outras malformações congénitas em crianças expostas ao valproato durante a gravidez. Estas malformações oculares podem afetar a visão.
- Se tomar valproato durante a gravidez tem um risco maior em relação às outras mulheres grávidas de ter uma criança com defeitos congénitos que requerem tratamento médico. Como o valproato tem sido utilizado há tantos anos, sabe-se que nas mulheres que tomam valproato cerca de 10 bebés em cada 100 terão defeitos congénitos. Isto compara-se com 2 a 3 bebés em cada 100 nascimentos em mulheres que não têm epilepsia.
- Estima-se que até 30-a-40% das crianças no pré-escolar, cujas mães tenham tomado valproato durante a gravidez, possam vir a ter problemas de desenvolvimento na infância. As crianças afectadas podem ter um andar e fala mais lentos, ser intelectualmente menos capazes do que as outras crianças-, e ter dificuldade com a linguagem e memória.
- Os distúrbios do espectro autista são mais frequentemente diagnosticados em crianças expostas ao valproato e há algumas evidências de que as crianças podem ser mais propensas a desenvolver sintomas de Perturbação da Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA).
- Antes de lhe prescrever este medicamento, o seu médico irá explicar-lhe o que pode acontecer ao seu bebé se engravidar enquanto está a tomar valproato. Se decidir mais tarde que quer engravidar, não deve parar de tomar o seu medicamento ou o seu método de contraceção até ter discutido isso com o seu médico.
- Se é pai ou cuidador de uma criança do sexo feminino tratada com valproato, deve entrar em contacto com o médico, quando a sua criança tiver a primeira menstruação enquanto toma valproato.

Questione o seu médico sobre a toma de ácido fólico quando tentar engravidar. O ácido fólico pode diminuir, no geral, o risco de espinha bífida e aborto prematuro que existe em qualquer gravidez. No entanto, é pouco provável que reduza o risco de defeitos congénitos associados à toma de valproato.

Por favor, escolha e leia a situação que se aplica a si de todas as situações descritas abaixo:

- ESTOU A INICIAR O TRATAMENTO COM ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN
- ESTOU A TOMAR ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN E NÃO ESTOU A PLANEAR ENGRAVIDAR
- ESTOU A TOMAR ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN E A PLANEAR ENGRAVIDAR
- ESTOU GRÁVIDA E A TOMAR ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN

ESTOU A INICIAR O TRATAMENTO COM ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN

Se é a primeira vez que lhe foi prescrito Ácido Valpróico Neogen, o seu médico ter-lhe-á explicado os riscos para o feto no caso de engravidar. Uma vez que pode engravidar, terá de garantir que utiliza um método contraceutivo eficaz sem interrupção durante o seu tratamento com Ácido Valpróico Neogen. Fale com o seu médico ou clínica de planeamento familiar se precisar de aconselhamento sobre contraceção.

Mensagens-chave:

- A gravidez deve ser excluída antes de iniciar o tratamento com Ácido Valpróico Neogen através do resultado de um teste de gravidez, confirmado pelo seu médico.
- Deve utilizar um método de controlo de natalidade efetivo (contraceção) durante todo o período de tratamento com Ácido Valpróico Neogen.
- Deve discutir os métodos de controlo de natalidade (contraceção) apropriados com o seu médico. O seu médico irá dar-lhe informação sobre prevenção da gravidez e poderá referenciá-la a um especialista para aconselhamento de controlo de natalidade.
- Deve ter consultas regulares (pelo menos anuais) com um especialista experiente no tratamento de perturbação bipolar ou epilepsia. Durante a consulta o seu médico irá garantir que tem consciência e que compreendeu todos os riscos e conselhos relacionados com o uso de valproato durante a gravidez.
- Avise o seu médico se planeia engravidar.

Avise o seu médico imediatamente se ficar grávida ou se pensa que pode estar grávida.

ESTOU A TOMAR ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN E NÃO ESTOU A PLANEAR ENGRAVIDAR

Se está a continuar o tratamento com Ácido Valpróico Neogen mas não planeia engravidar, certifique-se de que está a utilizar um método de contraceção eficaz sem interrupção durante todo o tratamento com Ácido Valpróico Neogen. Fale com o seu médico ou na clínica de planeamento familiar se precisar de aconselhamento sobre contraceção.

Mensagens-chave:

Deve utilizar um método de controlo de natalidade eficaz (contraceção) durante todo o tratamento com Ácido Valpróico Neogen.

- Deve discutir métodos de contraceção (controlo de natalidade) com o seu médico. O seu médico irá fornecer-lhe informação sobre prevenção da gravidez e poderá referenciá-la a um especialista para aconselhamento sobre controlo de natalidade.
- Deve ter consultas regulares (pelo menos anuais) com um especialista experiente no tratamento de perturbações bipolares ou epilepsia. Durante a consulta o seu

médico irá certificar-se de que está consciente e que compreendeu todos os riscos e conselhos relacionados com a utilização do valproato durante a gravidez.

- Avise o seu médico se planeia engravidar.
- Avise o seu médico imediatamente se ficar grávida ou se pensa que pode estar grávida.

ESTOU A TOMAR ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN E A PLANEAR ENGRAVIDAR

Se planeia engravidar, marque primeiro uma consulta com o seu médico.

Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen ou a sua contraceção, até ter discutido isto com o seu médico. O seu médico irá aconselhá-la melhor.

Os bebés nascidos de mães que tomaram valproato têm um sério risco de defeitos congénitos e problemas de desenvolvimento que podem ser seriamente debilitantes. O seu médico irá encaminhá-la para um especialista com experiência no tratamento da perturbação bipolar ou epilepsia, para que as opções de tratamento alternativas possam ser avaliadas no início. O seu especialista pode colocar vários planos de ação para que a sua gravidez decorra da forma mais tranquila possível e para que os riscos para si e para o feto sejam reduzidos o mais possível.

O seu especialista pode decidir alterar a dose de Ácido Valpróico Neogen ou alterar para outro medicamento, ou parar o tratamento com Ácido Valpróico Neogen, muito tempo antes de engravidar - isto é para garantir que a sua doença está estabilizada.

Questione o seu médico sobre a toma de ácido fólico quando planear engravidar. O ácido fólico pode diminuir em geral o risco de espinha bífida e aborto prematuro que existe em todas as gravidezes. No entanto, é pouco provável que vá reduzir o risco defeitos congénitos associados ao uso de valproato.

Mensagens-chave:

- Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen a não ser que o seu médico lhe diga para o fazer.
- Não pare de utilizar os métodos de controlo de natalidade (contraceção) antes de ter falado com o seu médico e terem trabalhado juntos num plano para garantir que a sua doença está controlada e que os riscos para o feto são reduzidos.
- Marque primeiro uma consulta com o seu médico. Durante esta consulta o seu médico irá garantir que está consciente e que compreendeu todos os riscos e conselhos relacionados com o uso de valproato durante a gravidez.
- O seu médico irá tentar alterar para outro medicamento, ou parar o tratamento com Ácido Valpróico Neogen muito tempo antes de engravidar.
- Marque uma consulta urgente com o seu médico se está grávida ou se pensa que pode estar grávida.

ESTOU GRÁVIDA E A TOMAR ÁCIDO VALPRÓICO NEOGEN

Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen, a não ser que o seu médico lhe diga para o fazer porque pode piorar a sua doença. Marque uma consulta urgente com o seu médico se está grávida ou se pensa que pode estar grávida. O seu médico irá aconselhá-la melhor.

Bebés que nasçam de mães que tomaram valproato têm um risco sério de defeitos congénitos e problemas de desenvolvimento que podem ser seriamente debilitantes.

Será referenciada a um especialista experiente no tratamento da perturbação bipolar ou epilepsia, para que possam ser avaliadas alternativas de tratamento.

Em circunstâncias excepcionais quando Ácido Valpróico Neogen é a única alternativa terapêutica disponível durante a gravidez, irá ser monitorizada de muito perto para gerir o seu estado e verificar o desenvolvimento do feto. Você e o seu parceiro poderão receber aconselhamento e apoio sobre a exposição ao valproato na gravidez.

Questione o seu médico sobre a toma de ácido fólico. O ácido fólico pode diminuir em geral o risco de espinha bífida e aborto precoce que existe em todas as gravidezes. No entanto, é pouco provável que vá reduzir o risco de defeitos congénitos associados ao uso de valproato.

Mensagens-chave:

- Marque uma consulta urgente com o seu médico se está grávida ou pensa que pode estar grávida.

Não pare de tomar Ácido Valpróico Neogen a não ser que o seu médico lhe diga para o fazer.

Certifique-se de que é referenciada para um especialista em tratamento de epilepsia ou perturbação bipolar para avaliar a necessidade de opções de tratamento alternativas.

Deverá receber aconselhamento sobre os riscos de Ácido Valpróico Neogen durante a gravidez, incluindo teratogenicidade e efeitos no desenvolvimento nas crianças.

Certifique-se de que é referenciada para um especialista para monitorização pré-natal para detetar possíveis ocorrências de malformações.

Certifique-se de que lê o guia do doente que irá receber do seu médico. O seu médico irá discutir o Formulário Anual de Reconhecimento de Risco e irá pedir-lhe para o assinar e guardar. Irá também receber o cartão do doente pelo seu farmacêutico para lhe lembrar dos riscos do valproato na gravidez.

Amamentação

Como apenas quantidades muito pequenas de Ácido Valpróico Neogen passam para o leite materno, geralmente não há risco para o bebé e o desmame normalmente não é necessário. No entanto deve discutir com o seu médico se deve amamentar o seu bebé.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Ácido Valpróico Neogen pode causar alguma sonolência ou tonturas em algumas pessoas, especialmente, no início do tratamento ou é tomado em associação com outros medicamentos antiepiléticos ou benzodiazepinas. Assegure-se que sabe como reage ao Ácido Valpróico Neogen antes de conduzir uma viatura, utilizar quaisquer ferramentas ou máquinas ou realizar outras atividades que se possam tornar perigosas se estiver com sono ou se se sentir tonto.

Ácido Valpróico Neogen contém sódio.

Este medicamento contém 0,6025 mmol (13,84 mg) de sódio em 1 ml de solução injetável. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio.

3. Como utilizar Ácido Valpróico Neogen

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

O tratamento com Ácido Valpróico Neogen deve ser iniciado e supervisionado por um médico especialista em tratamento de epilepsia ou perturbação bipolar.

Certifique-se sempre que tem consultas de rotina com o seu médico. Estas são muito importantes pois a dose que utiliza poderá ter que ser reajustada.

A dose habitual é estabelecida pelo seu médico, em função da idade e do peso do doente; no entanto deve ter-se em conta a grande suscetibilidade individual observada com o valproato.

A posologia ótima será determinada essencialmente em relação à resposta clínica obtida. A determinação dos níveis séricos pode ser considerada como complemento da vigilância clínica se o controlo das crises não for satisfatório, ou quando houver suspeitas da existência de efeitos indesejáveis. As concentrações séricas consideradas como terapêuticas estão normalmente compreendidas entre 40 e 100 mg/L (300-700 micromol/L) de valproato de sódio.

Doentes com problemas renais

O seu médico pode decidir ajustar a sua dose.

Modo de administração

Os doentes que estejam a ser tratados de forma satisfatória com ácido valpróico oral, podem

continuar a fazer a sua dose normal através de uma perfusão contínua ou repetida; como exemplo, um doente estabilizado com 25 mg/kg administrado diariamente deve continuar com uma perfusão de 1 mg/kg/hora.

A outros doentes pode ser inicialmente administrada uma injeção intravenosa lenta (durante 3 minutos), normalmente 15 mg/kg, seguida de uma infusão a uma perfusão de 1-2 mg/kg/hora, e ajustada de acordo com a resposta clínica.

A continuação da terapêutica utilizando a via oral deve ser considerada logo que possível, com a dose normalmente recomendada.

Caso esteja a tomar outro antiepilético, Ácido Valpróico Neogen deverá ser introduzido progressivamente até atingir a dose ótima em cerca de 2 semanas,

sendo as terapêuticas associadas reduzidas progressivamente até à sua total interrupção (ver secção " Outros medicamentos e Ácido Valpróico Neogen").

Foi demonstrado existir compatibilidade físico-química com as soluções seguintes:

Solução salina normal 0,9g/100 ml (Soro fisiológico)

Dextrose 5 g/100 ml

Solução de lactato de Ringer

Dextrose 10g/100 ml

Dextrose 20g/100 ml

Dextrose 30g/100 ml

Dextrose salina i.e. dextrose, 2,5g + NaCl, 0,172g para 100 ml

Bicarbonato de sódio, 0,14g/100 ml

Trometamol (THAM) 3,66g + NaCl 0,172g para 100 ml, a uma taxa de 400 mg de Ácido Valpróico Neogen em 500 ml de cada uma das soluções supramencionadas (exceto para o trometamol 250 ml).

O Ácido Valpróico Neogen deve ser diluído imediatamente antes de ser administrado, devendo as soluções de infusão que o contêm ser utilizadas num prazo de 24 horas. Qualquer porção não utilizada deve ser rejeitada.

A solução intravenosa é adequada para infusão em recipientes de PVC, polietileno ou de vidro.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

O Ácido Valpróico Neogen pode ser administrado diretamente por injeção intravenosa lenta ou por infusão, utilizando uma linha de separação intravenosa se houver outros fármacos para perfundir.

Utilizar Ácido Valpróico Neogen durante o tempo que o seu médico considere necessário e enquanto este lho receitar.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Ácido Valpróico Neogen é demasiado forte ou demasiado fraco.

Se utilizar mais Ácido Valpróico Neogen do que deveria

Uma sobredosagem de Ácido Valpróico Neogen poderá ser perigosa. Contacte o seu médico ou as urgências mais próximas, imediatamente.

Sinais de intoxicação aguda apresentam-se habitualmente sob a forma de coma, com hipotonia muscular, hiporeflexia, miose, diminuição da função respiratória, acidose metabólica.

Os sintomas podem no entanto variar e o reaparecimento de crises convulsivas foi referido em presença de taxas plasmáticas muito elevadas. Foram relatados casos de hipertensão intracraniana relacionados com edema cerebral. As medidas a tomar em meio hospitalar são sintomáticas: lavagem gástrica útil até 10 a 12 horas após a ingestão e vigilância cardiorrespiratória.

O medicamento com naloxona foi utilizado com sucesso em alguns casos isolados.

Caso se tenha esquecido de utilizar Ácido Valpróico Neogen

Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar. Continue a utilizar o medicamento de acordo com a indicação do seu médico. Caso se tenha esquecido de várias tomas contacte o seu médico de imediato.

Se parar de utilizar Ácido Valpróico Neogen

Não altere as tomas, nem deixe de utilizar Ácido Valpróico Neogen sem confirmar com o seu médico.

O seu estado pode agravar-se caso pare o tratamento com Ácido Valpróico Neogen sem aconselhamento médico.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Poderão ser raros (graves), mas na maioria dos casos não o são. Normalmente, os efeitos indesejáveis são reversíveis, mas também poderá necessitar de tratamento médico para alguns deles:

Vómitos, náuseas ou dores de estômago e diarreia poderão ocorrer especialmente no início do tratamento;

Dores de cabeça;

Tremores, sonolência, falta de equilíbrio quando andar;

Agressividade, agitação, distúrbios de atenção, comportamento anormal e hiperatividade motora;

Tonturas;

Sensação de formigueiro nas mãos e pés;

Ver, sentir e ouvir coisas que não estão lá (alucinações);

Reações na pele tais como rash;

Perda de cabelo transitória crescimento anormal do cabelo, textura anormal do cabelo, alteração na cor do cabelo;

Pilosidade excessiva, particularmente em mulheres, virilismo, acne (hiperandrogenismo);

Alterações nas unhas e leito ungueal (frequente);

Alterações no período menstrual;

Problemas de audição;

Problemas de gengivas (principalmente hipertrofia);

Boca ferida, inchaço da boca, úlceras na boca e sensação de ardor de boca (estomatite);

Movimentos rápidos e incontrolláveis dos olhos;

Reações alérgicas;

Inchaço de pés e pernas (edema);

Aumento de peso;

Obesidade (raro);

Problemas nos rins, enurese (perda de urina durante o sono) ou aumento da necessidade de urinar;

Diminuição da temperatura corporal;

Infertilidade no homem;

Perda de memória e distúrbios cognitivos;

Distúrbios de aprendizagem;

Visão dupla.

Foram reportados problemas ósseos incluindo osteopenia e osteoporose (desgaste dos ossos). Verifique com o seu médico ou farmacêutico se se encontra a tomar medicação antiepilética há muito tempo, tem história prévia de osteoporose ou toma esteróides.

Contacte o seu médico de imediato caso repare que tem alguns dos seguintes efeitos indesejáveis (considerados graves). Pode necessitar de cuidados médicos urgentes: Alteração dos seus níveis de consciência, comportamento bizarro (estranho) associado (ou não) a crises mais frequentes ou mais graves, perda de capacidade de orientação, particularmente se é tomado em simultâneo com medicamentos contendo fenobarbital e topiramato ou se a dose de Ácido Valpróico Neogen foi subitamente aumentada;

Vómitos repetidos, cansaço extremo, dor abdominal (consultar um médico de imediato para avaliação de possível quadro de pancreatite. No caso de confirmação de pancreatite o valproato de sódio deverá ser descontinuado), sonolência, fraqueza, perda de apetite, dores de estômago graves, náuseas, icterícia (cor amarelada da pele e/ou dos olhos), inchaço das pernas ou agravamento da sua epilepsia ou sentimento generalizado de que não se sente bem;

Problemas na coagulação do sangue;

Nódos negros ou hemorragias espontâneas;

Bolhas com descamamento da pele;

Diminuição grave da contagem de células sanguíneas brancas (leucócitos) ou insuficiência da medula óssea que, por vezes, se traduz em febres e dificuldade em respirar;

Confusão que pode ser devida a uma diminuição dos níveis de sódio no sangue;

Inchaço resultante de uma reação alérgica e que surge associado a vergões dolorosos e que dão comichão (mais frequentemente à volta dos olhos, lábios, garganta e, por vezes, mãos e pés);

Síndrome caracterizado pelo aparecimento de uma erupção cutânea, febre, alargamento dos gânglios linfáticos e com possíveis alterações nos outros órgãos e cuja origem é medicamentosa;

Hipoatividade da glândula tiroideia, podendo causar cansaço ou aumento de peso (Hipotiroidismo);

Reação alérgica, que causa dores nas articulações, erupções cutâneas e febre (Lúpus Eritematoso sistémico);

Manifestações extrapiramidais (movimentos involuntários);

Dificuldades em respirar e dor devido à inflamação dos pulmões (derrame pleural);

Dores musculares e fraqueza muscular (rabdomiólise);

Patologias dos rins;

Um aumento do número e da gravidade das convulsões.

Ácido Valpróico Neogen pode também causar uma redução na contagem de plaquetas ou de células sanguíneas vermelhas.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P.

através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Ácido Valpróico Neogen

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo, após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Ácido Valpróico Neogen é apenas para uma utilização única. A solução não utilizada deve ser rejeitada.

A estabilidade física e química após diluição foi demonstrada durante 24 horas a 2-8°C. Do ponto de vista microbiológico, a diluição deve ser utilizada imediatamente. Se não for utilizada imediatamente, os tempos de conservação durante a utilização e as suas condições antes da utilização são da responsabilidade do utilizador, não devendo exceder as 24 horas a 2-8°C, exceto se a diluição foi realizada em condições antissépticas validadas e controladas.

A solução deve ser inspecionada visualmente antes de ser utilizada. Apenas se devem utilizar soluções límpidas sem quaisquer partículas.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Ácido Valpróico Neogen

A substância ativa é valproato de sódio.

Cada ampola com 3 ml de solução contém 300 mg de valproato de sódio. Cada ampola com 4 ml de solução contém 400 mg de valproato de sódio. Cada ampola com 10 ml de solução contém 1000 mg de valproato de sódio. Cada ml de solução contém 100 mg de valproato de sódio.

Os outros excipientes são água para preparações injetáveis, fosfato monopotássico para ajuste do pH, fosfato dissódico dodeca-hidratado para ajuste do pH, e nitrogénio.

Qual o aspeto de Ácido Valpróico Neogen e conteúdo da embalagem
O Ácido Valpróico Neogen apresenta-se sob a forma de solução límpida e sem partículas.

Ácido Valpróico Neogen está disponível em ampolas de vidro transparente do tipo I com 5 e 10 ml de capacidade.

3 ml de solução está disponível em ampolas com 5 ml de capacidade. 4 ml de solução está disponível em ampolas com 5 ml de capacidade.

10 ml de solução está disponível em ampolas com 10 ml de capacidade. Dimensão das embalagens:
1, 4 ou 5 ampolas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E FABRICANTE

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Neogen NV
50 Square Marie Curie
1070 Anderlecht
Bélgica

Fabricante

LABIANA PHARMACEUTICALS SLU
C/ Casanova, 27-31
08757 Corbera de Llobregat Barcelona
Espanha

Este folheto foi revisto pela última vez em

Outras fontes de informação

Está disponível informação detalhada e atualizada sobre este produto ao digitalizar o código QR incluído no FI com um smartphone. A mesma informação está também disponível na seguinte URL:

<http://app7.infarmed.pt/infomed/pesquisa.php>

‘Código QR a ser incluído’