

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Airbufol Forspiro 160 microgramas/inalação + 4,5 microgramas/inalação, pó para inalação,
em recipiente unidose
Budesonida + fumarato de formoterol di-hidratado

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Airbufol Forspiro e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Airbufol Forspiro
3. Como utilizar Airbufol Forspiro
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Airbufol Forspiro
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Airbufol Forspiro e para que é utilizado

Airbufol Forspiro é um inalador utilizado para tratar:

- asma em adultos e adolescentes com 12-17 anos de idade
- sintomas de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) em adultos com idade igual ou superior a 18 anos.

Airbufol Forspiro contém dois medicamentos diferentes: budesonida e fumarato de formoterol di-hidratado.

- A budesonida pertence a um grupo de medicamentos chamados “corticosteroides”. Atua reduzindo e prevenindo o inchaço e inflamação dos seus pulmões
- O fumarato de formoterol di-hidratado pertence a um grupo de medicamentos denominados “agonistas dos β 2-adrenorreceptores de longa duração de ação” ou “broncodilatadores”. Atua relaxando os músculos das suas vias aéreas. Isto vai ajudá-lo a respirar mais facilmente.

Asma

Airbufol Forspiro pode ser receitado para a asma de duas formas diferentes:

- a) A algumas pessoas, podem ser receitados dois inaladores da asma: Airbufol Forspiro e um “inalador de alívio” diferente.
 - Utilizam o Airbufol Forspiro todos os dias. Isto ajuda a prevenir o aparecimento dos sintomas da asma.

- Utilizam o “inalador de alívio” quando têm sintomas de asma, para ajudar a voltar a respirar mais facilmente.
- b) A algumas pessoas é receitado Airbufof Forspiro como o seu único inalador da asma.
- Utilizam o Airbufof Forspiro todos os dias. Isto ajuda a prevenir o aparecimento dos sintomas da asma.
 - Também utilizam Airbufof Forspiro quando necessitam de doses adicionais para o alívio dos sintomas da asma, para ajudar a voltar a respirar mais facilmente. Não precisam de um inalador de alívio separado.

Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)

Airbufof Forspiro também pode ser utilizado para tratar os sintomas da DPOC em adultos. A DPOC é uma doença crónica caracterizada por dificuldades respiratórias contínuas causadas pelo estreitamento das vias aéreas dos pulmões, frequentemente acompanhada por tosse e catarro. Esta doença é frequentemente causada pelo tabagismo.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Airbufof Forspiro

Não utilize Airbufof Forspiro:

- se tem alergia à budesonida, ao formoterol ou ao outro componente deste medicamento, que é a lactose (que contém pequenas quantidades de proteínas do leite).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Airbufof Forspiro se:

- é diabético.
- tem uma infeção nos pulmões.
- tem tensão arterial elevada ou já teve problemas do coração (incluindo batimento cardíaco irregular, pulsação muito rápida, estreitamento das artérias ou insuficiência cardíaca).
- tem problemas na tiroide ou glândulas suprarrenais.
- tem níveis baixos de potássio no sangue.
- tem problemas graves do fígado.

Contacte o seu médico se apresentar visão turva ou outras perturbações visuais.

Outros medicamentos e Airbufof Forspiro

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.

Em particular, informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:

- Beta-bloqueadores (tais como o atenolol ou propranolol para a tensão arterial elevada), incluindo gotas para os olhos (tais como o timolol para o glaucoma).
- Medicamentos para o tratamento do batimento cardíaco rápido ou irregular (tais como a quinidina, disopiramida, procaínamida).
- Medicamentos para o tratamento das alergias, também denominados anti-histamínicos, como a terfenadina.
- Oxitocina, um medicamento para facilitar o parto.
- Procarbazina, um medicamento para o tratamento do cancro.

- Medicamentos como a digoxina, frequentemente utilizados para o tratamento da insuficiência cardíaca.
- Diuréticos (tais como a furosemida). Estes medicamentos são utilizados para tratar a tensão arterial elevada.
- Corticosteroides (tais como a prednisolona). Estes medicamentos são utilizados para o tratamento da inflamação ou para prevenir a rejeição de órgãos transplantados.
- Medicamentos à base de xantina (tais como a teofilina ou a aminofilina). Estes medicamentos são frequentemente utilizados para o tratamento da asma.
- Outros medicamentos para alargar as vias aéreas, também chamados de broncodilatadores (tais como o salbutamol).
- Medicamentos para o tratamento da depressão, também denominados antidepressivos tricíclicos (tais como a amitriptilina) e o antidepressivo nefazodona.
- Medicamentos para tratar perturbações mentais, náuseas ou vômitos, denominados fenotiazinas (tais como a clorpromazina e procloroperazina).
- Medicamentos para tratar infeções fúngicas (tais como o cetoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol) e infeções bacterianas (tais como claritromicina e telitromicina, furazolidona).
- Medicamentos para a doença de Parkinson (tais como a levodopa).
- Medicamentos para problemas da tiroide (tais como a levotiroxina).
- Ritonavir, cobicistate (medicamentos para o tratamento da infeção pelo VIH). Os efeitos de Airbufol Forspiro podem ser aumentados e o seu médico pode querer vigiá-lo cuidadosamente.

Se alguma das situações acima descritas se aplicar a si, ou se não tem a certeza, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar o Airbufol Forspiro.

Informe também o seu médico ou farmacêutico se for fazer uma cirurgia ou tratamento dentário com anestesia geral.

Gravidez, amamentação e fertilidade

- Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico antes de utilizar Airbufol Forspiro - não utilize Airbufol Forspiro, a não ser que o seu médico lhe diga para o fazer.
- Se engravidar enquanto estiver a utilizar o Airbufol Forspiro, não pare de utilizar o Airbufol Forspiro mas fale com o seu médico imediatamente.
- Se está a amamentar, fale com o seu médico antes de utilizar Airbufol Forspiro.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Os efeitos de Airbufol Forspiro sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

Airbufol Forspiro contém lactose

Airbufol Forspiro contém lactose, que é um tipo de açúcar. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento. A quantidade de lactose presente neste medicamento não causa, normalmente, problemas em pessoas com intolerância à lactose.

O excipiente lactose contém pequenas quantidades de proteínas do leite, o que pode provocar reações alérgicas.

3. Como utilizar Airbufol Forspiro

- Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
- É importante utilizar Airbufol Forspiro todos os dias, mesmo que não tenha sintomas de asma ou DPOC nessa altura.
- Se estiver a utilizar Airbufol Forspiro para a asma, o seu médico vai querer avaliar os seus sintomas regularmente.

Se tem tomado comprimidos de corticosteroides para a sua asma ou DPOC, o seu médico poderá reduzir o número de comprimidos que toma quando começar a utilizar Airbufol Forspiro. Se estiver a tomar comprimidos de corticosteroides orais há muito tempo, o seu médico poderá querer que faça análises ao sangue regularmente. Ao reduzir os comprimidos de corticosteroides orais, poderá sentir um mal-estar geral mesmo que os seus sintomas no peito estejam a melhorar. Pode experienciar sintomas como nariz entupido ou corrimento nasal, fraqueza ou nas articulações ou muscularesse erupção cutânea (eczema). Se algum destes sintomas o incomodar, ou se ocorrerem sintomas como dor de cabeça, cansaço, náuseas (sentir-se enjoado) ou vômitos, contacte imediatamente o seu médico. Pode necessitar de tomar outro medicamento se desenvolver sintomas alérgicos ou de artrite. Deve falar com o seu médico se estiver preocupado em continuar a utilizar Airbufol Forspiro.

O seu médico pode considerar a possibilidade de adicionar comprimidos de corticosteroides ao seu tratamento habitual durante períodos de stress (por exemplo, se tiver uma infeção no peito ou antes de uma cirurgia)

Informação importante sobre os seus sintomas de asma ou DPOC Se sentir dificuldade em respirar ou pieira enquanto estiver a utilizar Airbufol Forspiro, deverá continuar a utilizar o Airbufol Forspiro, mas deve falar com o seu médico logo que possível, uma vez que pode necessitar de tratamento adicional.

Contacte imediatamente o seu médico se:

- A sua respiração piorar ou se acordar frequentemente durante a noite com asma.
- Se sentir um aperto no peito de manhã ou se sentir aperto no peito durante mais tempo do que o habitual.

Estes sinais podem significar que a sua asma ou DPOC não está adequadamente controlada e que pode necessitar imediatamente de um tratamento diferente ou adicional.

Asma

Airbufol Forspiro pode ser receitado para a asma de duas formas diferentes: A quantidade de Airbufol Forspiro que deve utilizar e quando utilizar dependem da forma como este medicamento lhe foi receitado.

- a) Se lhe foi receitado Airbufol Forspiro e um inalador de alívio separado, leia a secção intitulada “a) Utilizar Airbufol Forspiro e um inalador de alívio separado”.
- b) Se lhe foi receitado Airbufol Forspiro como único inalador, leia a secção intitulada “b) Utilizar Airbufol Forspiro como o seu único inalador para asma”.

- a) Utilizar Airbufol Forspiro e um inalador de alívio separado

Utilize o seu Airbufol Forspiro todos os dias. Isto ajuda a prevenir o aparecimento dos sintomas da asma.

Adultos (idade igual ou superior a 18 anos)

- A dose habitual é de 1 ou 2 inalações, duas vezes por dia.
- O seu médico pode aumentar para 4 inalações, duas vezes por dia.
- Se os seus sintomas estiverem bem controlados, o seu médico poderá pedir que utilize o seu medicamento uma vez por dia.

Adolescentes (12 a 17 anos de idade)

- A dose habitual é de 1 ou 2 inalações, duas vezes por dia.
- Se os seus sintomas estiverem bem controlados, o seu médico poderá pedir que utilize o seu medicamento uma vez por dia.

A utilização de Airbufol Forspiro em crianças com idade inferior a 12 anos não é recomendada.

O seu médico (ou enfermeiro da asma) irá ajudá-lo a gerir a sua asma. Eles irão ajustar a dose deste medicamento para a dose mais baixa que controla a sua asma. No entanto, não ajuste a dose sem falar primeiro com o seu médico (ou enfermeiro da asma).

Utilize o seu “inalador de alívio” separado para tratar os sintomas da asma.

Tenha sempre consigo o “inalador de alívio” para utilizar quando necessita. Não utilize o Airbufol Forspiro para tratar sintomas da asma – utilize o seu “inalador de alívio”.

b) Utilizar Airbufol Forspiro como único inalador da asma

Utilize Airbufol Forspiro desta forma apenas se o seu médico lhe tiver dito para o fazer e se tiver mais de 12 anos.

Utilize o seu Airbufol Forspiro todos os dias. Isto ajuda a prevenir o aparecimento dos sintomas da asma. Pode fazer:

- 1 inalação de manhã e 1 inalação à noite

ou

- 2 inalações de manhã

ou

- 2 inalações à noite

O seu médico pode aumentar para 2 inalações, duas vezes por dia.

Utilize também Airbufol Forspiro como “inalador de alívio” para tratar os sintomas da asma quando eles surgirem.

- Se sentir sintomas de asma, faça 1 inalação e aguarde alguns minutos.
- Se não se sentir melhor, faça outra inalação.
- Não faça mais de 6 inalações de uma só vez.

Tenha sempre consigo Airbufol Forspiro para que o possa utilizar quando necessita.

Geralmente não é necessária uma dose diária total superior a 8 inalações. Contudo, o seu médico pode permitir que faça até 12 inalações por dia, durante um período limitado.

Se necessita regularmente de utilizar mais de 8 inalações por dia, marque uma consulta com o seu médico ou enfermeiro. Pode ser necessário alterar o seu tratamento.

Não faça mais 12 inalações no total em 24 horas.

Se estiver a fazer exercício e desenvolver sintomas de asma, utilize Airbufol Forspiro tal como descrito nesta secção. Contudo, não utilize o Airbufol Forspiro imediatamente antes do exercício para evitar o aparecimento dos sintomas de asma.

Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)

- Para ser utilizado apenas por adultos (idade igual ou superior a 18 anos)
- A dose habitual é de 2 inalações, duas vezes por dia.

O seu médico pode também receitar outros medicamentos para alargar as vias aéreas, também chamados broncodilatadores (como brometo de tiotrópio ou brometo de ipratrópio) para a sua DPOC.

Instruções para utilização

O seu médico, enfermeiro ou farmacêutico irá demonstrar-lhe como utilizar o seu inalador e deverá verificar regularmente como o utiliza.


O inalador contém 60 doses de medicação em pó numa fita, enrolada, de folha metálica. Possui um contador de dose que mostra quantas doses ainda restam, em contagem decrescente de 60 até 0. Quando tiver alcançado as últimas 10 doses, os números irão aparecer sobre um fundo vermelho.

O inalador não é recarregável - elimine o inalador quando estiver vazio e substitua-o por um novo.

Tampa de proteção

Câmara lateral: A fita de alumínio fica aqui recolhida para remoção

Contador de dose: Quando abre a tampa de proteção, pode verificar quantas doses ainda restam




Alavanca branca: Utilize apenas esta alavanca quando estiver pronto para inalar uma dose.

Entradas de ar de ambos os lados do bucal

Antes de utilizar o inalador

- Abra a abertura lateral transparente da câmara.
- Remova cuidadosamente a fita de alumínio da câmara lateral rasgando todo o comprimento da fita contra o “dente” de lado da câmara, conforme mostrado abaixo. A fita não deve ser puxada ou arrancada.



- Feche a abertura da câmara lateral e elimine a fita usada.

Importante:


Enquanto utiliza o inalador, a câmara lateral encherá gradualmente com fita usada. As fitas de alumínio com barras negras não contêm medicação. Eventualmente, as seções numeradas da fita aparecerão na câmara lateral.

Nunca deve haver mais de 2 seções de fita de alumínio na câmara lateral, pois podem causar a obstrução do inalador. Rasgue a fita com cuidado, conforme mostrado acima, e elimine-a de forma segura.

Utilizar o inalador


O inalador deve ser segurado nas mãos, como se vê nas imagens.

1. Abrir




- Abra a tampa de proteção para baixo para mostrar o bucal.
- Verifique o contador de dose para ver quantas doses ainda restam.


2. Preparar a dose



- Levante a extremidade da alavanca branca. Certifique-se que a câmara lateral está fechada.
Lembre-se: A alavanca branca só deve ser acionada quando está pronto para inalar uma dose do medicamento. Se brincar com a alavanca branca, vai desperdiçar doses.



- Abrir: Mova a alavanca branca completamente, tanto quanto for possível e até se ouvir um clique. Esta ação move uma nova dose para a posição com o número no topo.



- Fechar: Em seguida, feche totalmente a alavanca branca de modo a que se encaixe na sua posição original (ouvirá um clique). O inalador está pronto para uso imediato.
3. Inalar
- Afastado do bucal do inalador, deve expirar tanto quanto lhe for confortável. Nunca expire para dentro do inalador, pois isso pode afetar a dose.
 - Segure o inalador direito, com a tampa de proteção a apontar para baixo.
 - Coloque o bucal entre os lábios e cerre-os firmemente.
 - Inspire constante e profundamente através do inalador e não pelo nariz.

Não tape as entradas de ar



- Retire o inalador da boca e retenha a respiração durante 5-10 segundos ou o tempo que for possível, sem lhe causar desconforto.
- Depois, expire lentamente, mas não para dentro do inalador.
- A tampa de proteção deve ser fechada sobre o bucal.
- Lave a boca com água e deite fora. Isto poderá ajudar a evitar que contraia uma infecção fúngica na boca e de ficar rouco.

Limpeza

- Limpe a parte externa do bucal com um pano limpo e seco, se necessário.
- Não tente retirar o inalador para limpá-lo ou para qualquer outra finalidade!
- Não utilize água ou toalhetes húmidos para limpar as peças do inalador pois a humidade pode afetar a dose!
- Nunca insira alfinetes ou outros objetos pontiagudos no bucal, ou em qualquer outra parte, pois isso pode danificar o inalador!

Se utilizar mais Airbufol Forspiro do que deveria

É importante que tome as suas doses conforme aconselhado pelo seu médico. Não deve exceder o número de doses que lhe foi prescrito sem procurar aconselhamento médico.

Os sintomas mais frequentes que podem ocorrer depois de utilizar mais Airbufol Forspiro do que deveria são tremores, dores de cabeça ou batimento cardíaco rápido ou irregular.

Caso se tenha esquecido de utilizar Airbufol Forspiro

- Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar, no entanto, se estiver quase na altura da sua próxima dose, não tome a dose esquecida.
- Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Se lhe acontecer qualquer uma das situações a seguir descritas, pare de utilizar o Airbufol Forspiro e fale imediatamente com o seu médico:

- Inchaço da face, particularmente à volta da boca (língua e/ou garganta e/ou dificuldade em engolir) ou urticária juntamente com dificuldades em respirar (angioedema) e/ou sensação repentina de desmaio. Isto pode significar que está a ter uma reação alérgica. Isto ocorre raramente (pode afetar até 1 em 1.000 pessoas).
- Pieira ou falta de ar súbitas, imediatamente após ter utilizado o seu inalador. Se ocorrer algum destes sintomas pare de utilizar Airbufol Forspiro imediatamente e utilize o seu “inalador de alívio”. Contacte o seu médico imediatamente pois pode ser necessário alterar o seu tratamento. Isto ocorre muito raramente (pode afetar até 1 em 10.000 pessoas)

Outros efeitos secundários possíveis:

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)

- Palpitações (sentir o seu batimento cardíaco), tremores ou estremelecimento. Caso estes efeitos ocorram, são geralmente ligeiros e desaparecem habitualmente, à medida que continuar a utilizar Airbufol Forspiro.
- Sapinhos (uma infeção fúngica) da boca. Se bochechar com água após utilizar Airbufol Forspiro, isto será menos frequente.
- Ligeira irritação da garganta, tosse e rouquidão.
- Dores de cabeça.
- Pneumonia (infeção no pulmão) em doentes com DPOC

Informe o seu médico se tiver qualquer uma das seguintes situações enquanto está a tomar Airbufol Forspiro pois podem ser sintomas de uma infeção nos pulmões:

- Febre ou arrepios
- Aumento da produção de muco, mudança da cor do muco
- Aumento da tosse ou aumento da dificuldade em respirar

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

- Sentir-se irrequieto, nervoso ou agitado.
- Perturbações do sono.
- Tonturas.
- Visão turva.
- Náuseas (enjoos).
- Batimento cardíaco rápido.
- Nódos negros.
- Cãibras musculares.
- Agressividade
- Ansiedade

Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas)

- Erupção cutânea, comichão
- Broncospasmo (aperto dos músculos das vias aéreas, o que causa pieira). Se a pieira surgir subitamente após utilizar Airbufol Forspiro, pare de utilizar Airbufol Forspiro e fale com o seu médico imediatamente.
- Níveis baixos de potássio no sangue.
- Batimento cardíaco irregular.

Muito raros (pode afetar até 1 em 10.000 pessoas)

- Depressão.
- Alterações do comportamento, especialmente em crianças.
- Dor no peito ou aperto no peito (angina de peito).
- Aumento dos níveis de açúcar (glucose) no sangue.
- Alterações do paladar, tais como um sabor desagradável na boca.
- Alterações da tensão arterial.
- Aumento de peso, face com a forma de lua, fraqueza, obesidade abdominal (síndrome de Cushing)

Os corticosteroides inalados podem afetar a produção normal de hormonas esteroides no seu organismo, particularmente se utilizar doses elevadas durante um longo período. Os efeitos incluem:

- alterações da densidade mineral óssea (diminuição da espessura dos ossos)
- cataratas (névoa do cristalino do olho)
- glaucoma (aumento da pressão no olho)
- abrandamento do ritmo de crescimento de crianças e adolescentes
- um efeito nas glândulas suprarrenais (pequenas glândulas próximas dos rins)
- manifestações cushingóides
- pode também ocorrer um aumento da suscetibilidade para infeções e redução da capacidade de adaptação ao stress.

Estes efeitos têm menor probabilidade de ocorrerem com corticosteroides inalados do que com comprimidos à base de corticosteroides.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Airbufol Forspiro

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Este medicamento não necessita de quaisquer condições especiais de conservação.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no rótulo do seu inalador, após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Airbufol Forspiro

- As substâncias ativas são a budesonida e o fumarato de formoterol di-hidratado. Cada dose inalada contém 160 microgramas de budesonida e 4,5 microgramas de fumarato de formoterol di-hidratado, isto equivale a uma dose calibrada (unidade contida no blister) de 194,7 microgramas de budesonida e 6,1 microgramas de fumarato de formoterol di-hidratado.
- O outro componente é a lactose mono-hidratada (contém proteínas do leite).

Qual o aspeto de Airbufol Forspiro e conteúdo da embalagem

Airbufol Forspiro é um inalador de plástico vermelho/branco que contém o seu medicamento. Cada inalador contém um blister de OPA/Al/PVC-Al com 60 doses de pó para inalação, em recipiente unidade. O pó para inalação é branco a esbranquiçado ou ligeiramente amarelo, sem aglomerados.

Airbufol Forspiro está disponível em embalagens de 1, 2 ou 6 inaladores, cada um com 60 doses.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Sandoz Farmacêutica, Lda.
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E
Taguspark
2740-255 Porto Salvo

Fabricante

Aeropharm GmbH
François-Mitterrand-Allee 1
07407 Rudolstadt
Alemanha

LEK Pharmaceuticals d.d
Verovškova ulica 57.
1526 Ljubljana
Eslovénia

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
Barleben, Sachsen-Anhalt 39179
Alemanha

Este folheto foi revisto pela última vez em

[A ser completado nacionalmente]