

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Amlodipina/Valsartan Macleods 5 mg + 160 mg comprimidos revestidos por película  
amlodipina / valsartan

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Amlodipina/Valsartan Macleods e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods
3. Como tomar Amlodipina/Valsartan Macleods
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Amlodipina/Valsartan Macleods
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Amlodipina/Valsartan Macleods e para que é utilizado

Os comprimidos de Amlodipina/Valsartan Macleods contêm duas substâncias chamadas amlodipina e valsartan. Ambas as substâncias ajudam a controlar a pressão arterial elevada.

A amlodipina pertence a um grupo de substâncias chamadas "bloqueadores dos canais de cálcio". A amlodipina impede o cálcio de se deslocar através das paredes dos vasos sanguíneos, o que impede que os vasos sanguíneos se estreitem.

O valsartan pertence a um grupo de substâncias chamadas "antagonistas dos recetores da angiotensina-II". A angiotensina II é produzida pelo organismo e provoca o estreitamento dos vasos sanguíneos, aumentando assim a pressão arterial. O valsartan funciona bloqueando o efeito da angiotensina II.

Isto significa que ambas as substâncias contribuem para impedir que os vasos sanguíneos se estreitem.

Consequentemente, os vasos sanguíneos relaxam e a pressão arterial sofre uma redução.

O Amlodipina/Valsartan Macleods é utilizado no tratamento da pressão arterial elevada em adultos cuja pressão arterial não esteja suficientemente controlada com amlodipina ou valsartan isoladamente.

## 2. O que precisa de saber antes de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods

Não tome Amlodipina/Valsartan Macleods

se tem alergia à amlodipina ou a qualquer outro bloqueador dos canais de cálcio. Isto pode provocar comichão, vermelhidão da pele ou dificuldade em respirar.

se tem alergia ao valsartan ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6). Se pensa que pode ser alérgico, fale com o seu médico antes de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods.

se tem problemas graves no fígado ou problemas na biliar, tais como cirrose biliar ou colestase.

se tiver mais do que três meses de gravidez. (Também é preferível não tomar Amlodipina/Valsartan Macleods no início da gravidez ver secção Gravidez).

se tiver pressão arterial baixa grave (hipotensão).

se tem estreitamento da válvula aórtica (estenose aórtica) ou choque cardiogénico (uma doença em que o coração não consegue fornecer sangue suficiente ao organismo).

se sofre de insuficiência cardíaca após enfarte do miocárdio.

se tem diabetes ou função renal diminuída e está a ser tratado com um medicamento que contém aliscireno para diminuir a pressão arterial.

Se alguma das situações acima descritas se aplicar a si, não tome Amlodipina/Valsartan Macleods e consulte o seu médico.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico antes de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods:

se esteve doente (vómitos ou diarreia).

se tem problemas no fígado ou nos rins.

se foi submetido a transplante renal ou se foi informado que sofre de estreitamento da artéria renal.

se tem um problema que afeta as suas glândulas suprenais, denominada "hiperaldosteronismo primário".

se teve insuficiência cardíaca ou teve enfarte do miocárdio. Siga cuidadosamente as instruções do seu médico sobre a dose inicial. O seu médico pode também verificar a sua função renal.

se o seu médico lhe disse que tem um estreitamento das válvulas cardíacas (situação denominada "estenose aórtica ou mitral") ou que a espessura do seu músculo cardíaco está aumentada de forma invulgar (situação denominada "cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva").

se já sentiu inchaço, particularmente da face e da garganta, enquanto tomava outros medicamentos (incluindo inibidores da enzima de conversão da angiotensina). Se sentir estes sintomas pare de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods e contacte o seu médico imediatamente. Não deve voltar a tomar Amlodipina/Valsartan Macleods.

se está a tomar algum dos seguintes medicamentos para tratar a tensão arterial elevada:

- um inibidor da ECA (por exemplo enalapril, lisinopril, ramipril), em particular se tiver problemas nos rins relacionados com diabetes.

aliscireno.

O seu médico pode verificar a sua função renal, pressão arterial e a quantidade de eletrólitos (por

exemplo, o potássio) no seu sangue em intervalos regulares.

Ver também a informação sob o título “Não tome Amlodipina/Valsartan Macleods”.

Se alguma destas situações se aplicar a si, informe o seu médico antes de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods.

#### Crianças e adolescentes

Não é recomendado o uso de Amlodipina/Valsartan Macleods em crianças e adolescentes (com menos de 18 anos de idade).

#### Outros medicamentos e Amlodipina/Valsartan Macleods

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos. O seu médico pode necessitar de alterar a dose e/ou tomar outras precauções. Em alguns casos, pode ter de interromper o tratamento com um dos medicamentos. Isto aplica-se em especial aos medicamentos abaixo descritos:

inibidores da ECA ou aliscireno (ver também informações sob os títulos “Não tome Amlodipina/Valsartan Macleods” e “Advertências e precauções”);  
diuréticos (um tipo de medicamento que aumenta a quantidade de urina produzida);  
lítio (um medicamento utilizado no tratamento de alguns tipos de depressão);  
diuréticos poupadores do potássio, suplementos de potássio, substitutos do sal contendo potássio e outras substâncias que possam aumentar os níveis de potássio;  
certos tipos de analgésicos denominados anti-inflamatórios não esteroides (AINE) ou inibidores seletivos da ciclooxigenase-2 (inibidores da COX-2). O seu médico pode também verificar a sua função renal;  
agentes anticonvulsivantes (ex. carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, fosfenitoína, primidona);  
hipericão;  
nitroglicerina e outros nitratos, ou outras substâncias chamadas “vasodilatadores”;  
medicamentos usados para o VIH/SIDA (ex: ritonavir, indinavir, nelfinavir);  
medicamentos usados para o tratamento de infeções fúngicas (ex.: cetoconazol, itraconazole);  
medicamentos usados para o tratamento de infeções bacterianas (tais como rifampicina, eritromicina, claritromicina, talitromicina);  
verapamilo, diltiazem (medicamentos do coração);  
sinvastatina (um medicamento usado para controlar os níveis altos de colesterol);  
dantroleno (perfusão para anomalias graves da temperatura corporal);  
medicamentos utilizados para proteção contra a rejeição de transplantes (ciclosporina).

#### Amlodipina/Valsartan Macleods com alimentos e bebidas

As pessoas a tomar Amlodipina/Valsartan Macleods não devem consumir toranjas ou sumo de toranja. Isto porque a toranja e o sumo de toranja podem levar a um aumento dos níveis no sangue da substância ativa amlodipina, que pode causar um aumento imprevisível no efeito de redução da pressão arterial de Amlodipina/Valsartan Macleods.

#### Gravidez e amamentação

##### Gravidez

Deve informar o seu médico se pensa que está (ou pode vir a estar) grávida. O seu médico normalmente aconselha-la-á a interromper Amlodipina/Valsartan Macleods

antes de engravidar ou assim que estiver grávida e a tomar outro medicamento em vez de Amlodipina/Valsartan Macleods. Amlodipina/Valsartan Macleods não está recomendado no início da gravidez (primeiros 3 meses), e não pode ser tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura.

#### Amamentação

Deverá informar o seu médico de que se encontra a amamentar ou que está prestes a iniciar o aleitamento.

Amlodipina/Valsartan Macleods não está recomendado em mães a amamentar, especialmente se o bebé for recém-nascido ou prematuro; nestes casos o seu médico poderá indicar outro tratamento.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

Este medicamento pode provocar-lhe tonturas. Isto pode afetar a sua capacidade de concentração. Assim, se desconhece o modo como este medicamento o afeta, não conduza, utilize maquinaria ou efetue outras atividades que requeiram concentração.

### 3. Como tomar Amlodipina/Valsartan Macleods

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. Isto contribuirá para obter os melhores resultados e diminuir o risco de efeitos secundários.

A dose habitual é de um comprimido por dia.

É preferível tomar o seu medicamento à mesma hora todos os dias.

Engula os comprimidos com um copo de água.

Pode tomar Amlodipina/Valsartan Macleods com ou sem alimentos. Não tome Amlodipina/Valsartan Macleods com toranja ou sumo de toranja.

Dependendo da sua resposta ao tratamento, o seu médico poderá receitar uma dose mais elevada ou mais baixa.

Não exceda a dose prescrita.

Amlodipina/Valsartan Macleods e pessoas idosas (com 65 anos de idade ou mais)

O seu médico deve ter precaução quando aumenta a dose.

Se tomar mais Amlodipina/Valsartan Macleods do que deveria

Se tomou demasiados comprimidos de Amlodipina/Valsartan Macleods, ou se alguém tomou os seus comprimidos, consulte imediatamente um médico.

O excesso de líquido pode acumular-se nos pulmões (edema pulmonar) provocando falta de ar que poderá desenvolver-se até 24-48 horas após a ingestão.

Caso se tenha esquecido de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods

Se se esqueceu de tomar este medicamento, tome-o assim que se lembrar. Depois tome a dose seguinte à hora habitual. No entanto, se for quase a hora da próxima

dose, omita a dose de que se esqueceu. Não tome uma dose a dobrar para compensar um comprimido que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Amlodipina/Valsartan Macleods

Parar o tratamento com Amlodipina/Valsartan Macleods pode causar o agravamento da sua doença. Não pare de tomar o seu medicamento a menos que o seu médico lhe diga para o fazer.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestam em todas as pessoas.

Alguns efeitos secundários podem ser graves e requerer cuidados médicos imediatos. Se alguma das situações seguintes acontecer, informe o seu médico imediatamente:

Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas):

Reação alérgica com sintomas como erupções cutâneas, comichão (prurido), inchaço da face, lábios ou língua, dificuldade em respirar, diminuição da pressão arterial (sensação de desmaio, cabeça oca).

Outros efeitos secundários possíveis

Se alguma das situações seguintes acontecer, informe o seu médico imediatamente

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas):

Síndrome gripal (gripe); nariz entupido (congestão nasal), inflamação da garganta e desconforto ao engolir; dor de cabeça; inchaço dos braços, mãos, pernas, tornozelos ou pés; cansaço; astenia (fraqueza); vermelhidão e sensação de calor na face e/ou pescoço.

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas):

Tonturas; náuseas e dor abdominal; boca seca; sonolência, formigueiro ou dormência das mãos ou pés; vertigens; aumento do batimento do coração incluindo palpitações; tonturas na posição vertical; tosse; diarreia; prisão de ventre (obstipação); erupções cutâneas, vermelhidão da pele; inchaço das articulações, dor nas costas; dor nas articulações.

Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas):

Sensação de ansiedade; ruídos nos ouvidos (acufenos); desmaio; aumento da frequência urinária ou sensação de urgência para urinar; incapacidade de atingir ou manter uma ereção; sensação de peso; diminuição da pressão arterial com sintomas como tonturas, cabeça oca; sudorese excessiva; erupção cutânea em todo o corpo; comichão (prurido); espasmos musculares.

Efeitos secundários comunicados com amlodipina ou valsartan isolados e não observados com Amlodipina / Valsartan Macleods ou observados com uma frequência mais elevada do que com Amlodipina / Valsartan Macleods:

## Amlodipina

Consulte imediatamente um médico se sentir qualquer um dos seguintes efeitos secundários graves, muito raros após tomar este medicamento:

Muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas):

Dificuldade respiratória súbita, dor no peito, falta de ar ou dificuldade em respirar.

Inchaço das pálpebras, face ou lábios.

Inchaço da língua e garganta, que pode provocar grandes dificuldades para respirar.

Reações cutâneas graves, incluindo erupção cutânea intensa, urticária, vermelhidão da pele ao longo de todo o seu corpo, comichão intensa, bolhas, descamação e inchaço da pele, inflamação das membranas mucosas (Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica) ou outras reações alérgicas.

Ataque cardíaco, batimentos cardíacos alterados.

Inflamação do pâncreas que pode causar dor grave abdominal e nas costas acompanhada de sensação de mal estar.

Os efeitos indesejáveis seguintes foram notificados. Se algum destes efeitos lhe provocar problemas

ou durar mais de uma semana, deverá falar com o seu médico:

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas):

Tonturas, sonolência; palpitações (consciência do seu batimento cardíaco); rubor, inchaço dos tornozelos (edema); dor abdominal, sensação de malestar (náusea).

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas):

Alterações do humor, ansiedade, depressão, insónias, tremores, alterações do paladar, desmaio, diminuição da sensação de dor; distúrbios da visão, perda de visão, zumbidos; pressão arterial baixa; espirros/corrimento nasal provocado por uma inflamação no revestimento do nariz (rinite); indigestão, vômitos; queda de cabelo, aumento da transpiração, comichão na pele, descoloração da pele; alterações na passagem da urina, aumento da necessidade de urinar à noite, aumento do número de vezes que urina; incapacidade de obter uma ereção, desconforto ou aumento das mamas nos homens, dor, má disposição, dor nos músculos, câibras; aumento ou diminuição de peso.

Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas):

Confusão.

Muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas):

Diminuição do número de células brancas do sangue, diminuição do número de plaquetas no sangue o que pode resultar num aumento pouco comum de nódos negros ou hemorragias (lesões nas células vermelhas do sangue); excesso de açúcar no sangue (hiperglicemia); inchaço das gengivas, inchaço abdominal (gastrite); alteração da função do fígado, inflamação do fígado (hepatite), amarelecimento da pele (icterícia), aumento das enzimas do fígado que poderão ter efeito sobre alguns exames médicos; aumento da tensão muscular; inflamação dos vasos sanguíneos, geralmente com erupções cutâneas, sensibilidade à luz; disfunções que combinam rigidez, tremor e/ou alterações no movimento.

## Valsartan

Se experimentar algum destes sintomas, informe imediatamente o seu médico:

Desconhecidos (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):  
Redução do número de glóbulos vermelhos, febre, inflamação da garganta ou da boca devidas a infeções; hemorragias ou formação de nódulos negros espontâneas; níveis elevados de potássio no sangue; alterações nos resultados de análises ao fígado; diminuição das funções renais e diminuição grave das funções renais; inchaço sobretudo da face e da garganta; dores musculares; erupção cutânea, manchas vermelho-arroxeadas na pele; febre; comichão; reação alérgica; formação de bolhas na pele (sinal de uma condição chamada dermatite bolhosa).

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através de:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão de Risco de medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa Tel: +351 21 798 71 40

Fax: +351 21 798 73 97

Sítio

da

internet:

<http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

## 5. Como conservar AMLODIPINA/VALSARTAN MACLEODS

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no embalagem exterior e blister. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não conservar acima de 30°C.

Não utilize qualquer embalagem de Amlodipina / Valsartan Macleods que esteja danificada ou que mostre sinais de adulteração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

## 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Amlodipina/Valsartan Macleods

As substâncias ativas são a amlodipina (como besilato de amlodipina) e o valsartan. Cada comprimido contém 5 mg de amlodipina e 160 mg de valsartan.

Os outros componentes são celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silicone coloidal, estearato de magnésio (núcleo do comprimido) e hipromelose, polietileno glicol, talco, dióxido de titânio (E171), óxido de ferro amarelo (E172) (revestimento).

Qual o aspeto de Amlodipina/Valsartan Macleods e conteúdo da embalagem

Comprimido revestido por película, biconvexo, oval, amarelo escuro, com impressão "C 94" numa face e lisa na outra face.

Apresentações: 14, 28, 30, 56, 90 ou 98 comprimidos revestidos por película.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
Macleods Pharma España S.L.U.  
Avenida Diagonal, 468, 6º, puerta A  
08006 Barcelona  
Espanña

Fabricante  
Synoptis Industrial Sp. z o.o.  
ul. Rabowicka 15  
62-020 Swarzędz , Polônia

Ou

HEUMANN PHARMA  
GmbH & Co. Generica KG  
Südwestpark 50 · 90449 Nürnberg

Ou

Accord Healthcare B.V.  
Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht  
Netherlands

Ou

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,  
ul. Lutomiarska 50, 95-200 Pabianice, Poland

Este folheto foi revisto pela última vez em 06/2022

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência INFARMED: <http://www.infarmed.pt/>