APROVADO EM
11-10-2019
INFARMED

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Analgil Bálsamo Analgésico 150 mg/g Pomada
Salicilato de metilo

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Analgil Bálsamo Analgésico com precaução para obter os devidos resultados.
-Conserve este folheto. Pode ter a necessidade de o reler.
-Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
-Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.
-Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico

Neste folheto:
1. O que é Analgil Bálsamo Analgésico e para que é utilizado.
2. Antes de utilizar Analgil Bálsamo Analgésico.
3. Como utilizar Analgil Bálsamo Analgésico
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Como conservar Analgil Bálsamo Analgésico.
6. Outras informações.

1. O QUE É Analgil Bálsamo Analgésico E PARA QUE É UTILIZADO

Grupo Farmacoterapêutico: 9.1.10 Aparelho locomotor. Anti-inflamatórios não esteroides. Anti-inflamatórios não esteroides para uso tópico.

Analgil Bálsamo Analgésico é um anti-inflamatório não esteroide para uso cutâneo utilizado nas dores musculares ligeiras a moderadas; nas contusões e nas dores pós-traumáticas.

2. ANTES DE UTILIZAR Analgil Bálsamo Analgésico

Não utilize Analgil Bálsamo Analgésico
Se tiver antecedentes de alergia ao ácido salicílico e aos seus derivados ou a qualquer um dos componentes da formulação.

Não aplique Analgil Bálsamo Analgésico pomada sobre os olhos e mucosas, feridas abertas, queimaduras e dermatoses, por isso deve-se lavar cuidadosamente as mãos, retirando o excedente da pomada, a fim de evitar qualquer contacto involuntário nessas partes.

Tome especial cuidado com Analgil Bálsamo Analgésico

APROVADO EM
11-10-2019
INFARMED

-Em caso de irritação cutânea, a aplicação do medicamento deve ser interrompida.
-Na persistência dos sinais e sintomas deverá consultar o seu médico assistente.
-A absorção sistémica aumenta com a extensão de superfície e quantidade aplicada.

Utilizar Analgil Bálsamo Analgésico com outros medicamentos
A absorção aumentada do salicilato de metilo pode ocorrer se for aplicada topicamente uma dose excessiva do produto, ou quando usado em áreas extensas por várias vezes, podendo assim potenciar a ação dos anticoagulantes orais, como a Varfarina. Recomenda-se então precaução especial em doentes a fazerem tratamento com anticoagulantes.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento
Se está grávida ou pretende ficar grávida, por medida de precaução não é recomendado utilizar Analgil Bálsamo Analgésico durante os três primeiros meses, embora não se tenham comprovado efeitos teratogénicos.

Se está a amamentar, não é aconselhado usar Analgil Bálsamo Analgésico enquanto estiver a amamentar.

Crianças
Analgil Bálsamo Analgésico não é adequado em crianças com menos de 12 anos

Idosos
Analgil Bálsamo Analgésico pode ser utilizado por pessoas idosas e por doentes com problemas no fígado e/ou dos rins.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Analgil Bálsamo Analgésico
Analgil Bálsamo Analgésico contém Propilenoglicol, o qual pode causar irritação cutânea.
Analgil Bálsamo Analgésico contém Lanolina, a qual pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).

3. COMO UTILIZAR Analgil Bálsamo Analgésico

Analgil Bálsamo Analgésico é destinado exclusivamente ao uso cutâneo.
A posologia deverá ser determinada pelo médico, embora se possa recomendar a seguinte posologia diária:

APROVADO EM
11-10-2019
INFARMED

Antes da aplicação de Analgil Bálsamo Analgésico, a pele deve ser previamente limpa com água e sabão.

Espalhar uma pequena porção de Analgil Bálsamo Analgésico na região dorida, friccionando durante algum tempo. Fazer duas a três aplicações por dia.

Deve ser esclarecido que a absorção do princípio ativo, salicilato de metilo, é aumentada na presença de calor, pensos oclusivos, lesões na pele e quando se fazem exercícios.

A duração do tratamento com Analgil Bálsamo Analgésico, depende da duração dos sintomas, ou da indicação médica.

Este medicamento não é adequado a crianças com menos de 12 anos.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Os efeitos indesejáveis incluem: irritação no local da aplicação, dermatite, rash cutâneo e urticária.

Como a formulação contém mentol e lanolina, há possibilidade de reações alérgicas.

No caso de aparecimento de reações alérgicas, deve interromper imediatamente o tratamento e consultar o seu médico.

Embora muito raros na aplicação tópica, também há possibilidade de sintomas de intoxicação sistémica (aguda e crónica) por salicilatos.

Caso detete efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Analgil Bálsamo Analgésico

Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não conservar acima de 30ºC. Conservar ao abrigo da luz.

Não utilize Analgil Bálsamo Analgésico após o prazo de validade indicado na bisnaga e na embalagem exterior a seguir à abreviatura utilizada para prazo de validade.

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. Não utilize Analgil Bálsamo Analgésico se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

APROVADO EM
11-10-2019
INFARMED

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Analgil Bálsamo Analgésico
A substância activa é o Salicilato de metilo. Cada grama de pomada contém 150 mg de Salicilato de metilo.
Os outros componentes são: Cânfora sintética, mentol, propilenoglicol, lanolina hidratada e vaselina branca.

Qual o aspecto de Analgil Bálsamo Analgésico e conteúdo da embalagem
Analgil Bálsamo Analgésico apresenta-se na forma farmacêutica de pomada, acondicionada em bisnagas de Alu.
Embalagem com 1 bisnaga contendo 20 g de pomada.
Embalagem com 1 bisnaga contendo 150 g de pomada.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular
Laboratórios Azevedos Indústria Farmacêutica S.A.
Estrada Nacional 117-2
2614-503 Amadora
Portugal

Fabricante
Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Avenida das Indústrias - Alto de Colaride - Agualva
2735-213 Cacém
Portugal

Este folheto foi aprovado pela última vez em 10/2019.