

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Bronquial-OM, 375mg + 60mg, cápsulas

Carbocisteína e Sobrerol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Bronquial-OM e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Bronquial-OM
3. Como tomar Bronquial-OM
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Bronquial-OM
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Bronquial-OM e para que é utilizado e para que é utilizado

Bronquial-OM é um fluidificante e expetorante das secreções brônquicas durante o tratamento das doenças respiratórias.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Bronquial-OM

Não tome Bronquial-OM

-se tem alergia à carbocisteína e/ou sobrerol ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

-se sofre de úlcera péptica ativa.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Bronquial-OM.

Outros medicamentos e Bronquial-OM

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Bronquial-OM com alimentos e bebidas

Não existem contra-indicações à utilização de Bronquial-OM com alimentos e bebidas.

#### Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

### 3. Como tomar Bronquial-OM

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.

A dose recomendada é:

Crianças entre 5 e 10 anos: 1 cápsula 2 vezes por dia

Adultos: 1 cápsula 3-4 vezes por dia.

#### Utilização em crianças

A utilização em crianças com menos de 5 anos deve ser feita apenas com indicação médica.

A duração máxima do tratamento deverá ser de 7 a 14 dias.

Se tomar mais Bronquial-OM do que deveria

Fale com o seu farmacêutico ou consulte o seu médico. Poder-se-á praticar a lavagem gástrica e promover a peristálise intestinal.

Caso se tenha esquecido de tomar Bronquial-OM

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

### 4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

O emprego de doses elevadas, superiores às aconselhadas, pode por vezes provocar aparecimento de perturbações no tubo digestivo, tais como: dores no estômago (gastralgias), náuseas e diarreias. Nestes casos, a posologia deverá ser reduzida.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

#### Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá

comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: + 351 21 798 73 73

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet:

<http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

## 5. Como conservar Bronquial-OM

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar na embalagem de origem.

Conservar a temperatura inferior a 25C°

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e interior, após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

## 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Bronquial-OM

As substâncias activas são a carbocisteína e o sobrerol

Os outros componentes são a

hidroxipropilcelulose e oestearato de magnésio.

Qual o aspecto de Bronquial-OM e conteúdo da embalagem

Embalagem de 20 cápsulas em blíster PVC/alumínio.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

OM PHARMA S.A.

R. da Indústria, 2, Quinta Grande

2610-088 Amadora - Lisboa - Portugal

tel: 21 470 85 00

fax: 21 470 85 06

Este folheto foi revisto pela última vez em

APROVADO EM  
21-07-2017  
INFARMED