

APROVADO EM
10-02-2023
INFARMED

FOLHETO INFORMATIVO

Folheto informativo: Informação para o doente

Brufen Liq 200 mg suspensão oral em saqueta

ibuprofeno

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

[Para medicamentos disponíveis sem receita médica:]

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

Adultos (mais de 18 anos): deve falar com um médico se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias com febre ou 5 dias com dor.

Crianças e adolescentes: deve falar com um médico se, em crianças e adolescentes, este medicamento for necessário durante mais de 3 dias, ou se os sintomas piorarem.

O que contém este folheto:

1. O que é Brufen Liq e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Brufen Liq
3. Como tomar Brufen Liq
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Brufen Liq
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Brufen Liq e para que é utilizado

A substância ativa (que faz o medicamento funcionar) é o ibuprofeno. Pertence a um grupo de medicamentos chamados anti-inflamatórios não esteroides (AINE). Brufen Liq reduz a febre e alivia a dor.

Brufen Liq é utilizado para o tratamento de curta duração da dor ligeira a moderada e/ou febre em adultos e crianças com idade superior a 6 anos (peso superior a 20 kg).

[Para medicamentos disponíveis sem receita médica:]

Brufen Liq é utilizado para o tratamento de curta duração da dor ligeira a moderada, tal como

- Dores de cabeça e enxaquecas
- Dor de dentes
- Dores menstruais
- Dores musculares, nas articulações e nas costas
- Febre quando tem uma constipação comum

Brufen Liq 200 mg é utilizado em adultos e crianças com idade superior a 6 anos (mais de 20 kg).

2. O que precisa de saber antes de tomar Brufen Liq

Não tome Brufen Liq

se tem alergia ao ibuprofeno ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6),

se alguma vez teve uma reação alérgica (como asma, erupção cutânea, cara ou lábios inchados ou falta de ar) ao ibuprofeno, ácido acetilsalicílico ou a outros AINE,

se sofre de insuficiência cardíaca grave,

se sofre de insuficiência hepática ou renal grave,

se tem uma hemorragia ativa ou tendência aumentada para hemorragia,

se tem (ou teve dois ou mais episódios de) uma úlcera gástrica, úlcera duodenal ou hemorragia,

se tem ou alguma vez teve uma úlcera ou hemorragia no estômago ou intestino delgado ao tomar AINE,

se está nos 3 últimos meses de gravidez.

Advertências e precauções

Para reduzir o risco de efeitos indesejáveis, utilize sempre a dose mais baixa possível e o tempo de tratamento mais curto possível. Doses superiores às recomendadas podem acarretar riscos. Isto também significa que deve ser evitada a associação de vários medicamentos AINE no mesmo período de administração.

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Brufen Liq:

se tem determinadas perturbações do sistema imunitário (perturbações mistas do tecido conjuntivo e lúpus eritematoso sistémico (LES), condições do sistema imunitário que afetem o tecido conjuntivo resultando em dores nas articulações, alterações da pele e perturbações de outros órgãos), porque pode existir um risco aumentado de meningite asséptica,

se tem insuficiência renal ou hepática,

se tem problemas cardíacos, incluindo insuficiência cardíaca, angina de peito (dor no peito), ou se tiver tido um ataque cardíaco, cirurgia de bypass, doença arterial periférica (má circulação nas pernas ou pés devido a artérias estreitas ou bloqueadas) ou qualquer tipo de AVC (incluindo "mini-AVC" ou acidente isquémico transitório, "AIT"),

se tem tensão arterial alta, diabetes, colesterol alto, antecedentes familiares de doença cardíaca ou AVC ou se for fumador,

se tem asma, rinite crónica (entupimento ou corrimento nasal crónico) ou doenças alérgicas, porque Brufen Liq pode causar dificuldade em respirar, urticária ou uma reação alérgica grave quando se tem qualquer uma destas condições,

se tem doenças intestinais inflamatórias, úlcera gástrica anterior ou outra tendência aumentada para hemorragia,

se tem uma infeção – consulte a secção "Infeções" abaixo.

O ibuprofeno pode causar reações alérgicas graves; especialmente se for alérgico ao ácido acetilsalicílico. Os sintomas podem incluir urticária, inchaço da cara, língua ou garganta, dificuldade em engolir, dificuldade em respirar. Pare de tomar Brufen Liq e contacte imediatamente um médico se tiver algum destes sintomas (ver secção 4 "Efeitos indesejáveis possíveis").

Reações cutâneas

Foram notificadas reações cutâneas graves associadas ao tratamento com Brufen Liq. Deve parar de tomar Brufen Liq e procurar assistência médica imediatamente caso desenvolva erupção cutânea, lesões das mucosas, bolhas ou outros sinais de alergia, porque podem ser os primeiros sinais de uma reação cutânea muito grave. Ver secção 4.

Úlceras e hemorragias no trato gastrointestinal

- Os doentes que já tiveram problemas do trato gastrointestinal, especialmente os doentes idosos, devem contactar um médico em caso de sintomas abdominais (especialmente hemorragia gastrointestinal), particularmente no início do tratamento. Hemorragia, ulceração ou perfuração no estômago ou intestinos podem ocorrer sem quaisquer sinais de alerta, mesmo em doentes que nunca tenham tido tais problemas antes.

- Os doentes idosos devem estar conscientes do risco aumentado de acontecimentos adversos, especialmente hemorragia e perfuração do trato digestivo, que podem ser fatais.

- O tratamento deve ser interrompido, e deve ser consultado um médico quando ocorrer hemorragia ou ulceração gastrointestinal durante o tratamento com Brufen Liq.

Efeitos cardiovasculares

- Medicamentos anti-inflamatórios/analgésicos, como o ibuprofeno, podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco ou AVC, particularmente quando utilizados em doses altas. Não exceda a dose recomendada nem a duração do tratamento.

Infeções

- Brufen Liq pode ocultar sinais de infeções, tais como febre e dor. Por isso, é possível que Brufen Liq possa atrasar o tratamento adequado da infeção, o que pode levar a um risco aumentado de complicações. Isto tem sido observado na pneumonia causada por bactérias e nas infeções bacterianas da pele relacionadas com a varicela. Se tomar este medicamento enquanto tiver uma infeção e os sintomas da infeção persistirem ou piorarem, consulte imediatamente um médico.

- Durante a varicela, é aconselhável evitar a utilização deste medicamento.

Se estiver desidratado

- É necessária precaução com os doentes desidratados, porque existe um risco de compromisso renal especialmente em crianças, adolescentes e idosos desidratados.

Dor de cabeça

- A utilização prolongada de qualquer tipo de analgésico para dores de cabeça pode agravá-las. Caso se verifique ou exista suspeita desta situação, deve ser obtido aconselhamento médico e o tratamento deve ser interrompido.

Crianças e adolescentes

Existe um risco de compromisso renal em crianças e adolescentes desidratados.

Brufen Liq 200 mg não deve ser tomado por crianças com menos de 6 anos (menos de 20 kg).

Para crianças mais pequenas, estão disponíveis outras dosagens e formas de apresentação mais adequadas.

Outros medicamentos e Brufen Liq

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não utilize diferentes tipos de medicamentos para o alívio da dor ao mesmo tempo, a não ser que tal seja indicado por um médico.

Brufen Liq pode afetar ou ser afetado pelo tratamento com determinados medicamentos, incluindo os que se destinam a tratar/prevenir:

tumores e doenças do sistema imunitário (metotrexato),

doença maniaco-depressiva (lítio),

doenças cardíacas (por ex., digoxina),

ácido acetilsalicílico para tratar a dor,

dor e inflamação (AINE, tais como etoricoxib, naproxeno, diclofenac),

perturbações tromboembólicas (medicamentos que são anticoagulantes, ou seja, destinados a diluir o sangue/prevenir a coagulação, por ex., clopidogrel, ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina),

depressão (medicamentos chamados ISRS – inibidores seletivos da recaptção da serotonina),

tensão arterial alta (medicamentos que reduzem a tensão arterial alta, por ex., inibidores da ECA, betabloqueadores, antagonistas dos recetores da angiotensina-II e diuréticos),

rejeição em doentes que recebem transplantes de órgãos (medicamentos que suprimem o sistema imunitário, tais como ciclosporina ou tacrolímus),

inflamação (corticosteroides),

infecções bacterianas (alguns antibióticos incluindo aminoglicosídeos e quinolonas),

infecções fúngicas (antifúngicos, particularmente voriconazol ou fluconazol),

diabetes mellitus (sulfonilureias),

colesterol alto (colestiramina),

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) (zidovudina),

mifepristona,

remédio à base de plantas chamado ginkgo biloba (existe o risco de sofrer mais facilmente de hemorragias se tomar ibuprofeno e ginkgo biloba ao mesmo tempo).

Alguns outros medicamentos podem também afetar ou ser afetados pelo tratamento com Brufen Liq. Por isso, deve sempre aconselhar-se com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Brufen Liq com outros medicamentos.

Brufen Liq com álcool

Se Brufen Liq for tomado juntamente com álcool, os efeitos indesejáveis podem aumentar.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Gravidez

Não tome ibuprofeno se estiver nos últimos 3 meses da gravidez, uma vez que pode ser prejudicial para o seu nascituro ou provocar problemas durante o parto. Pode causar problemas renais e cardíacos no seu nascituro. Pode afetar a tendência para sangrar da mulher grávida e do bebé, e fazer com que o parto aconteça mais tarde ou que tenha uma duração superior ao esperado.

Não deve tomar ibuprofeno durante os primeiros 6 meses de gravidez, a menos que seja absolutamente necessário e aconselhado pelo seu médico. Se precisar de tratamento durante este período ou enquanto estiver a tentar engravidar, deve ser utilizada a dose mais baixa durante o período de tempo mais curto possível. Se for tomado durante um período superior a alguns dias a partir das 20 semanas de gravidez, Brufen Liq pode provocar problemas renais no seu nascituro, os quais podem resultar em níveis baixos do líquido amniótico que envolve o bebé (oligodrâmnios) ou no estreitamento de um vaso sanguíneo (canal arterioso) no coração do bebé. Se precisar de tratamento durante um período superior a alguns dias, o seu médico poderá recomendar uma monitorização adicional.

Amamentação

O ibuprofeno passa para o leite materno, mas é pouco provável que afete a criança se utilizado na dose recomendada e por um curto período de tempo. No entanto, consulte um médico se for necessário mais do que uma utilização ocasional durante o período de amamentação.

Fertilidade

A utilização do ibuprofeno pode afetar a fertilidade. Este efeito é reversível com a interrupção da toma do medicamento. A utilização do ibuprofeno não é recomendada se estiver a tentar engravidar ou a fazer exames de infertilidade.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Brufen Liq pode prejudicar a capacidade de reação em algumas pessoas, por exemplo devido a efeitos indesejáveis, tais como perturbação visual, tonturas ou sonolência. Isto deve ser tido em consideração nos casos em que é necessário um elevado grau de alerta, por exemplo, ao conduzir, e aplica-se ainda mais em caso de associação com álcool. Se sentir estes efeitos indesejáveis ou quaisquer outros efeitos indesejáveis que afetem o seu grau de alerta, não deve conduzir ou operar máquinas.

Brufen Liq contém maltitol, benzoato de sódio, etanol, propilenoglicol e sódio

Este medicamento contém:

maltitol (E965). Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

20 mg de sal de benzoato (E211) em cada saqueta, o que é equivalente a 2 mg/ml.

o aroma de laranja contém 14 mg de álcool (etanol) em cada saqueta. A quantidade em cada saqueta deste medicamento é equivalente a menos de 1 ml de cerveja ou 1 ml de vinho. A pequena quantidade de álcool neste medicamento não terá quaisquer efeitos perceptíveis.

48 mg de propilenoglicol em cada saqueta, que é equivalente a 4,8 mg/ml.

17 mg de sódio (principal componente de sal de cozinha/sal de mesa) em cada saqueta de 10 ml. Isto é equivalente a 1% da ingestão diária máxima de sódio recomendada pela OMS na dieta para um adulto.

3. Como tomar Brufen Liq

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

[Para medicamentos disponíveis sem receita médica]

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Deve ser utilizada a dose eficaz mais baixa durante o menor período de tempo necessário para o alívio dos sintomas. Se tiver uma infecção, consulte imediatamente um médico se os sintomas (tais como febre e dor) continuarem ou piorarem (ver secção 2).

[Para medicamentos disponíveis sem receita médica]

Adultos: deve falar com um médico se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias com febre ou 5 dias com dor.

Crianças e adolescentes: deve falar com um médico se, em crianças ou adolescentes, este medicamento for necessário durante mais de 3 dias, ou se os sintomas piorarem.

Adultos e adolescentes com mais de 12 anos (mais de 40 kg)

A dose recomendada é de 1 ou 2 saquetas até 3 a 4 vezes por dia (dependendo da dose única), conforme necessário. Deve haver um intervalo de, pelo menos, 4 a 6 horas entre as doses. Não tomar mais de 6 saquetas em 24 horas.

Tomar mais de 2 saquetas numa única dose não lhe proporciona um melhor efeito de alívio da dor e deve ser evitado.

Crianças com mais de 6 anos (mais de 20 kg)

A dose diária máxima é de 30 mg por kg de peso corporal, dividida em doses únicas dependendo do peso corporal. Deve haver um intervalo de, pelo menos, 6 a 8 horas entre as doses.

Crianças com idades entre os 6 e os 7 anos (20 - 30 kg): 1 saqueta até 3 vezes por dia, conforme necessário. Deve haver um intervalo de, pelo menos, 6 a 8 horas entre as doses. Não tomar mais de 3 saquetas em 24 horas.

Crianças com idades entre os 8 e os 12 anos (mais de 30 kg): 1 saqueta até 4 vezes por dia, conforme necessário. Deve haver um intervalo de, pelo menos, 6 a 8 horas entre as doses. Não tomar mais de 4 saquetas em 24 horas.

[Para medicamentos disponíveis sem receita médica]

Crianças com idades entre os 6 e os 7 anos (20 - 30 kg): 1 saqueta até 3 vezes por dia, conforme necessário. Deve haver um intervalo de, pelo menos, 6 a 8 horas entre as doses. Não tomar mais de 3 saquetas em 24 horas.

Crianças com idades entre os 8 e os 12 anos (mais de 30 kg): 1 saqueta até 4 vezes por dia, conforme necessário. Deve haver um intervalo de, pelo menos, 6 a 8 horas entre as doses. Não tomar mais de 4 saquetas em 24 horas.

Modo de administração

Via oral: a saqueta deve ser misturada antes da toma, pressionando várias vezes a parte superior e inferior da saqueta com os dedos. Pode tomar o medicamento diretamente da saqueta.

O conteúdo da saqueta não pode ser dividido entre doses e deve ser tomado como um todo. Para um início de ação mais rápido, Brufen Liq pode ser tomado com o estômago vazio. Se tiver um estômago sensível, tome Brufen Liq com alimentos.

Se tomar mais Brufen Liq do que deveria

Se tomar mais Brufen Liq do que deveria ou se os seus filhos tomarem o medicamento por acidente, contacte sempre um médico ou o hospital mais próximo, para obter uma opinião do risco e aconselhamento sobre as medidas a tomar.

Os sintomas podem incluir náuseas (indisposição geral), dor de estômago, vômitos (podem conter sangue), dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, confusão e movimento ocular trémulo. Em doses elevadas, foram notificadas reações de sonolência, dor no peito, palpitações, perda de consciência, convulsões (especialmente em crianças), fraqueza e tonturas, sangue na urina, sensação de corpo frio e problemas respiratórios.

Caso se tenha esquecido de tomar Brufen Liq

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Pare de tomar este medicamento e contacte um médico ou dirija-se ao serviço de urgências mais próximo imediatamente se notar algum dos seguintes efeitos indesejáveis graves – poderá necessitar de cuidados médicos urgentes:

Raros (podem afetar até 1 em 1 000 pessoas):

se desenvolver qualquer um dos seguintes sintomas (sinais de anafilaxia, angioedema ou choque grave)

inchaço da cara, da língua ou da garganta,

dificuldade em engolir,
urticária e dificuldade em respirar.

se desenvolver uma redução do número de glóbulos brancos (agranulocitose) com diminuição da resistência à infecção. Deve consultar imediatamente o seu médico se tiver uma infecção com sintomas como febre e deterioração grave do seu estado geral, ou febre com sintomas de infecção local, tais como dor de garganta/faringe/boca ou problemas urinários.

Os sintomas de meningite não bacteriana podem incluir dor de cabeça, rigidez do pescoço, náuseas, sensibilidade à luz e ao som, e febre

Muitos raros (podem afetar até 1 em 10 000 pessoas):

Foram notificadas reações cutâneas extremamente intensas e graves, tais como síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica durante a utilização de Brufen Liq.

A reação adversa da pele pode aparecer como erupção cutânea com ou sem bolhas. Pode ocorrer irritação da pele, feridas ou inchaço na boca, garganta, olhos, nariz e à volta dos genitais (síndrome de Stevens-Johnson), e febre e sintomas gripais.

As erupções cutâneas podem evoluir para lesões cutâneas graves e disseminadas (descamação da epiderme e das mucosas superficiais) com consequências potencialmente fatais.

Desconhecido (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

Excepcionalmente, infeções graves da pele em caso de varicela. Quando se utiliza um AINE, pode desenvolver-se ou tornar-se mais grave uma inflamação da pele relacionada com uma infeção (por exemplo, pode desenvolver-se uma condição como a fasciite necrotizante, caracterizada por dor intensa, febre alta, pele inchada e quente, bolhas, necrose). Se ocorrerem sinais de uma infeção da pele ou se piorarem durante a utilização de Brufen Liq, recomenda-se que consulte imediatamente o seu médico.

Uma erupção cutânea generalizada, avermelhada e descamativa com inchaços sob a pele e bolhas, localizada sobretudo nas pregas da pele, tronco e extremidades superiores, acompanhada por febre no início do tratamento (pustulose exantematosa generalizada aguda). Pare de utilizar Brufen Liq se desenvolver estes sintomas e procure assistência médica imediatamente. Ver também a secção 2.

Além disso, pode ocorrer uma reação cutânea grave conhecida como síndrome de DRESS. Os sintomas de DRESS incluem:

erupção cutânea, febre, inchaço dos gânglios linfáticos e um aumento de eosinófilos (um tipo de glóbulos brancos). Os sintomas da síndrome de DRESS aparecem normalmente cerca de 2 a 6 semanas (possivelmente até 8 semanas) após o início do tratamento.

Outros efeitos indesejáveis que podem ocorrer:

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas):

Dor de cabeça, sensação de atordoamento

Efeitos indesejáveis gastrointestinais (indigestão, diarreia, náuseas (indisposição geral), vômitos (estar doente), dor de estômago, flatulência (gases), obstipação, fezes negras, hemorragia no estômago e intestino, vômitos de sangue)

Erupção cutânea

Cansaço

Pouco frequentes (podem afetar 1 em 100 pessoas):

Rinite (nariz com comichão, entupido ou corrimento, espirros)

Hipersensibilidade

Insônia (dificuldade em dormir), ansiedade

Sonolência

Perturbação visual

Surdez

Acufenos (zumbido nos ouvidos)

Tonturas

Tosse, dificuldade em respirar e dor no peito (espasmo brônquico), asma, falta de ar (dispneia)

Ulceração da boca

Úlcera gástrica, úlcera intestinal, úlcera gástrica rompida, inflamação da mucosa do estômago

Hepatite (inflamação do fígado), icterícia, função hepática anormal

Erupção cutânea, comichão, pequenos hematomas na pele e mucosas

Fotossensibilidade (sensibilidade ao sol)

Função renal diminuída

Formigueiro

Raros (podem afetar 1 em 1 000 pessoas):

Depressão, confusão mental

Insuficiência visual

Perda da visão, dor ocular agravada pelo movimento ocular, perda da visão cromática causada por inflamação ou danos no nervo ótico (neurite ótica, neuropatia ótica tóxica)

Retenção de líquidos no corpo

Alterações na contagem sanguínea

Anemia (uma redução dos glóbulos vermelhos ou hemoglobina)

Muito raros (podem afetar até 1 em 10 000 pessoas):

Inflamação do pâncreas, insuficiência do fígado

Insuficiência cardíaca, ataque cardíaco

Tensão arterial alta

Desconhecido (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

Agravamento de úlceras no intestino grosso (colite) e doença de Crohn (doença intestinal)

Tenha em conta que Brufen Liq pode prolongar o tempo de hemorragia.

Medicamentos como Brufen Liq podem implicar um risco ligeiramente maior de ataque cardíaco ou AVC.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Brufen Liq

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Brufen Liq

A substância ativa é o ibuprofeno. Brufen Liq. Cada saqueta (10 ml) contém 200 mg de ibuprofeno.

Os outros componentes são glicerol, maltitol líquido E965, goma xantana, ácido cítrico, citrato de sódio, benzoato de sódio E211, sacarina sódica, água purificada, celulose microcristalina, polissorbato 80 e aroma de laranja que contém propilenoglicol. Ver secção 2 ("Brufen Liq contém maltitol, benzoato de sódio, propilenoglicol e etanol").

Qual o aspeto de Brufen Liq e conteúdo da embalagem

Brufen Liq é uma suspensão oral branca ou esbranquiçada, viscosa e com sabor a laranja.

Brufen Liq está disponível em embalagens de 20 e 40 saquetas de 10 ml.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

APROVADO EM
10-02-2023
INFARMED

BGP Products, Unipessoal Lda.
Av. D. João II, Edifício Atlantis, N.º 44C - 7.3 e 7.4
1990-095 Lisboa

Fabricante

KERN PHARMA, S.L.
Polígono Ind. Colón II
Venus 72
08228 Terrassa - (Barcelona)
Espanha

Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu (EEE) com os seguintes nomes:

Itália	Brufenlik
Portugal	Brufen Liq
Suécia	Ibuprofen Mylan 200 mg oral suspension i dospåse

Este folheto foi revisto pela última vez em.