

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) +
Glucose 5% B. Braun solução para perfusão

Cloreto de Potássio, Glucose

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

O que contém este folheto:

1. O que é Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão
3. Como utilizar Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão e para que é utilizado

Este medicamento é uma solução para perfusão, ou seja, é-lhe administrado através de um catéter inserido numa veia.

Ser-lhe-á administrado para manter ou repor os seus níveis de potássio e como fonte de calorias.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão

Não utilize Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão

se tiver níveis anormalmente altos de potássio ou de cloro no seu sangue
se tiver uma doença renal grave
se tiver um AVC (Acidente Vascular Cerebral) agudo
se tiver uma lesão traumática da cabeça (primeiras 24 horas)
se tiver inchaço dos seus membros inferiores, demasiada água nos seus tecidos corporais (hiper-hidratação)

Advertências e precauções

se tiver problemas nos rins
se tiver uma doença do fígado
se tiver diabetes grave ou qualquer outra doença associada com intolerância à glucose
se tiver uma doença ou congestão pulmonar ou água nos pulmões (edema pulmonar)
se tiver níveis anormalmente baixos de eletrólitos (sais) no seu sangue
se tiver uma doença cardíaca
se as suas glândulas suprarrenais não estiverem a funcionar corretamente

É necessário um cuidado especial e uma monitorização atenta dos níveis de sais e de fluidos quando este medicamento for administrado a crianças.

Outros medicamentos e Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente outros medicamentos.

Informe em especial o seu médico, se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos, de modo a que a quantidade de Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão possa ser ajustada em conformidade: corticoesteróides, p.ex. hidrocortisona, prednisona, dado que podem levar a uma diminuição da tolerância à glucose
digoxina (um medicamento utilizado para tratar a fraqueza do coração fraco)
medicamentos poupadores de potássio, p.ex. que contenham espironolactona ou triantereno ou outros medicamentos que conduzam a níveis elevados de potássio, tais como medicamentos utilizados no tratamento da tensão arterial alta (os chamados inibidores da ECA), ciclosporina ou suxametónio

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Gravidez

Se pensa estar grávida informe o seu médico imediatamente. Este medicamento pode ser administrado enquanto está grávida se o seu médico o considerar necessário.

Amamentação

Se estiver a amamentar informe o seu médico imediatamente. Este medicamento pode ser administrado enquanto estiver a amamentar se o seu médico o considerar necessário.

3. Como utilizar Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão

Modo de administração

Este medicamento ser-lhe-á administrado por perfusão numa veia.

Este recipiente contém um volume significativo de ar. Assim, para evitar o risco de entrada de ar na sua circulação sanguínea este medicamento não lhe deve ser administrado por perfusão sob pressão.

Dosagem

A quantidade do medicamento que lhe será administrada será definida pelo seu médico e dependerá da sua idade, peso e situação clínica. Enquanto receber este medicamento os seus níveis de glucose no sangue, eletrólitos (sais) e balanço hídrico serão monitorizados regularmente.

A dosagem máxima normal para um adulto é de 40 ml/kg de peso corporal/dia. As crianças receberão uma dosagem reduzida dependendo da sua idade.

Não deverá receber este medicamento através do mesmo equipamento de perfusão que administra sangue.

Se receber mais Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão do que deveria

É pouco provável que isto aconteça uma vez que a perfusão será controlada por um médico ou por um enfermeiro.

No entanto, se ocorrer uma sobredosagem, poderão ocorrer desequilíbrios dos níveis de fluidos e eletrólitos séricos, inchaço e distúrbios do coração e da circulação. Outros sintomas são descritos abaixo (ver secção 4.).

A terapêutica para normalizar a sua situação será definida pelo seu médico. Poderá incluir a suspensão da perfusão e a administração de medicamentos adequados para o tratamento dos sintomas observados. Em situações extremas poderá também necessitar de diálise.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Se tiver qualquer um dos seguintes efeitos secundários, informe o seu médico imediatamente ou dirija-se ao serviço de urgência do hospital mais próximo:

dificuldade em respirar

dor aguda e repentina no peito

abrandamento ou aceleração dos seus batimentos cardíacos

tensão arterial baixa (hipotensão)

episódios graves de desmaio, ou colapso

fraqueza, perturbação dos movimentos musculares

adormecimento muito marcado, inchaço ou sensação de peso dos seus membros

pele fria ou palidez cinzenta

confusão mental

Informe o seu médico se sentir dor ou sensibilidade no local da injeção.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo e na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não conservar acima de 25°C.

O produto deve ser utilizado imediatamente. Se não for utilizado imediatamente, os tempos e condições de conservação durante a utilização são da responsabilidade do utilizador.

Este medicamento destina-se apenas a uma única utilização.

Este medicamento deve ter um aspeto límpido. Não utilize Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão se verificar que se encontra turvo ou se o recipiente tiver sido danificado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão

As substâncias ativas são o Cloreto de Potássio e a Glucose.

1,000 ml de solução para perfusão contêm:

Cloreto de potássio 1,5 g (3,0 g)

Glucose (como glucose mono-hidratada) 50,0 g

O outro componente é:

Água para preparações injectáveis

Qual o aspeto de Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão e conteúdo da embalagem

Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B. Braun solução para perfusão é uma solução para perfusão, ou seja, uma solução para ser administrada por gotejamento numa veia.

É uma solução estéril, límpida e incolor das substâncias acima referidas em água.

Apresenta-se em frascos incolores de polietileno de 500 ml ou de 1000 ml cada, disponível em embalagens de 10 frascos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen

Alemanha

Telefone: (351) 214 368 251

Fax: (351) 214 368 287

Fabricantes:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen

Alemanha

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona

Espanha

Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu (EEE) sob as seguintes denominações:

República Checa	Kaliumchlorid/glucose 0,15%(0,3%) + 5% B. Braun
Estónia	Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml(3 mg/ml) + 50 mg/ml, infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahas
Espanha	Cloruro Potásico 1,5(3 mg/ml) mg/ml en Glucosa 50 mg/ml Prediluido B. Braun solución para perfusión
Filândia	Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 50 mg/ml infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahas
Irlanda	Potassium Chloride 0.15%(0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion
Holanda	Kaliumchloride 0,15% (0,3%) - Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie
Polónia	Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun
Portugal	Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B.Braun
Eslováquia	Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun
Reino Unido	Potassium Chloride 0.15% (0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion

Este folheto foi revisto pela última vez em