

Folheto Informativo: Informação para o utilizador

Drill sem açúcar 0,2 mg + 3 mg Pastilha
Cloridrato de tetracaína, Digluconato de cloro-hexidina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Drill sem açúcar e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Drill sem açúcar
3. Como tomar Drill sem açúcar
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Drill sem açúcar
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Drill sem açúcar e para que é utilizado

Grupo farmacoterapêutico: 6.1.1 Aparelho digestivo. Medicamentos que atuam na boca e na orofaringe. De aplicação tópica.

Drill sem açúcar é utilizado para:

- Alívio sintomático da dor de garganta.
- Alívio sintomático das infeções ligeiras da cavidade oral e da orofaringe.
- Na higiene oral e da orofaringe, principalmente nos cuidados pós-operatórios em estomatologia e laringologia.

Este medicamento é reservado a adultos e crianças com idade superior a 6 anos.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, deve consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Drill sem açúcar

Não tome Drill sem açúcar:

- Se tem alergia à cloro-hexidina ou à tetracaína ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Em crianças com idade inferior a 6 anos.
- Se tem uma doença hereditária chamada fenilcetonúria (ver final da secção 2).

Advertências e precauções

A anestesia provocada na garganta por este medicamento pode promover a aspiração acidental quando engole a comida (tosse durante a refeição com a sensação da comida "ir para o sítio errado").

Deve por isso tomar precauções especiais com crianças entre os 6 e os 12 anos de idade.

Não utilizar este medicamento antes das refeições ou antes da ingestão de líquidos.

Este medicamento não deve ser utilizado por períodos prolongados (mais de 5 dias) porque pode alterar o equilíbrio microbiano natural da boca e da garganta.

Dor de garganta: se tiver febre, pus amarelado ou desconforto ao engolir comida, deve consultar o seu médico.

Úlceras da boca, pequenas feridas na boca: se tiver febre, lesões extensas ou lesões em propagação, deve consultar o seu médico imediatamente.

Coloração castanha na língua. Este efeito é inofensivo e desaparece quando para o tratamento.

Coloração castanha nos dentes e nas restaurações com silicato ou compósito. Esta coloração não é permanente e pode ser facilmente prevenida com a escovagem diária dos dentes.

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Drill sem açúcar.

Outros medicamentos e Drill sem açúcar

Não utilize mais do que um medicamento antisséptico ao mesmo tempo.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Drill sem açúcar com alimentos e bebidas:

As pastilhas não devem ser tomadas antes das refeições ou da ingestão de líquidos, uma vez que a tetracaína é um agente anestésico moderado e pode provocar asfixia.

Gravidez e amamentação

A utilização deste medicamento deve ser evitada durante a gravidez.

Não deve tomar este medicamento durante a amamentação.

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Os efeitos na condução de veículos ou utilização de máquinas durante a utilização de Drill sem açúcar são nulos ou desprezíveis.

Drill sem açúcar contém

- Isomalte (E953). Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

- Aspartamo (E951). Contém uma fonte de fenilalanina. Pode ser prejudicial em indivíduos com fenilcetonúria.

3. Como tomar Drill sem açúcar

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Posologia

- Adultos e adolescentes a partir dos 15 anos: a dose recomendada é 1 pastilha, podendo ser renovada se necessário, sem exceder 4 pastilhas por dia.
- Crianças entre os 6 e os 15 anos: a dose recomendada é 1 pastilha, podendo ser renovada se necessário, sem exceder 3 pastilhas por dia.

Modo e via de administração

Dissolver lentamente na boca sem mastigar.

Frequência de administração

Fazer intervalos de 2 horas, no mínimo, entre cada pastilha.

Duração do tratamento

- Este tratamento não deve ultrapassar os 5 dias.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, deve consultar o seu médico.

Se tomar mais Drill sem açúcar do que deveria

Se você ou uma criança tomar acidentalmente demasiado medicamento:

- Em pequenas quantidades não são esperados efeitos indesejáveis;
- Em quantidades elevadas (por exemplo, muitas pastilhas) deve contactar imediatamente o seu médico ou dirigir-se às urgências do hospital mais próximo.
 - Os efeitos secundários devido à cloro-hexidina são pouco prováveis, mas pode ter sintomas de desconforto digestivo, sensação de queimadura na boca e garganta, ligeira descoordenação dos movimentos ou doenças do fígado.
 - A tetracaína poderá provocar dormência da língua e uma possível sensação de asfixia. Também podem ocorrer doenças do sistema nervoso (nervosismo, distúrbios visuais, convulsões), doenças cardiovasculares (hipotensão, bradicardia, arritmia ventricular) e metemoglobinemia (doença do sangue em que é produzida uma quantidade anormal de metemoglobina - uma forma de hemoglobina).

Caso se tenha esquecido de tomar Drill sem açúcar

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Os seguintes efeitos podem ocorrer numa frequência desconhecida (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

- Reação alérgica. Se tiver erupção cutânea, inchaço da boca ou da face, dificuldade em respirar, pare imediatamente a utilização deste medicamento e consulte um médico. Estes efeitos podem ser sintomas de uma reação alérgica que é muito rara.
- Coloração castanha da língua. Este efeito é inofensivo e desaparece quando o tratamento é interrompido.
- Coloração castanha dos dentes e de restaurações com silicatos ou com compósitos. Esta coloração não é permanente e pode ser facilmente prevenida com a escovagem diária dos dentes.
- Aspiração acidental (tosse durante a refeição com a sensação da comida "ir para o sítio errado"). Este efeito está relacionado com a tetracaína (um anestésico

moderado) que pode induzir asfíxia. Se tal acontecer, deve parar o tratamento e procurar ajuda médica.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P., através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P. - Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 - 1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800 222 444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet:

<http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Drill sem açúcar

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não conservar acima de 30° C.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Drill sem açúcar

- As substâncias ativas são o cloridrato de tetracaína (0,2 mg) e o digluconato de cloro-hexidina (3 mg).

- Os outros componentes são glicirrizato de amónio, aroma de papoila, aroma pulmoral, ácido ascórbico, aspartamo (E951) e isomalte (E953).

Qual o aspeto de Drill sem açúcar e conteúdo da embalagem

Drill sem açúcar apresenta-se sob a forma de pastilhas redondas, de cor transparente.

Embalagens contendo 24 pastilhas para administração bucal.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Portugal, Lda.

Rua Rodrigo da Fonseca, nº 178 – 5º Esq.

1070-243 Lisboa

Tel.: 21 381 53 20

APROVADO EM
07-03-2017
INFARMED

Fabricante

Pierre Fabre Médicament Production
Site Dietetique et Pharmacie
Zone Industrielle de la Coudette
FR-32290 Aignan - França

Este folheto foi revisto pela última vez em