FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Esomeprazol ratiopharm, 20 mg, cápsulas gastroresistentes
Esomeprazol ratiopharm, 40 mg, cápsulas gastroresistentes

esomeprazol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Esomeprazol ratiopharm e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Esomeprazol ratiopharm
3. Como tomar Esomeprazol ratiopharm
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Esomeprazol ratiopharm
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O QUE É Esomeprazol ratiopharm E PARA QUE É UTILIZADO

Esomeprazol ratiopharm contém um medicamento chamado esomeprazol. Este pertence a um grupo de medicamentos chamados «inibidores da bomba de prótons». Atuam através da redução da quantidade de ácido produzido pelo seu estômago.

Esomeprazol ratiopharm é utilizado para tratar as seguintes condições:

Adultos

Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Quando o ácido do estômago escapa para o esófago (o canal que liga a sua garganta ao estômago) provocando dor, inflamação e azia.

Úlceras no estômago ou na parte superior do intestino que são infetadas por bactérias chamadas *Helicobacter pylori*. Se tem esta doença, o seu médico também lhe pode prescrever antibióticos para tratar a infeção e permitir que a úlcera cicatrize.

Úlceras de estômago causadas por medicamentos chamados AINEs (Anti-Inflamatórios Não Esteróides). Esomeprazol ratiopharm pode igualmente ser utilizado para impedir a formação de úlceras no estômago quando está a tomar AINEs.

Demasiado ácido no estômago provocado por um tumor no pâncreas (Síndrome de Zollinger-Ellison).

Tratamento prolongado para prevenção da recorrência de hemorragia das úlceras com esomeprazol intravenoso.

Adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos

- Doença de Refluxo Gastroesofágico (DRGE). Isto acontece quando o ácido escapa do estômago e atinge o esófago (o tubo que liga a garganta ao seu estômago), causando dor, inflamação e azia.
- Úlceras no estômago ou na parte superior do intestino que estão infetadas por uma bactéria denominada por *Helicobacter pylori*. Se tem esta situação, o seu médico poderá também receitar antibióticos para tratar a infeção e permitir curar a úlcera.

2. O QUE PRECISA DE SABER ANTES DE TOMAR Esomeprazol ratiopharm

Não tome Esomeprazol ratiopharm:

Se tem alergia ao esomeprazol ou a qualquer outro componente deste medicamento (listados na Secção 6).

Se tem alergia a outros medicamentos inibidores da bomba de prótons (por exemplo pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).

Se está a tomar um medicamento que contém nelfinavir (utilizado para tratar a infeção por VIH).

Não tome Esomeprazol ratiopharm se alguma das situações anteriores se lhe aplicar. Se ainda tiver dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Esomeprazol ratiopharm.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Esomeprazol ratiopharm:

Se tem problemas graves de fígado.

Se tem problemas graves de rins.

Se já teve reações cutâneas após tratamento com um medicamento similar a Esomeprazol ratiopharm que reduza a acidez do estômago.

Se está previsto fazer uma análise específica ao sangue (Cromogranina A).

Esomeprazol ratiopharm pode ocultar os sintomas de outras doenças. Consequentemente, informe imediatamente o seu médico se detetar algum dos seguintes efeitos antes de começar a tomar Esomeprazol ratiopharm ou enquanto estiver a tomar Esomeprazol ratiopharm:

Perder muito peso sem motivo aparente e ter problemas a engolir.

Ter dores de estômago ou indigestão.

Começar a vomitar alimentos ou sangue.

Ter fezes escuras (fezes com sangue).

Se lhe foi prescrito Esomeprazol ratiopharm “só quando necessário”, deve consultar o seu médico se os seus sintomas persistirem ou se se alterarem.

A toma de inibidores da bomba de protões como Esomeprazol ratiopharm, especialmente durante um período de tempo superior a um ano, pode aumentar ligeiramente o seu risco de fraturas da anca, punho e coluna vertebral. Informe o seu médico se tiver osteoporose ou se estiver a tomar

corticosteroides (os quais podem aumentar o risco de osteoporose).

Erupções cutâneas e sintomas da pele

No caso de sofrer uma erupção cutânea, especialmente em áreas da pele expostas ao sol, fale com o seu médico o mais cedo possível, dado que poderá ter de interromper o seu tratamento com Esomeprazol ratiopharm. Lembre-se de mencionar igualmente quaisquer outros efeitos adversos, tal como dores nas articulações.

Ocorreram erupções cutâneas graves em doentes a tomar esomeprazol (ver também secção 4). A erupção cutânea pode envolver úlceras na boca, garganta, nariz, órgãos genitais e conjuntivite (olhos vermelhos e inchados). Essas erupções cutâneas graves surgem normalmente após sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de cabeça e dor no corpo. A erupção cutânea pode cobrir partes extensas do corpo, com bolhas e descamação da pele. Se a qualquer altura do tratamento (mesmo após várias semanas), desenvolver uma erupção na pele ou algum destes sintomas de pele, pare de tomar este medicamento e contacte o seu médico imediatamente.

Crianças com idade inferior a 12 anos

Esomeprazol ratiopharm não está recomendado para crianças com menos de 12 anos.

Outros medicamentos e Esomeprazol ratiopharm

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou vier a tomar, qualquer outro medicamento. Isto porque Esomeprazol ratiopharm pode afetar a forma como alguns medicamentos atuam e determinados medicamentos podem ter um efeito sobre Esomeprazol ratiopharm.

Não tome Esomeprazol ratiopharm se estiver a tomar um medicamento que contenha nelfinavir (utilizado para tratar a infecção por VIH).

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:

Atazanavir (utilizado para tratar a infecção por VIH).

Clopidogrel (usado para prevenir coágulos no sangue)

Cetoconazol, itraconazol ou voriconazol (utilizados para tratar infeções causadas por um fungo).

Erlotinib (usado no tratamento do cancro).

Citalopram, imipramina ou clomipramina (utilizados para tratar a depressão).

Diazepam (utilizado para tratar a ansiedade, relaxar os músculos ou na epilepsia).

Fenitoína (utilizada na epilepsia). Se estiver a tomar fenitoína, o seu médico vai necessitar de o monitorizar quando começar ou terminar de tomar Esomeprazol ratiopharm.

Medicamentos utilizados para diluir o sangue, tais como varfarina. O seu médico pode necessitar de o monitorizar quando começar ou terminar de tomar Esomeprazol ratiopharm.

Cilostazol (usado para tratar a claudicação intermitente – uma dor nas suas pernas quando anda e que é provocada por um fornecimento insuficiente de sangue).

Cisaprida (utilizada para a indigestão e a azia).

Digoxina (usado para problemas de coração).

- Metotrexato (um medicamento para quimioterapia usado em doses elevadas no tratamento

do cancro) – se estiver a tomar uma dose elevada de metotrexato, o seu médico poderá parar temporariamente o seu tratamento com Esomeprazol ratiopharm.

- Tacrolimus (transplante de órgãos).

- Rifampicina (usado no tratamento da tuberculose).

- Hipericão ou Erva de S. João (*Hypericum perforatum*) (usado no tratamento da depressão).

Se o seu médico lhe prescreveu os antibióticos amoxicilina e claritromicina ao mesmo tempo que Esomeprazol ratiopharm para tratar úlceras causadas por uma infeção de *Helicobacter pylori*, é muito importante informar o seu médico sobre quaisquer outros medicamentos que esteja a tomar.

Esomeprazol ratiopharm com alimentos e bebidas

Pode tomar as suas cápsulas com alimentos ou com o estômago vazio.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. O seu médico irá decidir se poderá tomar Esomeprazol ratiopharm durante este período.

Desconhece-se se Esomeprazol ratiopharm passa para o leite materno. Como tal, não deve tomar Esomeprazol ratiopharm se está a amamentar.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não é provável que Esomeprazol ratiopharm afete a sua capacidade para conduzir ou utilizar quaisquer máquinas ou ferramentas.

Contudo, efeitos indesejáveis tais como, tonturas e visão turva podem ocorrer pouco frequentemente ou raramente (ver secção 4). Se o afetar, não deve conduzir ou utilizar máquinas.

Esomeprazol ratiopharm contém sódio

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

Esomeprazol ratiopharm contém sacarose

Este medicamento contém sacarose que é um tipo de açúcar. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3. COMO TOMAR Esomeprazol ratiopharm

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Se estiver a tomar este medicamento durante muito tempo, o seu médico vai querer monitorizá-lo (especialmente se o estiver a tomar durante um período superior a um ano). Se o seu médico lhe disse para tomar este medicamento em caso de necessidade, informe o seu médico caso os seus sintomas se alterarem.

Qual a quantidade a tomar

O seu médico irá informá-lo sobre quantas cápsulas deve tomar e durante quanto tempo. Isso irá depender da sua doença, da sua idade e do funcionamento do seu fígado. As doses recomendadas são indicadas a seguir.

Adultos

Para tratar a azia causada pela doença do refluxo gastroesofágico (DRGE):

Se o seu médico descobrir que o seu esófago está ligeiramente lesado, a dose recomendada é uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 40 mg, uma vez por dia, durante 4 semanas. O seu médico pode dizer-lhe para tomar a mesma dose durante mais 4 semanas caso o seu esófago ainda não tenha cicatrizado.

A dose recomendada depois de o esófago ter cicatrizado é de uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg uma vez por dia.

Caso o seu esófago não apresente lesões, a dose recomendada é de uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg por dia. Depois de a doença estar controlada, o seu médico pode dizer-lhe para tomar o medicamento em caso de necessidade, até a um máximo de uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg por dia.

Se tem problemas graves de fígado, o seu médico pode prescrever-lhe uma dose inferior.

Para tratar úlceras causadas por infeções de *Helicobacter pylori* e impedir que reapareçam:

A dose recomendada é de uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg duas vezes por dia, durante uma semana.

O seu médico irá igualmente dizer-lhe para tomar antibióticos, por exemplo amoxicilina e claritromicina.

Para tratar úlceras de estômago causadas por AINEs (Anti-Inflamatórios Não Esteróides):

A dose recomendada é de uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg uma vez por dia, durante 4 a 8 semanas.

Para prevenir úlceras de estômago se estiver a tomar AINEs (Anti-Inflamatórios Não Esteróides):

A dose recomendada é de uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg uma vez por dia.

Para tratar o excesso de ácido no estômago causado por um tumor no pâncreas (síndrome de Zollinger-Ellison):

A dose recomendada é de uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 40 mg duas vezes por dia.

O seu médico irá ajustar a dose consoante as suas necessidades e irá igualmente decidir sobre durante quanto tempo necessita de tomar o medicamento. A dose máxima é de 80 mg duas vezes por dia.

Tratamento prolongado após prevenção da recorrência de hemorragia das úlceras com esomeprazol intravenoso:

A dose recomendada é de uma cápsula de Esomeprazol ratiopharm 40 mg uma vez por dia, durante 4 semanas.

Adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos

Para tratar a azia causada pela Doença de Refluxo Gastroesofágico (DRGE):

- Se o seu médico detetou que o seu tubo digestivo (esófago) está ligeiramente lesado, a dose recomendada é uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 40 mg uma vez por dia, durante 4 semanas. O seu médico poderá dizer-lhe para tomar a mesma dose por mais 4 semanas, se o seu esófago ainda não estiver curado.

- A dose recomendada é uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg uma vez por dia, uma vez que o esófago esteja curado.

- Se o seu esófago não estiver lesado a dose recomendada é uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg uma vez por dia.

- Se tiver graves problemas de fígado, o seu médico poderá receitar-lhe uma dose mais baixa.

Para tratar úlceras provocadas por infeções por *Helicobacter pylori* e para impedir que estas

voltem:

- A dose recomendada é uma cápsula gastrorresistente de Esomeprazol ratiopharm 20 mg duas vezes por dia durante uma semana.

- O seu médico também lhe dirá para tomar antibióticos, por exemplo amoxicilina e claritromicina.

Tomar este medicamento

Pode tomar as cápsulas a qualquer hora do dia.

Pode tomar as suas cápsulas com alimentos ou com o estômago vazio.

Engula as suas cápsulas inteiras com água. Não esmague nem mastigue as cápsulas. Isto porque as cápsulas contêm grânulos revestidos que impedem que o medicamento seja destruído pelo ácido do seu estômago. É extremamente importante não danificar os grânulos.

O que deve fazer se tiver dificuldade em engolir as cápsulas

Se tiver dificuldade em engolir as cápsulas:

Abra a cápsula e esvazie os grânulos para um copo cheio até meio com água sem gás.

Não utilize quaisquer outros líquidos.

Em seguida, beba a mistura imediatamente ou no prazo de 30 minutos. Misture sempre a mistura imediatamente antes de a beber.

Para garantir que bebeu todo o medicamento, volte a encher o copo até meio com água, misture bem e beba. As partículas sólidas contêm o medicamento - não as mastigue nem as esmague.

Se de todo não conseguir engolir, os pellets podem ser misturados com água e colocado numa seringa. Pode então ser-lhe administrada através de um tubo diretamente para o seu estômago («tubo gástrico»).

Crianças com idade inferior a 12 anos

Esomeprazol ratiopharm 20mg, não é recomendado para crianças com idade inferior a 12 anos.

População idosa

Não é necessário alterar a dose se for idoso.

Se tomar mais Esomeprazol ratiopharm do que deveria

Se tomar mais Esomeprazol ratiopharm do que o que lhe foi prescrito pelo seu médico, contacte o seu médico ou farmacêutico imediatamente.

Caso se tenha esquecido de tomar Esomeprazol ratiopharm

Caso se tenha esquecido de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora de tomar a dose seguinte, não tome a dose que se esqueceu de tomar.

Não tome uma dose a dobrar (duas doses ao mesmo tempo) para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS INDESEJÁVEIS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Se detetar qualquer um dos seguintes efeitos indesejáveis graves, pare de tomar Esomeprazol ratiopharm e contacte um médico imediatamente:

- Pele amarela, urina de cor escura e cansaço, que poderão ser sintomas de problemas de fígado. Estes efeitos são raros e podem afetar até 1 em 1.000 pessoas

Sibilos, inchaço dos lábios, língua e garganta ou corpo, erupções cutâneas, desmaios ou dificuldades em engolir súbitos (reação alérgica grave). Estes efeitos são raros e podem afetar até 1 em 1.000 pessoas.

- Início súbito de uma erupção cutânea grave ou vermelhidão da pele com bolhas ou pele descamada que pode ocorrer mesmo após várias semanas de tratamento. Também podem ocorrer bolhas graves e sangramento dos lábios, olhos, boca, nariz e genitais. As erupções cutâneas podem evoluir para lesões cutâneas generalizadas graves (descamação da epiderme e das membranas mucosas superficiais) que podem colocar a vida em risco. Isto poderá ser “eritema multiforme”, “síndrome de Stevens-Johnson”, “necrólise epidérmica tóxica” ou “síndrome induzida por fármacos com eosinofilia e sintomas sistêmicos”. Estes efeitos são muito raros e podem afetar até 1 em 10.000 pessoas.

Outros efeitos indesejáveis incluem:

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas)

Dores de cabeça.

Efeitos no seu estômago ou intestino: diarreia, dores de estômago, prisão de ventre, gases (flatulência).

Sensação de enjoo (náuseas) ou estar enjoado (vômitos).

Pólipos benignos no estômago

Pouco frequentes

Inchaço dos pés e tornozelos.

Perturbações do sono (insónia).

Tonturas, formigueiro, sensação de sonolência.

Sensação de ter a cabeça a andar à roda (vertigem).

Boca seca.

Alterações nas análises sanguíneas que examinam a função hepática.

Erupções cutâneas, erupções cutâneas com pápulas (urticária) e comichão.

Fratura da anca, pulso ou coluna vertebral (se Esomeprazol ratiopharm for utilizado em doses elevadas e durante um longo período de tempo).

Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas)

Problemas de sangue tais como um número reduzido de glóbulos brancos ou plaquetas. Isto pode causar fraqueza, nódoas negras (hematomas) ou maior facilidade em apanhar infeções.

Níveis baixos de sódio no sangue. Isto pode causar fraqueza, enjoo (vômitos) e câibras.

Sensação de agitação, confusão ou depressão.

Alterações no paladar.

Problemas de visão tais como visão turva.

Sensação súbita de dificuldade em respirar ou de falta de ar (broncospasmo).

Uma inflamação no interior da boca.

Uma infeção chamada «aftas» que pode afetar o intestino e é causada por um fungo.

Problemas de fígado, incluindo icterícia, que podem causar pele amarela, urina escura e cansaço.

Perda de cabelo (alopécia).

Erupções cutâneas durante a exposição à luz solar.
Dor nas articulações (artralgia) ou dores musculares (mialgia).
Sensação geral de mal-estar e falta de energia.
Aumento da sudorese.

Muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas)
Alterações nas contagens sanguíneas incluindo agranulocitose (falta de glóbulos brancos).
Agressividade.
Ver, sentir ou ouvir coisas que não existem (alucinações).
Problemas graves de fígado que levam a insuficiência hepática e a inflamação no cérebro.
Aparecimento súbito de erupções cutâneas graves ou formação de bolhas ou descamação da pele. Isto pode estar associado a febre elevada e a dores nas articulações (Eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, síndrome induzida por fármacos com eosinofilia e sintomas sistêmicos).
Fraqueza muscular.
Problemas graves de rins.
Aumento das mamas nos homens.

Esomeprazol ratiopharm pode, em casos muito raros, afetar os glóbulos brancos levando a uma deficiência imunitária. Se tiver uma infecção com sintomas tais como febre com uma grave deterioração do estado geral ou febre com sintomas de uma infecção local tais como dor no pescoço, garganta ou boca ou dificuldades em urinar, deve consultar o seu médico logo que possível para que possa ser excluída uma falta de glóbulos brancos (agranulocitose) através de uma análise ao sangue. É extremamente importante dar informações sobre a sua medicação nessa altura.

Frequência desconhecida (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis)

- Se está a tomar Esomeprazol ratiopharm há mais de três meses, é possível que os seus níveis de magnésio no sangue desçam. Como consequência, podem surgir sintomas como fadiga, contracções musculares involuntárias, desorientação, convulsões, tonturas e ritmo cardíaco acelerado. Se tiver algum destes sintomas informe o seu médico imediatamente. Os níveis baixos de magnésio no sangue podem também conduzir à redução dos níveis de potássio ou de cálcio no sangue. O seu médico poderá decidir pedir-lhe análises sanguíneas regularmente para monitorizar os seus níveis de magnésio no sangue.
- Inflamação no intestino (que causa diarreia).
- Erupções cutâneas, possivelmente acompanhadas de dores nas articulações

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. COMO CONSERVAR Esomeprazol ratiopharm

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Embalagem «blister»

Não conservar acima de 30 °C.

Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade.

Recipiente para comprimidos de HDPE

Não conservar acima de 30 °C.

Manter o recipiente bem fechado para proteger da humidade.

Após primeira abertura do recipiente:

Não conservar acima de 25 °C.

Manter o recipiente bem fechado para proteger da humidade.

Após a primeira abertura do recipiente, o medicamento deve ser utilizado no prazo de 6 meses.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM E OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Esomeprazol ratiopharm

A substância ativa é o esomeprazol. Cada cápsula gastroresistente contém 20 mg ou 40 mg de esomeprazol (como magnésio di-hidratado).

Os outros componentes são sacarose, amido de milho, povidona K30, laurilsulfato de sódio, álcool poli(vinílico), dióxido de titânio (E 171), macrogol 3000, macrogol 6000, talco, carbonato de magnésio pesado, copolímero do ácido metacrílico-etilacrilato de etilo (1:1) dispersão a 30 % e polissorbato 80 em grânulos contidos no núcleo da cápsula e gelatina, dióxido de titânio (E 171) e óxido de ferro vermelho (E 172) no revestimento da cápsula.

Qual o aspeto de Esomeprazol ratiopharm e conteúdo da embalagem
O corpo e a cabeça das cápsulas gastrorresistentes de 20 mg são ligeiramente cor-de-rosa.
As cápsulas contêm grânulos brancos a esbranquiçados.

O corpo e a cabeça das cápsulas gastrorresistentes de 40 mg são ligeiramente cor-de-rosa.
As cápsulas contêm grânulos brancos a esbranquiçados.

As cápsulas estão disponíveis em caixas de 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 90, 98 e 100 cápsulas em embalagens «blister» e em recipientes para comprimidos de plástico com 98 cápsulas. Não ingerir a cápsula de dessecante fornecida no recipiente.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
ratiopharm – Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda
Lagoas Park, Edifício 5-A, Piso 2
2740 - 245 Porto Salvo
Portugal

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Eslovénia

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren
Alemanha

Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu sob os seguintes nomes:

Nome do Estado Membro	Nome do medicamento
Portugal	Esomeprazol ratiopharm
Espanha	Esomeprazol ratiopharm 20 mg/ 40 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG

Este folheto foi revisto pela última vez em