

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Fluoxetina Aurobindo 20 mg cápsulas
Fluoxetina Aurobindo 60 mg cápsulas
Fluoxetina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Fluoxetina Aurobindo e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Fluoxetina Aurobindo
3. Como tomar Fluoxetina Aurobindo
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Fluoxetina Aurobindo
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Fluoxetina Aurobindo e para que é utilizado

Fluoxetina Aurobindo contém fluoxetina que pertence a um grupo de medicamentos antidepressivos chamados inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS).

Este medicamento é utilizado no tratamento das seguintes situações:

Adultos:

- Episódios depressivos major.
- Perturbação obsessivo-compulsiva.
- Bulimia nervosa: Fluoxetina Aurobindo está indicado como complemento da psicoterapia destinada à redução da ingestão alimentar compulsiva e atividade purgativa.

Crianças e adolescentes com 8 anos de idade ou mais:

- Episódios depressivos major moderados a graves, quando a depressão não responde a 4-6 sessões de terapêutica psicológica. Fluoxetina Aurobindo só deve ser utilizado em crianças e jovens com depressão moderada a grave somente em combinação com uma terapêutica psicológica.

Como funciona Fluoxetina Aurobindo

Todas as pessoas têm uma substância no cérebro chamada serotonina. As pessoas deprimidas ou que sofrem de distúrbio obsessivo-compulsivo ou de bulimia nervosa têm níveis mais baixos de serotonina do que os outros. Não se conhece completamente como Fluoxetina Aurobindo e os outros ISRS funcionam, mas estes podem ajudar aumentando o nível de serotonina no cérebro.

É importante tratar estas doenças para ajudá-lo a melhorar. Se não for tratado, a sua doença pode não desaparecer e tornar-se mais grave e mais difícil de tratar.

Poderá ter que ser tratado durante algumas semanas ou meses, para ter a certeza de que fica livre de quaisquer sintomas.

2. O que precisa de saber antes de tomar Fluoxetina Aurobindo

Não tome Fluoxetina Aurobindo:

- Se tem alergia à fluoxetina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6). Se desenvolver uma erupção na pele ou outras reações alérgicas (tais como comichão, lábios inchados ou face inchada ou falta de ar), pare logo de tomar este medicamento e contacte o seu médico imediatamente.
- Se está a tomar outros medicamentos conhecidos como inibidores não-seletivos irreversíveis da monoamina oxidase (IMAOs), uma vez que podem ocorrer reações graves ou até fatais (por exemplo, iproniazida, usado para tratar a depressão).

O tratamento com Fluoxetina Aurobindo só deve ser iniciado 2 semanas após a interrupção de um IMAO irreversível, não-seletivo.

Não tome nenhum IMAO irreversível, não-seletivo durante pelo menos 5 semanas após a interrupção da terapêutica com Fluoxetina Aurobindo. Se Fluoxetina Aurobindo lhe tiver sido prescrito para um período longo e/ou em doses elevadas, deve ser considerado um intervalo maior pelo seu médico.

- está a tomar metoprolol (para tratamento da insuficiência cardíaca), pois há um risco acrescido de que os seus batimentos cardíacos se tornem demasiado lentos.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Fluoxetina Aurobindo se alguma das seguintes situações se aplicar a si:

- problemas cardíacos;
- começar a ter febre, rigidez muscular ou tremor, alterações do estado mental incluindo confusão, irritabilidade e agitação extrema; pode sofrer da chamada "síndrome da serotonina" ou "síndrome neuroléptica maligna". Embora esta síndrome raramente ocorra podem resultar condições que potencialmente coloquem a vida em risco; contacte o seu médico imediatamente, dado que Fluoxetina Aurobindo pode necessitar de ser descontinuado;
- se está a tomar medicamentos que contêm buprenorfina. A utilização destes medicamentos juntamente com Fluoxetina Aurobindo pode causar síndrome serotoninérgica, uma condição potencialmente fatal (ver «Outros medicamentos e Fluoxetina Aurobindo»);
- se sofre de mania agora ou no passado; se teve um episódio maníaco, contacte de imediato o seu médico, pode ter de interromper a toma de Fluoxetina Aurobindo;
- tiver um historial de perturbações hemorrágicas ou desenvolver nódoas negras ou hemorragias inesperadas ou se estiver grávida (ver "Gravidez, amamentação e fertilidade");
- estiver a utilizar medicamentos que tornem o sangue mais fino (ver "Outros medicamentos e Fluoxetina Aurobindo");

- epilepsia ou convulsões; se tiver uma crise (convulsão) ou se tiver um aumento na frequência das convulsões, contacte o seu médico imediatamente, dado que pode necessitar de interromper a toma de Fluoxetina Aurobindo;
- estiver a fazer TEC (Terapia Electroconvulsiva);
- tratamento continuado com tamoxifeno (utilizado para tratar o cancro da mama) (ver "Outros medicamentos e Fluoxetina Aurobindo");
- começar a sentir-se agitado e sentir que não consegue estar quieto sentado ou de pé, (acatisia). Aumentar a sua dose de Fluoxetina Aurobindo pode piorar esta condição;
- diabetes (o seu médico pode necessitar de ajustar a sua dose de insulina ou o seu tratamento antidiabético);
- problemas de fígado (o seu médico pode necessitar de ajustar a sua dose);
- ritmo cardíaco baixo em repouso e/ou se souber que tem carência de sal em resultado de diarreia grave prolongada e vômitos (sentir-se enjoado) ou se utilizar diuréticos (comprimidos para urinar);
- estiver a tomar diuréticos (comprimidos para urinar), especialmente se for idoso; glaucoma (aumento da pressão dentro dos olhos).
- Os chamados IRSN/ISRS podem causar sintomas de disfunção sexual (ver secção 4.8). Em alguns casos, estes sintomas persistiram após a suspensão do tratamento.

Pensamentos relacionados com o suicídio e agravamento da sua depressão ou perturbação de ansiedade

Se se encontra deprimido e/ou tem perturbações de ansiedade poderá por vezes pensar em se autoagredir ou até suicidar. Estes pensamentos podem aumentar no início do tratamento com antidepressivos, pois estes medicamentos necessitam de tempo para atuarem, normalmente cerca de duas semanas, mas por vezes podem demorar mais tempo.

Poderá estar mais predisposto a ter este tipo de pensamentos nas seguintes situações:

- Se tem antecedentes de ter pensamentos acerca de se suicidar ou se autoagredir.
- Se é um jovem adulto. A informação proveniente de estudos clínicos revelou um maior risco de comportamento suicida em indivíduos adultos com menos de 25 anos com problemas psiquiátricos tratados com antidepressivos.

Se em qualquer momento vier a ter pensamentos no sentido de autoagressão ou suicídio contacte o seu médico ou dirija-se imediatamente ao hospital.

Poderá ser útil para si comunicar a uma pessoa próxima de si ou a um familiar que se encontra deprimido ou que tem distúrbios de ansiedade e dar-lhes este folheto a ler. Poderá também solicitar-lhes que o informem caso verifiquem um agravamento do seu estado de depressão ou ansiedade, ou se ficarem preocupados com alterações no seu comportamento.

Crianças e adolescentes (entre os 8 e os 18 anos de idade):

- Doentes com menos de 18 anos de idade quando tomam este tipo de medicamentos, têm um risco aumentado de efeitos indesejáveis, tais como tentativa de suicídio, ideação suicida e hostilidade (predominantemente agressão, comportamento de oposição e raiva). Fluoxetina Aurobindo só deve ser utilizado em crianças e adolescentes com idades entre os 8 e os 18 anos no tratamento de episódios depressivos major moderados a graves (em combinação com uma terapêutica psicológica concomitante) e não deve ser utilizado noutras indicações.

- Além disso, existem apenas escassos dados disponíveis relativos aos efeitos da fluoxetina sobre a segurança a longo prazo no crescimento, na maturação sexual, desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental, neste grupo etário. Apesar disso, se for um doente com menos de 18 anos, o seu médico pode receitar fluoxetina numa depressão moderada a grave em combinação com uma terapêutica psicológica concomitante porque pensa ser o melhor para si. Se o seu médico tiver receitado fluoxetina a um doente com menos de 18 anos e quiser discutir isto, volte a consultar o seu médico. Se algum dos sintomas acima indicados se desenvolver ou se agravar quando doentes com menos de 18 anos estiverem a tomar fluoxetina, deve informar o seu médico.

Fluoxetina Aurobindo não pode ser utilizada no tratamento de crianças com menos de 8 anos.

Outros medicamentos e Fluoxetina Aurobindo

Por favor informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos.

Não tome Fluoxetina Aurobindo com:

- Determinados inibidores irreversíveis, não-seletivos da monoamina oxidase (IMAO), alguns utilizados para tratar a depressão. Os IMAO irreversíveis, não seletivos não devem ser utilizados com Fluoxetina Aurobindo dado que podem ocorrer reações graves ou mesmo fatais (síndrome da serotonina) (ver secção "Não tome Fluoxetina Aurobindo"). O tratamento com Fluoxetina Aurobindo só deve ser iniciado, pelo menos, 2 semanas após interrupção dum IMAO irreversível, não-seletivo (por exemplo tranilcipromina). Não tome nenhum IMAO irreversível, não-seletivo durante, pelo menos, 5 semanas depois de ter interrompido o tratamento com Fluoxetina Aurobindo. Se Fluoxetina Aurobindo lhe tiver sido prescrito para um período longo e/ou em doses elevadas, deve ser considerado um intervalo maior do que 5 semanas pelo seu médico.
- metoprolol quando utilizado para a insuficiência cardíaca; há um risco acrescido de que os seus batimentos cardíacos se tornem demasiado lentos.

Fluoxetina Aurobindo pode alterar o efeito dos seguintes medicamentos (interação):

- tamoxifeno (utilizado no tratamento do cancro da mama); dado que Fluoxetina Aurobindo pode alterar os níveis sanguíneos deste fármaco, originando assim uma possível redução do efeito do tamoxifeno, o seu médico pode ter que considerar tratamentos com diferentes antidepressivos.
- inibidores da monoamina oxidase A (IMAO-A) incluindo moclobemida, linezolda (um antibiótico) e cloreto de metiltionina (também designado por azul de metileno, utilizado para o tratamento da metemoglobinemia: devido ao risco reações graves ou até fatais (designadas por síndrome da serotonina). O tratamento com fluoxetina pode ser iniciado um dia depois de o tratamento com IMAO reversíveis ter sido interrompido, mas o seu médico poderá querer proceder a um acompanhamento cuidadoso e utilizar uma dosagem menor do IMAO-A.
- mequitazina (para tratamento das alergias); tomar este fármaco com Fluoxetina Aurobindo pode aumentar o risco de alterações da atividade elétrica do coração.
- fenitoína (para a epilepsia); dado que Fluoxetina Aurobindo pode influenciar os níveis sanguíneos deste medicamento, o seu médico pode precisar de introduzir a fenitoína com mais cuidado e efetuar exames médicos quando a tomar com Fluoxetina Aurobindo.

- lítio, selegilina, hipericão, tramadol (um analgésico), buprenorfina, triptanos (para as enxaquecas) e triptofano; existe um risco aumentado de síndrome da serotonina ligeira quando estes medicamentos são administrados em associação com Fluoxetina Aurobindo. O seu médico far-lhe-á exames com mais frequência.
- medicamentos que podem afetar o ritmo cardíaco, p. ex. antiarrítmicos de Classe IA e III, antipsicóticos (p. ex. derivados da fenotiazina, pimozida, haloperidol) antidepressivos tricíclicos, certos agentes antimicrobianos, (p. ex. esparfloxacina, moxifloxacina, eritromicina IV, pentamidina), tratamento antimalárico, particularmente halofantrina ou certos anti-histamínicos (astemizol, mizolastina), porque tomar estes medicamentos em associação com Fluoxetina Aurobindo pode aumentar o risco de alterações da atividade elétrica do coração.
- anticoagulantes (como varfarina), AINEs (como ibuprofeno, diclofenac), aspirina e outros medicamentos utilizados para tornar o sangue fino (incluindo a clozapina, utilizada para tratar algumas doenças mentais). Fluoxetina Aurobindo pode alterar o efeito destes medicamentos no sangue. Se o tratamento com Fluoxetina Aurobindo é iniciado ou terminado quando estiver a tomar varfarina, o seu médico irá necessitar de realizar determinados testes, ajustar a dose e examiná-lo com mais frequência.
- ciproheptadina (para as alergias); porque pode reduzir o efeito de Fluoxetina Aurobindo.
- medicamentos que diminuem os níveis de sódio no sangue (incluindo medicamentos que aumentam a frequência urinária, desmopressina, carbamazepina e oxcarbazepina); porque estes medicamentos podem aumentar o risco de os níveis de sódio no sangue se tornarem demasiado baixos, quando estes medicamentos forem administrados com Fluoxetina Aurobindo.
- antidepressivos, como antidepressivos tricíclicos, outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) ou bupropiom, mefloquina ou cloroquina (utilizados para tratar a malária), tramadol (utilizado para tratar as dores fortes) ou antipsicóticos, como as fenotiazinas ou butirofenonas; porque Fluoxetina Aurobindo pode aumentar o risco de convulsões quando tomado em associação com estes medicamentos.
- flecainida, propafenona, nebivolol ou encainida (para problemas cardíacos), carbamazepina (para a epilepsia), atomoxetina ou antidepressivos tricíclicos (p. ex. imipramina, desipramina e amitriptilina) ou risperidona (para a esquizofrenia); dado que Fluoxetina Aurobindo pode eventualmente alterar os níveis destes medicamentos no sangue, o seu médico poderá ter de diminuir a respetiva dose, quando administrados em associação com Fluoxetina Aurobindo.

Alguns medicamentos podem aumentar os efeitos indesejáveis de Fluoxetina Aurobindo e podem, por vezes, provocar reações muito graves. Não tome nenhum outro medicamento enquanto estiver a tomar Fluoxetina Aurobindo sem falar primeiro com o seu médico, especialmente:

- medicamentos que contêm buprenorfina. Estes medicamentos podem interagir com Fluoxetina Aurobindo e poderá experienciar sintomas tais como contrações rítmicas involuntárias dos músculos, incluindo os músculos que controlam o movimento dos olhos, agitação, alucinações, coma, transpiração excessiva, tremor, exagero de reflexos, aumento da tensão muscular, temperatura corporal acima de 38°C. Contacte o seu médico se experienciar estes sintomas.

Fluoxetina Aurobindo com alimentos, bebidas e álcool

- Pode tomar Fluoxetina Aurobindo com ou sem alimentos, conforme preferir.
- Deve evitar o álcool enquanto estiver a tomar este medicamento.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Gravidez

Fale com o seu médico assim que possível se está grávida, pensa que está grávida ou planeia engravidar.

Tem havido alguns estudos que descrevem um risco aumentado de defeitos à nascença que afetam o coração em bebés cujas mães tomaram fluoxetina durante os primeiros meses de gravidez. Na população em geral, cerca de 1 em cada 100 bebés nascem com um defeito no coração. Este valor aumenta para 2 em cada 100 quando as mães tomaram fluoxetina.

Quando tomados durante a gravidez, particularmente nos últimos 3 meses da gravidez, medicamentos como a fluoxetina podem aumentar o risco de uma condição grave nos bebés, chamada hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HPPRN), que torna a respiração do bebé mais rápida e lhe dá um aspeto azulado. Estes sintomas aparecem habitualmente durante as primeiras 24 horas após o nascimento do bebé. Se isto acontecer ao seu bebé, deve contactar imediatamente a sua parteira e/ou médico.

É preferível não usar este tratamento durante a gravidez a não ser que os benefícios potenciais sejam superiores ao risco potencial. Assim, você e seu médico podem decidir que é melhor para si parar gradualmente de tomar Fluoxetina Aurobindo enquanto está grávida ou antes de engravidar. No entanto, dependendo das circunstâncias, o seu médico pode sugerir que é melhor para si continuar com o tratamento com Fluoxetina Aurobindo.

Deve ter-se cuidado quando se utilizar durante a gravidez, especialmente durante a final da gravidez ou mesmo antes do parto, dado que os seguintes efeitos indesejáveis foram comunicados em recém-nascidos: irritabilidade, tremor, fraqueza nos músculos, choro persistente, dificuldade de sucção ou em dormir.

Se tomar Fluoxetina Aurobindo próximo do final da gravidez pode existir um risco aumentado de hemorragia vaginal abundante pouco depois do parto, em especial se tiver história de doenças hemorrágicas. O seu médico ou especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica devem ter conhecimento de que está a tomar Fluoxetina Aurobindo, para que a possam aconselhar.

Amamentação

A fluoxetina é excretada no leite materno e pode provocar efeitos indesejáveis nos bebés. Apenas deve amamentar se for absolutamente necessário. Se continuar a amamentar, o seu médico pode receitar-lhe uma dose mais baixa de fluoxetina.

Fertilidade

Em estudos com animais, ficou demonstrado que a fluoxetina reduz a qualidade do esperma. Teoricamente, este facto pode afetar a fertilidade, mas ainda não se observou qualquer impacto na fertilidade dos humanos.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Medicamentos psicotr3picos como Fluoxetina Aurobindo podem afetar o seu discernimento ou a sua coordena33o. N3o conduza nem utilize m3quinas at3 perceber os efeitos de Fluoxetina Aurobindo em si.

Fluoxetina Aurobindo cont3m s3dio

Este medicamento cont3m menos do que 1 mmol (23 mg) de s3dio por c3psula, ou seja, 3 praticamente "isento de s3dio".

3. Como tomar Fluoxetina Aurobindo

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu m3dico ou farmac3utico. Fale com o seu m3dico ou farmac3utico se tiver d3vidas.

N3o tome mais c3psulas do que aquelas que o m3dico lhe indicou.

Engula as c3psulas com um copo de 3gua. N3o mastigue as c3psulas.

Adultos:

A dose recomendada 3:

- Depress3o: a dose recomendada 3 1 c3psula (20 mg) por dia. O seu m3dico reajustar3 a sua dose se necess3rio dentro de 3 ou 4 semanas ap3s o in3cio do tratamento. Quando necess3rio a dose pode ser gradualmente aumentada at3 um m3ximo de 3 c3psulas (60 mg) por dia. A dose deve ser aumentada com cuidado de modo a assegurar que voc3 toma a dose eficaz mais baixa. Voc3 pode n3o se sentir melhor imediatamente ap3s ter come3o a tomar o seu medicamento para a depress3o. Isto 3 normal pois uma melhoria nos sintomas da depress3o pode verificar-se s3 ap3s as primeiras semanas de tratamento. Os doentes com depress3o devem ser tratados durante um per3odo de pelo menos 6 meses.
- Bulimia nervosa: a dose recomendada 3 3 c3psulas (60 mg) por dia.
- Perturba33o Obsessivo-Compulsiva: a dose recomendada 3 1 c3psula (20 mg) por dia. O seu m3dico ir3 rever e reajustar a sua dose se necess3rio ap3s duas semanas de tratamento. Quando adequado a dose pode ser gradualmente aumentada at3 um m3ximo de 3 c3psulas (60 mg) por dia. Se n3o se notar melhoras dentro de 10 semanas, o seu m3dico ir3 reconsiderar o seu tratamento.

Crian3as e adolescentes com idades entre os 8 e os 18 anos de idade com depress3o:

O tratamento deve ser iniciado e monitorizado por um especialista. A dose inicial 3 10 mg/dia (administrada sob a forma de 2,5 ml de fluoxetina solu33o oral).

Ap3s uma ou duas semanas o seu m3dico pode aumentar a dose para 20 mg/dia. A dose deve ser aumentada com cuidado, de modo a assegurar que voc3 toma a dose eficaz mais baixa. Crian3as de baixo peso podem precisar de doses mais baixas. Se tiver tido uma resposta satisfat3ria ao tratamento, o seu m3dico ir3 rever a necessidade de continuar o tratamento para al3m de 6 meses. Se n3o tiver melhorado dentro de 9 semanas, o seu m3dico ir3 reavaliar o seu tratamento.

Idosos

Se for idoso, o seu m3dico aumentar3 a dose com mais cuidado e a dose di3ria geralmente n3o deve ultrapassar as 2 c3psulas (40 mg) por dia. A dose m3xima 3 3 c3psulas (60 mg) por dia.

Insufici3ncia hep3tica

Se tiver um problema de fígado ou se estiver a fazer outra medicação que possa influenciar o Fluoxetina Aurobindo, o seu médico pode decidir receitar-lhe uma dose mais baixa ou aconselhá-lo a tomar Fluoxetina Aurobindo em dias alternados.

Se tomar mais Fluoxetina Aurobindo do que deveria

- Se tomar cápsulas a mais, dirija-se ao serviço de urgência do hospital mais próximo ou informe o seu médico imediatamente.
- Leve consigo a embalagem de Fluoxetina Aurobindo se puder.

Os sintomas de sobredosagem incluem: náuseas, vômitos, convulsões, problemas cardíacos (tais como batimentos cardíacos irregulares e paragem cardíaca), problemas pulmonares e alterações do estado mental que podem ir da agitação ao coma.

Caso se tenha esquecido de tomar Fluoxetina Aurobindo

- Se se esquecer de tomar uma dose, não se preocupe. Tome a próxima dose no dia a seguir, à hora habitual. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
- Tomar o seu medicamento à mesma hora todos os dias pode ajudá-lo a lembrar-se de o tomar regularmente.

Se parar de tomar Fluoxetina Aurobindo

- Não deixe de tomar Fluoxetina Aurobindo sem perguntar primeiro ao seu médico, mesmo que comece a sentir-se melhor. É importante que continue a tomar o seu medicamento.
- Certifique-se que não deixa acabar as cápsulas.

Quando parar de tomar Fluoxetina Aurobindo poderá notar os efeitos indesejáveis seguintes (sintomas de abstinência): tonturas, sensação de formigueiro (agulhas e alfinetes); distúrbios do sono (sonhos intensos, pesadelos, dificuldade em dormir); sentir-se agitado e inquieto; um cansaço ou fraqueza anormal; sentir-se ansioso; náuseas/vômitos (sentir-se enjoado ou ficar enjoado) tremores; dor de cabeça.

A maioria dos doentes acha que, quando se deixa de tomar Fluoxetina Aurobindo os sintomas são normalmente ligeiros a moderados e desaparecem em poucas semanas. Se tiver alguns sintomas quando parar o tratamento com Fluoxetina Aurobindo consulte o seu médico.

Quando parar de tomar Fluoxetina Aurobindo o seu médico ajudá-lo-á a reduzir a dose gradualmente, durante uma ou duas semanas – Isto deve ajudá-lo a superar possíveis sintomas de privação.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

- Se pensar em se autoagredir ou pensar em suicídio em qualquer altura do tratamento, contacte o seu médico ou vá imediatamente ao hospital (ver Secção 2).

- Se tiver erupção na pele ou uma reação alérgica tal como comichão, lábios/língua inchados ou pieira/falta de ar, pare de tomar as cápsulas de imediato e informe o seu médico imediatamente.
- Se se sentir agitado e sentir que não consegue estar quieto sentado ou de pé, pode sofrer de acatisia; aumentar a sua dose de Fluoxetina Aurobindo pode fazê-lo sentir-se pior. Se tiver estes sintomas, contacte o seu médico.
- Contacte o seu médico imediatamente se a sua pele começar a ficar vermelha ou se desenvolver uma reação na pele variada ou a pele começar a formar bolhas ou descamar. Isto é muito raro.

Os efeitos indesejáveis mais frequentes (efeitos indesejáveis muito frequentes que podem afetar mais do que 1 utilizador em cada 10) são insónias, dores de cabeça, diarreia, sentir-se indisposto (náuseas) e fadiga.

Alguns doentes tiveram:

- uma combinação de sintomas (conhecidos como "síndrome serotoninérgico") incluindo febre inexplicável com respiração ou batimentos cardíacos rápidos, sudação ou rigidez muscular ou tremores, confusão, agitação extrema ou sonolência (apenas raramente);
- sentimentos de fraqueza, sedação ou confusão, na maior parte em idosos e em doentes (idosos) que tomam diuréticos (comprimidos para urinar);
- ereção prolongada e dolorosa;
- irritabilidade e agitação extrema.
- problemas cardíacos, tais como batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, desmaios, quedas ou tonturas quando estão de pé o que pode indicar funcionamento anormal do ritmo cardíaco.

Se detetar algum dos efeitos indesejáveis acima mencionados, fale com o seu médico imediatamente.

Os seguintes efeitos indesejáveis também têm sido comunicados em doentes a tomar fluoxetina:

Frequentes (podem afetar até 1 em cada 10 pessoas)

- falta de apetite, perda de peso;
- nervosismo, ansiedade;
- agitação, falta de concentração;
- sentir-se tenso;
- diminuição do desejo sexual ou problemas de ordem sexual (incluindo dificuldade - em manter uma ereção durante a atividade sexual);
- problemas de sono, sonhos estranhos, cansaço ou insónia;
- tonturas;
- alterações do paladar;
- movimentos de tremor involuntários;
- visão turva;
- sensações de batimentos cardíacos rápidos e irregulares;
- rubor;
- bocejos;
- indigestão, vómitos;
- boca seca;
- erupção cutânea, urticária e comichão;
- sudorese excessiva;

dores nas articulações;

- urinar com mais frequência;
- hemorragia vaginal inexplicável;
- sentir-se a tremer ou arrepios.

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em cada 100 pessoas)

- sentir-se fora de si;
- pensamentos estranhos;
- euforia anormal;
- problemas de orgasmo;
- pensamentos suicidas ou de autoagressão;
- ranger dos dentes;
- contração muscular, movimentos involuntários ou problemas de equilíbrio ou de coordenação;
- diminuição da memória;
- pupilas dilatadas;
- zumbidos nos ouvidos (apitos);
- pressão arterial baixa;
- falta de ar;
- hemorragia nasal;
- dificuldades em engolir;
- perda de cabelo;
- tendência acrescida para nódos negros;
- equimoses inexplicáveis ou hemorragia;
- suores frios;
- dificuldade em urinar;
- sentir frio ou calor;
- resultados anormais dos testes hepáticos.

Raros (podem afetar até 1 em cada 1.000 pessoas)

- níveis baixos de sal no sangue;
- redução das plaquetas no sangue, o que aumenta o risco de hemorragias e nódos negros;
- redução dos glóbulos brancos no sangue;
- comportamento rebelde incomum;
- alucinações;
- agitação;
- ataques de pânico;
- confusão;
- gaguez;
- agressividade;
- convulsões;
- vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos);
- inchaço rápido dos tecidos à volta do pescoço, face, boca e/ou garganta;
- dor no canal que transporta a comida ou a água ao estômago;
- hepatite;
- problemas pulmonares;
- sensibilidade à luz do sol;
- dores musculares;
- problemas em urinar;
- produção de leite pela glândula mamária.

Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis)

- Hemorragia vaginal abundante pouco depois do parto (hemorragia pós-parto), ver
- Gravidez, amamentação e fertilidade na secção 2 para mais informações.

Fraturas ósseas: observou-se um risco aumentado de fraturas ósseas em doentes a tomar este tipo de medicamentos.

A maioria destes efeitos indesejáveis têm tendência a desaparecer com a continuação do tratamento.

Em crianças e adolescentes (8-18 anos) – Além dos possíveis efeitos indesejáveis listados acima, a Fluoxetina Aurobindo pode atrasar o crescimento ou atrasar a maturação sexual. Comportamentos relacionados com suicídio (tentativa de suicídio e pensamentos suicidas), hostilidade, mania e hemorragias nasais também foram comunicadas com frequência em crianças.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Fluoxetina Aurobindo

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo, embalagem exterior, após "EXP". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Fluoxetina Aurobindo

A substância ativa é o cloridrato de fluoxetina.

Cada cápsula contém 22,357 mg de cloridrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina.

Cada cápsula contém 67,072 mg de cloridrato de fluoxetina equivalente a 60 mg de fluoxetina.

Os outros componentes são:

Conteúdo da cápsula: Amido de milho pré-gelificado, celulose microcristalina, sílica coloidal anidra.

Invólucro da cápsula: Óxido de ferro amarelo (E172), azul patenteado V (E131), dióxido de titânio (E171), gelatina, laurilsulfato de sódio.

Tinta de impressão: Shellac, propilenoglicol, óxido de ferro preto (E172), hidróxido de potássio.

Qual o aspeto de Fluoxetina Aurobindo e conteúdo da embalagem
Cápsula.

Fluoxetina Aurobindo 20 mg cápsulas:

Cápsula de gelatina tamanho "4" com cabeça verde opaca e corpo amarelo, contendo um pó branco a esbranquiçado, gravada com "J" na cabeça verde opaca e com "96" no corpo amarelo, com tinta preta.

Fluoxetina Aurobindo 60 mg cápsulas:

Cápsula de gelatina tamanho "1" com cabeça verde opaca e corpo amarelo, contendo um pó branco a esbranquiçado, gravada com "J" na cabeça verde opaca e com "95" no corpo amarelo, com tinta preta.

As cápsulas de Fluoxetina Aurobindo estão disponíveis em blister de PVC/PVdC-folha de alumínio e frasco de polietileno de elevada densidade (HDPE) com fecho de polipropileno.

Blister: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 e 60 cápsulas.

Frasco: 28 e 500 cápsulas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugal

Fabricantes

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road,

Ruislip HA4 6QD

Reino Unido

ou

APROVADO EM 09-09-2021 INFARMED

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,
Birzebbugia, BBG 3000
Malta

Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu (EEE) com os seguintes nomes:

Chipre:	Fluoxetine Aurobindo 20 mg καψάκιο, σκληρό
República Checa:	Fluoxetine Aurovitas
Malta:	Fluoxetine 20 mg capsules, hard
Portugal:	Fluoxetina Aurobindo
Espanha:	FLUOXETINA AUROBINDO 20 mg cápsulas duras EFG
Reino Unido:	Fluoxetine 60 mg capsules, hard

Este folheto foi revisto pela última vez em