

|                                       |
|---------------------------------------|
| APROVADO EM<br>05-05-2005<br>INFARMED |
|---------------------------------------|

## **FOLHETO INFORMATIVO**

**Leia atentamente este folheto antes de aplicar o medicamento.**

**Este folheto contém informações relativas ao HEXASPRAY.** Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler. Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

**Guarde este folheto até terminar esta embalagem.** Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

**Neste folheto:**

- O que é HEXASPRAY e para que é utilizado
- Antes de utilizar HEXASPRAY
- Como utilizar HEXASPRAY
- Efeitos secundários possíveis
- Conservação de HEXASPRAY
- Outras informações

**O que é o HEXASPRAY:**

O HEXASPRAY é uma solução para pulverização bucal sob a forma de nebulizador, numa embalagem de 30 g, e tem como substância activa o biclotimol e os seguintes excipientes inactivos: Álcool benzílico, EDTA dissódico, Metilparabeno, Glicirrizinato de amónio, Essência de aniz, Sacarina sódica, Celulose microcristalina e carboximetilcelulose, Lecitina de soja, Glicerina, Álcool a 95°, Água purificada q.b.p. .

**O Detentor da Autorização de Introdução no Mercado é a**

DECFARMA –Comércio de Produtos Farmacêuticos,Lda.  
Rua Armindo Rodrigues, nº 9 -A  
1600-414 LISBOA

### **1. O QUE É HEXASPRAY E PARA QUE É UTILIZADO**

**O HEXASPRAY é um medicamento é utilizado para:**

- Faringites agudas
- Faringites crónicas
- Faringites post-amigdalectomia
- Amigdalectes agudas

### **2. ANTES DE APLICAR HEXASPRAY**

Não aplique **HEXASPRAY** se tem hipersensibilidade (alergia à substância activa} ou a qualquer outro ingrediente de HEXASPRAY.

### **Tome especial cuidado com HEXASPRAY**

As solução para pulverização bucal sob a forma de spray são em princípio contra indicados nos bebés até aos 30 meses de idade (risco de laringospasmo).

O tratamento deve ser mantido até dois dias após o desaparecimento dos sintomas, não devendo

|                                       |
|---------------------------------------|
| APROVADO EM<br>05-05-2005<br>INFARMED |
|---------------------------------------|

ultrapassar em geral, dez dias. Se ao fim deste período de tempo ainda tiver sintomas deverá o seu médico.

**Usar o HEXASPRAY com alimentos e bebidas:**

**O HEXASPRAY não interfere com alimentos ou bebidas.**

#### **Gravidez**

Por uma questão de estrito rigor, não deve ser administrado a grávidas sobretudo no primeiro trimestre.

#### **Aleitamento**

**O HEXASPRAY não deve ser aplicado durante o aleitamento.**

#### **Condução de veículos e utilização de máquinas:**

O HEXASPRAY não interfere com a condução de veículos ou a utilização de máquinas.

#### **Informações importantes sobre alguns ingredientes de HEXASPRAY:**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

### **3. COMO APLICAR O HEXASPRAY**

Para adultos

Abrir a boca baixando a língua. Agitar o frasco antes de cada utilização.

Carregar no accionador do spray e pulverizar 2 vezes, 3 vezes ao dia.

#### **Caso se tenha esquecido de tomar HEXASPRAY:**

Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de aplicar

### **4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS**

Como os demais medicamentos, HEXASPRAY pode ter efeitos secundários.

Em raríssimos casos, e imediatamente após a aplicação, há uma sensação de irritação na oro-faringe..

Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

### **5. CONSERVAÇÃO DE HEXASPRAY**

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25°C

Conservar na embalagem de origem

Não utilize HEXASPRAY após expirar o prazo de validade indicado na embalagem..

### **6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da autorização de introdução no mercado.

Data de aprovação deste folheto:

Maio de 2005

APROVADO EM  
05-05-2005  
INFARMED