

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Lassadermil 250 mg/g pomada  
Óxido de zinco

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si:

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Lassadermil e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Lassadermil
3. Como utilizar Lassadermil
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Lassadermil
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

#### 1. O que é Lassadermil e para que é utilizado

Lassadermil é uma pomada dermatológica com efeito secante, absorvente, adstringente e antisséptico suave, composta por óxido de zinco a 250 mg/g.

Lassadermil está indicado em:

- Casos de prurido;
- Pequenas escoriações;
- Queimaduras superficiais;
- Dermatite de contacto;
- Dermatite amoniacal (dermatite da fralda);
- Eczemas.

Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

#### 2. O que precisa de saber antes de utilizar Lassadermil

Não utilize Lassadermil

- se tem alergia ao óxido de zinco ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Lassadermil.  
Lassadermil destina-se apenas a uso externo.

Outros medicamentos e Lassadermil

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, ou tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.

Não se conhecem interações para o Lassadermil, uma vez que se trata de um produto de aplicação tópica, com um grau de absorção sistémica extremamente reduzido.

No caso de utilizar outros medicamentos para aplicação tópica, remova completamente a pomada da pele antes de aplicar qualquer outro medicamento, uma vez que pode afetar a ação desse medicamento.

#### Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.

Não existem estudos acerca da utilização tópica de óxido de zinco em mulheres grávidas ou a amamentar que evidenciem o perigo da sua utilização.

Lassadermil pode ser utilizado durante a gravidez e no período de amamentação, pelo facto de o grau de absorção sistémica, na sequência de uma aplicação tópica, ser extremamente reduzido.

Não é recomendada a aplicação de Lassadermil nos mamilos de mulheres a amamentar devido ao risco de ingestão do lactente.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

Os efeitos de Lassadermil sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

#### Lassadermil contém lanolina

A lanolina pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).

#### Lassadermil contém metilparabeno e propilparabeno

O metilparabeno e o propilparabeno podem causar reações alérgicas (possivelmente retardadas).

### 3. Como utilizar Lassadermil

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A posologia aconselhada é, em média, duas a três aplicações diárias após limpeza prévia da zona a tratar. Quando utilizado na higiene do bebé, a aplicação faz-se em função dessa mesma higiene.

Abra a tampa da bisnaga, exerça uma ligeira pressão sobre esta, deixando sair a quantidade desejada da pomada, de modo a obter uma camada fina sobre a pele.

Nas irritações cutâneas em que a pele está intacta, aplique uma quantidade de pomada que cubra a parte afetada e espalhe massajando suavemente.

Nas feridas superficiais pode cobri-las com um penso ou gaze previamente untado com a pomada. Troque o penso, ou a gaze, diariamente.

#### Se utilizar mais Lassadermil do que deveria

Não são de esperar, nem se conhecem casos de sobredosagem com o medicamento Lassadermil, devido à via de aplicação e à formulação.

No caso de ingestão contacte o seu médico imediatamente.

Caso se tenha esquecido de utilizar Lassadermil

Não utilize numa dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Os seguintes efeitos podem verificar-se:

Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis)

- Dermatite de contacto;
- Irritação cutânea local (não presente antes da utilização deste medicamento);
- Reações alérgicas locais (possivelmente retardadas);
- Reações de sensibilização a alguns dos componentes (em tais situações deve suspender a medicação).
- A ingestão de óxido de zinco poderá provocar náuseas, vômitos, dor abdominal e em casos mais graves lesão gastroduodenal corrosiva.

#### Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>  
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

e-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

#### 5. Como conservar Lassadermil

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não conservar acima de 25°C.

Proteger da luz e humidade.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

#### 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Lassadermil

A substância ativa é o óxido de zinco.

Os outros componentes são lanolina anidra, vaselina sólida, parafina líquida, metilparabeno, propilparabeno e amido de trigo.

Qual o aspeto de Lassadermil e conteúdo da embalagem

Lassadermil é apresentado sob a forma farmacêutica de pomada, em bisnagas contendo 25 g.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos S.A.

Av. 25 de Abril, 6-6A

2795-225 Linda-a-Velha

Portugal

Tel: +351 214158130

Fax: +351 214158131

E-mail: geral@edol.pt

Este folheto foi revisto pela última vez em