APROVADO EM
15-07-2022
INFARMED

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma 20 mg + 12,5 mg comprimidos

lisinopril + hidroclorotiazida

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.

O que contém este folheto:
1. O que é Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma
3. Como tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma e para que é utilizado

Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma é utilizado para tratar a pressão arterial elevada (hipertensão). Contém dois medicamentos denominados lisinopril e hidroclorotiazida.
- O lisinopril pertence a um grupo de medicamentos denominados inibidores da ECA (inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina). Este atua através da dilatação dos vasos sanguíneos, que ajudam a reduzir a pressão arterial e o coração a bombear sangue suficiente para todo o corpo.
- A hidroclorotiazida pertence a um grupo de medicamentos denominados diuréticos (comprimidos diuréticos). Os diuréticos atuam nos rins e ajudam o seu corpo a eliminar águas e sais, como sódio, através da urina.
Estes medicamentos atuam em conjunto para reduzir a sua pressão arterial.

2. O que precisa de saber antes de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma

Não tome Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma:
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao lisinopril ou à hidroclorotiazida ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- se alguma vez teve reações alérgicas a outro medicamento inibidor da ECA. A reação alérgica pode ter causado inchaço das mãos, pés, tornozelos, cara, lábios, língua ou garganta. Poderá também ter causado dificuldade em engolir ou respirar.
- se um membro da sua família teve uma reação alérgica a um medicamento inibidor da ECA.

- se é alérgico a substâncias derivadas das sulfonamidas (um tipo de antibiótico). Pergunte ao seu médico se não tiver a certeza que isto se aplica a si.
- se tem alguma doença nos rins.
- se parou de urinar.
- se sofre de doença grave no fígado.
- se tiver mais do que três meses de gravidez. (Também é preferível não tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma no início da gravidez – ver secção "Gravidez e amamentação").
- se tem diabetes ou função renal diminuída e está a ser tratado com um medicamento que contém aliscireno para a pressão arterial.

Não tome Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma se alguma das situações acima descritas se aplica a si. Caso tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma.

Antes de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma informe o seu médico ou farmacêutico se:
- Tem um estreitamento (estenose) das válvulas do coração (aórtica e mitral), da artéria aorta (no coração) ou da artéria renal (nos rins).
- Tem um aumento da espessura do músculo cardíaco (conhecida como cardiomiopatia hipertrófica).
- Tem pressão arterial baixa (esta poderá manifestar-se sob a forma de tonturas ou de sensação de cabeça vazia, especialmente quando está de pé).
- Tem insuficiência cardíaca (quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo) e a pressão arterial normal ou baixa.
- Tem problemas renais ou se faz hemodiálise, ou se estiver a fazer um tratamento chamado aférese das LDL.
- Tem problemas hepáticos.
- Tem diabetes e está a ser tratado com medicamentos antidiabéticos orais ou insulina.
- Tem gota.
- Tem diarreia ou vómitos.
- Tem dieta com restrição de sal ou se está a tomar suplementos de potássio, ou substitutos do sal que contenham potássio, ou diuréticos poupadores de potássio ou medicamentos que possam aumentar o potássio no sangue (por exemplo a heparina).
- Tem níveis elevados de colesterol.
- Está a fazer um tratamento com diuréticos (medicamentos utilizados para aumentar a eliminação de urina).
- Tem uma doença chamada lúpus eritematoso sistémico (também denominada "LES").
- Caso tenha tido cancro da pele ou se desenvolver uma lesão cutânea inesperada durante o tratamento. O tratamento com hidroclorotiazida, no caso particular da utilização de doses elevadas a longo prazo, pode aumentar o risco de alguns tipos de cancro da pele e do lábio (cancro da pele não-melanoma). Proteja a sua pele contra a exposição solar e a radiação ultravioleta, enquanto estiver a tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma.
- Deve informar o seu médico se pensa estar grávida (ou planeia engravidar). Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma não está recomendado no início da

gravidez e não deve ser tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura.
- Está a tomar algum dos seguintes medicamentos utilizados para tratar a pressão arterial elevada:
  - um antagonista dos recetores da angiotensina II (ARA) (também conhecidos como sartans - por exemplo valsartan, telmisartan, irbesartan), em particular se tiver problemas nos rins relacionados com diabetes.
  - aliscireno
- Já teve problemas respiratórios ou pulmonares (incluindo inflamação ou líquido nos pulmões) após a toma de hidroclorotiazida. Se desenvolver qualquer falta de ar grave ou dificuldade em respirar após tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma, procure assistência médica imediatamente.
- Se sentir uma diminuição na visão ou dor ocular. Estes podem ser sintomas de acumulação de líquido na camada vascular do olho (efusão coroidal) ou um aumento da pressão no olho e podem ocorrer dentro de horas a semanas depois de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma.

O seu médico pode verificar a sua função renal, pressão arterial e a quantidade de eletrólitos (p.ex. potássio) no seu sangue em intervalos regulares.

Ver também a informação sob o título "Não tome Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma:"

Se estiver a tomar alguns dos seguintes medicamentos, o risco de angioedema (inchaço rápido sob a pele em zonas como a garganta) é acrescido:
- sirolimus, everolimus e outros medicamentos que pertencem à classe dos inibidores de mTOR (utilizados para evitar a rejeição de órgãos transplantados)

Pare de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma e contacte o seu médico imediatamente se lhe acontecer alguma das seguintes situações (uma reação alérgica):
- Se tiver dificuldade em respirar com ou sem inchaço da cara, lábios, língua e/ou garganta.
- Se tiver inchaço da cara, lábios, língua e/ou garganta que lhe possam causar dificuldade em engolir.
- Se tiver comichão intensa na pele (com inchaços ou nódulos).

Deve também suspender o tratamento e contactar o seu médico em caso de:
- Observar uma coloração amarelada da pele e do branco dos olhos (icterícia);
- Sentir secura da boca, sede, fraqueza, sonolência, dores musculares ou cãibras, fadiga muscular, ritmo cardíaco acelerado e náuseas ou vómitos (desequilíbrio de fluidos ou eletrólitos).

Tratamento de dessensibilização (para alergias a picadas de insetos)
Informe o seu médico se está ou irá fazer um tratamento para diminuir os efeitos de uma alergia, por exemplo, a picadas de insetos (como abelhas ou vespas). Se tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma durante este tratamento, pode ter uma reação alérgica grave.

Intervenções (cirurgias)
Em caso de cirurgia (incluindo cirurgia dentária) ou anestesia deverá informar o seu médico ou dentista que está a tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma. Isto

porque poderá ter uma descida da pressão arterial (hipotensão) se lhe forem administrados alguns anestésicos locais ou gerais enquanto está a tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma.

Crianças
Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma não está recomendado em crianças com idade inferior a 18 anos.

Outros medicamentos e Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma
Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica e medicamentos à base de plantas. Isto porque o Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma pode afetar o modo de ação de alguns medicamentos e alguns medicamentos podem afetar o Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma. O seu médico pode necessitar de alterar a sua dose e/ou tomar outras precauções:

Em particular, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:
- Outros medicamentos para ajudar a reduzir a pressão arterial (anti-hipertensores), por exemplo aliscireno.
- Outros medicamentos para o tratamento da pressão arterial elevada (anti-hipertensores), incluindo antagonistas dos recetores da angiotensina II, ou aliscireno (ver também a informação sob o título "Não tome Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma".
- Um inibidor da ECA ou aliscireno (ver também informações sob os títulos "Não tome Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma:" e "Advertências e precauções").
- Medicamentos associados com baixo potássio no sangue (hipocaliemia), tais como diuréticos ("comprimidos de água" incluindo os que conservam potássio), laxantes, corticosteroides (por exemplo prednisona), ACTH (uma hormona), anfotericina (um medicamento antifúngico) e derivados do ácido acetilsalicílico.
- Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), tais como aspirina, ibuprofeno ou indometacina, os quais são utilizados para tratar dores musculares e artrite.
- Medicamentos para perturbações mentais, tal como lítio.
- Suplementos de potássio, substitutos de sal contendo potássio ou outros medicamentos que possam aumentar o potássio no seu sangue (tal como o cotrimoxazol também conhecido como trimetoprim/sulfametoxazol).
- Medicamentos para a diabetes (insulina e antidiabéticos orais, tais como sulfonilureias). A sua dose de medicamentos antidiabéticos pode ser alterada quando tomar diuréticos tiazídicos.
- Medicamentos contendo ouro, como aurotiomalato de sódio, que podem ser administrados através de uma injeção (utilizado para tratamento da artrite reumatoide).
- Medicamentos utilizados no tratamento da asma.
- Medicamentos para tratar a congestão nasal ou dos seios perinasais ou outros medicamentos para resfriados (incluindo os que pode comprar na farmácia sem receita).
- Medicamentos para suprimir a resposta imunitária do organismo (imunossupressores).
- Alopurinol (para a gota).
- Procainamida ou sotalol (para problemas de coração).
- Medicamentos utilizados para tratar o cancro (p.ex. ciclofosfamida, metotrexato).

- Sais de cálcio ou suplementos de Vitamina D.
- Medicamentos para o coração (p.ex. digoxina) ou outros medicamentos para controlar o ritmo do seu coração.
- Ciclosporina.
- Colestiramina e colestipol (para diminuir o colesterol no sangue).
- Medicamentos utilizados com maior frequência para evitar a rejeição de órgãos transplantados (sirolimus, everolimus e outros medicamentos que pertencem à classe dos inibidores de mTOR). Consulte a secção "Advertências e precauções".

A pressão arterial baixa pode ser agravada pelo álcool, barbitúricos ou anestésicos. Pode sentir tonturas ou sensação quando está de pé.

Gravidez, amamentação e fertilidade
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Gravidez
Deve informar o seu médico se pensa que está grávida (ou planeia engravidar). O seu médico normalmente irá aconselhá-la a interromper Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma antes de engravidar ou assim que estiver grávida e a tomar outro medicamento em vez de Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma. Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma não está recomendado no início da gravidez e não deve ser tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura.

Amamentação
Deverá informar o seu médico de que se encontra a amamentar ou que pretende iniciar a amamentação. A hidroclorotiazida (um dos componentes do medicamento) é excretada no leite materno em pequenas quantidades e altas doses podem inibir a produção de leite. Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma não está recomendado em mães a amamentar, especialmente se o bebé for recém-nascido ou prematuro; nestes casos o seu médico poderá indicar outro tratamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Algumas pessoas poderão sentir tonturas ou fadiga durante o tratamento com este medicamento. Se isto lhe acontecer, não conduza nem utilize ferramentas ou máquinas.
Deve esperar para ver como é que este medicamento o afeta, antes de realizar estas atividades.

Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma contém Sódio
Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é praticamente "isento de sódio".

3. Como tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

APROVADO EM
15-07-2022
INFARMED

Uma vez iniciado o tratamento com Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma, o seu médico poderá solicitar análises ao sangue. O seu médico poderá ajustar a sua dose para que tome a quantidade correta de medicamento.

Como tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma
Engula o comprimido com água.
Tente tomar os seus comprimidos à mesma hora todos os dias. É indiferente se toma Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma antes ou depois das refeições.
Continue a tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma durante o tempo recomendado pelo seu médico; é um tratamento prolongado. É importante que tome Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma todos os dias.

A ranhura do comprimido não se destina à sua divisão.

Tomar a primeira dose
Tome especial cuidado quando tomar a primeira dose de Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma ou se a sua dose for aumentada. Poderá causar uma maior descida da pressão arterial do que a que ocorrerá com as doses seguintes.
Poderá sentir tonturas ou ter uma sensação de cabeça vazia. Se isto lhe acontecer, poderá ser útil deitar-se. Se esta situação o preocupar, consulte o seu médico assim que possível.

Adultos
A dose habitual recomendada é de um comprimido uma vez por dia. O seu médico irá prescrever o comprimido com a dosagem indicada para si.
Se necessário, o seu médico pode aumentar a sua dose para dois comprimidos uma vez por dia.

Se tomar mais Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma do que deveria
Se tomou mais Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma do que o que lhe foi receitado pelo seu médico, contacte um médico ou dirija-se ao hospital imediatamente. Leve a embalagem consigo para que os comprimidos possam ser identificados.

Caso se tenha esquecido de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma
Se se esquecer de tomar uma dose faça-o assim que se lembrar. No entanto, se já não faltar muito tempo para a próxima dose, ignore a dose esquecida.
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma
Não pare de tomar os seus comprimidos, mesmo que se sinta bem, exceto se por recomendação do seu médico.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

APROVADO EM
15-07-2022
INFARMED

Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma contém dois medicamentos: lisinopril e hidroclorotiazida. Os seguintes efeitos indesejáveis foram observados com este medicamento.

Reações alérgicas graves (raras, afetam menos de 1 em cada 1.000 pessoas)
Pare de tomar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma e contacte um médico imediatamente se tiver uma reação alérgica grave. Os sinais podem incluir o súbito aparecimento de:
- Inchaço da sua cara, lábios, língua ou garganta. Isto pode causar dificuldade em engolir.
- Inchaço grave e súbito das suas mãos, pés ou tornozelos.
- Dificuldade em respirar.
- Comichão intensa na pele (com inchaços ou nódulos).

Problemas hepáticos graves (muito raros, afetam menos de 1 em cada 10.000 pessoas).
Os sinais podem incluir:
- Coloração amarela da pele ou dos olhos, urina de cor escura ou perda de apetite.
Se isto lhe acontecer, contacte um médico imediatamente.

Podem ocorrer alterações de algumas células ou componentes do seu sangue. Podem também ocorrer alterações nos níveis de algumas substâncias (açúcar, potássio ou ácido úrico) no seu sangue. É possível que o seu médico peça ocasionalmente análises ao sangue, para verificar se Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma teve algum efeito no seu sangue. Os sinais podem incluir sensação de cansaço, pele pálida, dores de garganta, temperatura elevada (febre), adormecimento e formigueiro, sensação de sede, dores musculares e nas articulações, ou fraqueza, inchaço das articulações ou glândulas, ou sensibilidade à luz solar.

Outros efeitos indesejáveis possíveis:

Lisinopril

Efeitos indesejáveis frequentes (afetam menos de 1 em cada 10 pessoas)
- Dor de cabeça
- Sensação de tonturas ou sensação de cabeça vazia, especialmente quando se levanta depressa (hipotensão ortostática)
- Desmaio
- Diarreia
- Vómitos
- Tosse
- Problemas renais (detetado em análises ao sangue)

Efeitos indesejáveis pouco frequentes (afetam 1 em cada 100 pessoas)
- Alterações do humor
- Adormecimento ou formigueiro nos dedos das mãos ou dos pés
- Sensação de andar à roda (vertigens)
- Alterações do paladar
- Perturbações do sono
- Ver e/ou ouvir alucinações
- Ataque cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC)
- Taquicardia

- Batimento cardíaco acelerado (palpitações)
- Síndrome de Raynaud
- Irritação e corrimento nasal (rinite)
- Náuseas
- Dor abdominal
- Indigestão
- Elevação das enzimas hepáticas e bilirrubina
- Erupção na pele
- Comichão (prurido)
- Incapacidade de ter uma ereção (impotência)
- Fadiga
- Astenia
- Aumento da ureia no sangue
- Aumento da creatinina no sangue
- Excesso de potássio no sangue (hipercaliemia)
- Pode ocorrer uma descida excessiva da pressão arterial em pessoas com as seguintes situações: doença cardíaca coronária; estreitamento da aorta (uma artéria do coração), das válvulas cardíacas ou da artéria renal; um aumento do espessamento do músculo cardíaco. Se isto lhe acontecer, pode sentir tonturas ou sensação de cabeça vazia, especialmente quando se levanta depressa.

Efeitos indesejáveis raros (afetam menos de 1 em cada 1.000 pessoas)
- Alterações nos glóbulos vermelhos (detetado em análises ao sangue)
- Secreção inadequada da hormona antidiurética, síndrome de secreção inapropriada de hormona antidiurética (SIADH)
- Alterações na sensação de cheiro
- Confusão mental
- Boca seca
- Queda de cabelo
- Reação na pele com comichão (urticária)
- Psoríase
- Problemas renais
- Falência renal (uremia)
- Ginecomastia (aumento das mamas nos homens)
- Níveis baixos de sódio no sangue (os sintomas podem ser cansaço, dores de cabeça, náuseas ou vómitos)

Efeitos indesejáveis muito raros (afetam menos de 1 em cada 10.000 pessoas)
- Depressão da medula óssea, anemia, trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, agranulocitose, anemia hemolítica, linfodenopatia, doença autoimune.
- Inchaço da mucosa do intestino, o que pode causar súbita dor de estômago, diarreia ou vómitos
- Inflamação do pâncreas, o que causa dor de estômago moderada a grave
- Diminuição do nível de açúcar no sangue (hipoglicemia)
- Respiração sibilante (broncospasmo)
- Sensação de dor e congestão em torno das bochechas e olhos (sinusite)
- Inflamação dos pulmões (alveolite alérgica/pneumonia eosinofilica)
- Hepatite hepatocelular ou colestática, icterícia, insuficiência hepática
- Pênfigo (erupções na pele graves acompanhadas de descamação da pele e possível formação de bolhas), necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, pseudolinfoma cutâneo
- Transpiração excessiva

- Urinar menos que o normal ou incapacidade de urinar

Efeitos indesejáveis desconhecidos
- Sintomas depressivos
- Afrontamentos

Hidroclorotiazida

Efeitos indesejáveis de frequência muito rara:
- Insuficiência respiratória aguda (os sinais incluem falta de ar grave, febre, fraqueza e confusão).

Efeitos indesejáveis de frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):
- Inflamação das glândulas salivares (sialadenite)
- Diminuição do número de células no sangue (incluindo contagem baixa de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos)
- Baixa contagem de plaquetas (trombocitopenia)
- Anemia aplásica
- Anorexia
- Níveis altos de açúcar no sangue (hiperglicemia)
- Presença de glucose na urina (glicosúria)
- Níveis altos de ácido úrico na urina (hiperuricemia), desequilíbrio eletrolítico (incluindo hipocaliemia e hiponatremia - níveis baixo de sódio e potássio no sangue)
- Aumento dos níveis de colesterol e triglicéridos
- Gota (uma situação que causa inchaço e dor nas articulações)
- Irrequietude
- Depressão
- Perturbação do sono
- Perda de apetite
- Adormecimento ou formigueiro nos dedos das mãos ou dos pés
- Atordoamento
- Alterações de visão que fazem com que os objetos pareçam amarelos, perturbação da visão de forma transitória, dor ocular forte acompanhada de vermelhidão e visão enevoada. Em caso de vermelhidão e dor aguda nos olhos, deverá procurar tratamento médico de imediato para que essa situação não leve a perda total de visão
- Inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite)
- Problemas nos pulmões, incluindo pieira. Pode sentir falta de ar, se os seus pulmões ficarem inflamados ou com líquido
- Irritação gástrica, diarreia, obstipação, inflamação do fígado (pancreatite)
- Reações causadas pela sensibilidade à luz solar, reações tipo lúpus eritematoso cutâneo, reativação ou agravamento do lúpus eritematoso cutâneo, urticária, reações anafiláticas, necrólise epidérmica tóxica
- Espasmo muscular, fraqueza muscular
- Alteração da função renal
- Inflamação dos rins (nefrite intersticial)
- Sensação de cansaço ou sensação de fraqueza (perda de força)
- Temperatura elevada (febre)
- Sintomas depressivos
- Afrontamentos
- Cancro da pele e do lábio (cancro da pele não-melanoma)

- Diminuição da visão ou dor nos olhos devido a pressão elevada (possíveis sinais de acumulação de líquido na camada vascular do olho (efusão coroidal) ou glaucoma agudo de ângulo fechado)

Comunicação de efeitos indesejáveis
Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Lisinopril + Hidroclorotiazida Bluepharma

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
Não existem instruções especiais de conservação.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Lisinopril + Hicroclorotiazida Bluepharma 20 mg + 12,5 mg Comprimidos
- As substâncias ativas são lisinopril e hidroclorotiazida.
Cada comprimido contém 20 mg de lisinopril, e 12,5 mg de hidroclorotiazida.

- Os outros componentes são hidrogenofosfato de cálcio di-hidratado, croscarmelose sódica, manitol, amido de milho, estearato de magnésio e óxido de ferro vermelho (E 172).

Qual o aspeto de Lisinopril + Hicroclorotiazida Bluepharma 20 mg + 12,5 mg Comprimidos e conteúdo da embalagem

Lisinopril + Hicroclorotiazida Bluepharma 20 mg + 12,5 mg Comprimidos são cor-de-rosa, redondos, biconvexos, com ranhura numa das faces.
A ranhura do comprimido não se destina à sua divisão.
Encontra-se disponível em embalagens de 10, 20, 30 e 60 comprimidos.

APROVADO EM
15-07-2022
INFARMED

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular de Autorização de Introdução no Mercado
Bluepharma Genéricos – Comércio de Medicamentos, S.A.
S. Martinho do Bispo
3045-016 COIMBRA

Fabricante
Bluepharma – Indústria Farmacêutica S.A.
S. Martinho do Bispo
3045-016 COIMBRA

Este folheto foi revisto pela última vez em