APROVADO EM
24-05-2021
INFARMED

FOLHETO INFORMATIVO : INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Locoid Capilar 1 mg/ml solução cutânea

17 butirato de hidrocortisona

Leia atentamente este folheto antes de utilizar este medicamento.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:
1. O que é Locoid Capilar e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Locoid Capilar
3. Como utilizar Locoid Capilar
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Locoid Capilar
6. Outras informações

1. O QUE É LOCOID CAPILAR E PARA QUE É UTILIZADO

Cada mililitro de Locoid Capilar contém 1 mg de 17-butirato de hidrocortisona.

Eczemas e outras dermatites não infectadas sensíveis aos corticosteróides tópicos. Devido às características do seu veículo, o Locoid Capilar está particularmente indicado nas lesões do couro cabeludo e de áreas pilosas do corpo.

2. ANTES DE UTILIZAR LOCOID CAPILAR

Não utilize Locoid Capilar
- se tem lesões cutâneas causadas por infecções bacterianas, virais, fúngicas ou parasitárias.
- Se tem lesões ulceradas da pele (feridas), acne vulgar, acne rosácea e dermatite perioral.
- Se tem hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer outro componente de Locoid Capilar.

Tome especial cuidado com Locoid Capilar
- se aplicar na fronte para não escorrer para os olhos, devido à possibilidade de contaminação da conjuntiva, o que implica o risco de indução de glaucoma simplex ou catarata subcapsular.

APROVADO EM
24-05-2021
INFARMED

- Quando os corticosteróides são aplicados em grandes superfícies, particularmente sob oclusão (plástica) ou em pregas cutâneas, deve ter-se em atenção que se verifica um aumento considerável da absorção do fármaco, especialmente em crianças.
- Se for necessário proceder a um tratamento de longo prazo deve verificar-se regularmente, o peso e a altura da criança, bem como os níveis séricos de cortisol.

Ao utilizar Locoid Capilar com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
A administração durante a gravidez deve ser evitada.
No caso de crianças (consulte as precauções referidas neste folheto).

Condução de veículos e utilização de máquinas
Não foram estudados os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Locoid Capilar
O Locoid Capilar contém álcool isopropílico na sua constituição. Se durante a aplicação, a solução escorrer acidentalmente para os olhos ou para a região mucosa dos órgãos genitais este excipiente pode provocar ardor.

3. COMO UTILIZAR LOCOID CAPILAR

Utilizar Locoid Capilar sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Dependendo da situação clínica, a posologia diária poderá ir até 1-3 aplicações por dia.

Locoid Capilar deve ser aplicado em camada fina sobre as zonas afectadas, com ligeira massagem, de acordo com a indicação médica.

Para promover a penetração na pele, deve massajar-se suavemente a área de aplicação.

Nalguns casos, é aconselhável cobrir a lesão após a aplicação com um penso impermeável ou com vestuário oclusivo.

Após a melhoria da lesão, a aplicação pode ser reduzida a 1 vez ao dia ou a 2 a 3 vezes por semana.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Se utilizar mais Locoid Capilar do que deveria

APROVADO EM
24-05-2021
INFARMED

Não foram descritos casos de sobredosagem. No entanto, no caso de ocorrência de sintomas estranhos, consulte o seu médico.

Caso se tenha esquecido de utilizar Locoid Capilar
Se se esqueceu de aplicar a solução no momento estabelecido, aplique-a logo que se lembre e depois proceda como habitualmente. Não aplique uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de aplicar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS

Como todos os medicamentos, Locoid Capilar pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Efeitos adversos raros *(≥1/10.000, <1/1.000)*
Atrofia da pele, por vezes irreversível, com diminuição da espessura da pele; telangiectasia, púrpura, estrias na pele, acne pustular, dermatite perioral, efeito "rebound", despigmentação da pele, dermatite e eczema, incluindo dermatite de contacto.

Efeitos adversos muito raros *(<1/10.000)*
Supressão adrenal

Efeitos adversos desconhecidos *(não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis)*
Hipersensibilidade.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR LOCOID CAPILAR

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25ºC.

Não utilize Locoid Capilar após o prazo de validade impresso na embalagem, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

APROVADO EM
24-05-2021
INFARMED

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Locoid Capilar
- A substância activa é o 17 butirato de hidrocortisona.
- Os outros componentes são álcool isopropílico, glicerol 85%, povidona K90, citrato de sódio, ácido cítrico anidro e água purificada.

Qual o aspecto de Locoid Capilar e conteúdo da embalagem
Solução incolor, límpida.
O Locoid Capilar apresenta-se em frasco conta-gotas de polietileno de baixa densidade de 100 ml para administração tópica.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Germany

Fabricante

Astellas Pharma Europe B.V.
Hogemaat, 2
7942 JG Meppel
Holanda

Este folheto foi aprovado pela última vez em