APROVADO EM
27-09-2010
INFARMED

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Loratadina ratiopharm, 10 mg, comprimidos
Loratadina

Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:
1. O que é Loratadina ratiopharm e para que é utilizado
2. Antes de tomar Loratadina ratiopharm
3. Como tomar Loratadina ratiopharm
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Loratadina ratiopharm
6. Outras informações

1. O que é Loratadina ratiopharm e para que é utilizado

A loratadina é um anti-histamínico não sedativo para o tratamento de algumas doenças alérgicas. Este medicamento actua através do bloqueio do efeito da histamina, que se encontra envolvida no desenvolvimento da reacção alérgica.

Loratadina ratiopharm é utilizado para o tratamento dos sintomas das seguintes doenças alérgicas:

Adultos e crianças com idade superior a 2 anos:
Rinite alérgica não sazonal - por exemplo alergia aos ácaros domésticos ou a animais de estimação (espirrar, comichão, nariz com corrimento e entupido, inflamação alérgica dos olhos (olhos com comichão, vermelhos e lacrimosos) e urticária (inchaço, vermelhidão e comichão na pele).

2. Antes de tomar Loratadina ratiopharm

Não tome este medicamento e informe o seu médico:
se tem alergia (hipersensibilidade) à loratadina ou a qualquer outro componente dos comprimidos.

Tome especial cuidado com Loratadina ratiopharm e informe o seu médico
se sofre de problemas graves do fígado

APROVADO EM
27-09-2010
INFARMED

Crianças
Este medicamento não deve ser administrado a crianças com idade inferior a 2 anos ou que pesem menos de 30 kg.

Ao tomar Loratadina ratiopharm com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Se for realizar um teste cutâneo, deve parar de tomar os comprimidos pelo menos 48 horas antes desse exame cutâneo.

Ao tomar Loratadina ratiopharm com álcool
Não necessita de evitar bebidas alcoólicas enquanto estiver a tomar este medicamento.

Gravidez
Loratadina ratiopharm pode ser utilizado durante a gravidez.

Aleitamento
Não tome os comprimidos se estiver a amamentar o seu bebé.

Condução de veículos e utilização de máquinas
Loratadina ratiopharm pode provocar sonolência ou tonturas. Se for afectado não conduza nem utilize máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Loratadina ratiopharm
Este medicamento contém lactose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar Loratadina ratiopharm

Este medicamento não deve ser administrado a crianças que pesem menos de 30 kg ou que tenham idade inferior a 2 anos.

Tome o seu medicamento sempre de acordo com as indicações deste folheto. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A posologia habitual para adultos e adolescentes com idade superior a 12 anos:
1 comprimido (10 mg) por dia.

A posologia habitual para crianças dos 2 aos 12 anos e com mais de 30 kg:
1 comprimido (10 mg) por dia.

Se sofre de problemas graves do fígado, pode necessitar de tomar uma dose inferior pelo que deve falar com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

APROVADO EM
27-09-2010
INFARMED

Não exceda a dose indicada.

Se tomar mais Loratadina ratiopharm do que deveria
Se acidentalmente tomar mais do que a dose recomendada, dirija-se ao centro de urgências mais próximo ou informe imediatamente o seu médico ou farmacêutico. Pode sentir-se sonolento, apresentar um batimento cardíaco acelerado ou dores de cabeça.

Caso se tenha esquecido de tomar Loratadina ratiopharm
Caso se tenha esquecido de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar. Em seguida, proceda como anteriormente. Não tome duas doses ao mesmo tempo.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode, por vezes, causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Caso aconteça algum dos seguintes, pare imediatamente de tomar o medicamento e informe o seu médico ou dirija-se ao serviço de urgências do hospital mais próximo. Casos de reacções alérgicas tais como inchaço dos lábios, língua ou face (edema de Quincke) ou dificuldade em respirar e reacções alérgicas (marcas planas, com ardor e comichão na pele com inchaço. Estes efeitos secundários são muito graves se os apresentar; pode estar a fazer uma reacção alérgica grave. Pode necessitar de assistência médica urgente ou de internamento.

Frequentes > 1 % e < 10 % (menos de 1 em 10 mas mais de 1 em 100): dores de cabeça, nervosismo, cansaço, problemas de sono e aumento do apetite.

Muito raros até 0,01 % (menos de 1 em 1000): tonturas, batimento cardíaco irregular ou acelerado, sensação de enjoo, boca seca, inflamação do revestimento do estômago (gastrite, cujos sintomas incluem dores de estômago, náuseas, vómitos, diarreia), alterações das funções hepáticas, perda de cabelo e cansaço.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Loratadina ratiopharm

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blister. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

APROVADO EM
27-09-2010
INFARMED

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. Outras informações

Qual a composição de Loratadina ratiopharm
A substância activa é a loratadina. Um comprimido contém 10 mg.

Os comprimidos também contêm os seguintes componentes inactivos:
lactose mono-hidratada, celulose microcristalina, amido de milho e estearato de magnésio.

Qual o aspecto de Loratadina ratiopharm e conteúdo da embalagem
Os comprimidos são redondos, biconvexos, brancos, com uma ranhura curva numa das faces. Os comprimidos podem ser divididos em metades iguais.

O seu medicamento está disponível em embalagens «blister» contendo 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28, 30, 50, 100 ou 100x1 comprimidos. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro
EDIFÍCIO TEJO, 6º piso
2790-143 Carnaxide

Fabricante:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle Strasse, 3
D-89143 Blaubeuren
Alemanha

Este folheto foi aprovado pela última vez em