

Folheto informativo: Informação para o doente

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 50 mg + 12,5 mg comprimidos revestidos por película

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 12,5 mg comprimidos revestidos por película

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 25 mg comprimidos revestidos por película

Losartan de potássio e hidroclorotiazida

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen
3. Como tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen e para que é utilizado

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen é uma associação de um antagonista dos recetores da angiotensina II (losartan) e de um diurético (hidroclorotiazida). A angiotensina II é uma substância produzida no organismo que se liga aos recetores dos vasos sanguíneos provocando o seu estreitamento. Desta ação resulta um aumento da pressão arterial. O losartan evita a ligação da angiotensina II a esses recetores, causando o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que resulta na diminuição da pressão arterial. A hidroclorotiazida atua obrigando os rins a eliminar mais água e sal. Esta ação ajuda a reduzir a pressão arterial.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen é indicado no tratamento da hipertensão essencial (pressão arterial elevada).

2. O que precisa de saber antes de tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen

Não tome Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen

- se tem alergia ao losartan, à hidroclorotiazida ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6),
- se tem alergia a outras substâncias derivadas das sulfonamidas (ex. outras tiazidas, alguns fármacos antibacterianos (como o cotrimoxazol, pergunte ao seu médico no caso de ter dúvidas),
- se tem compromisso grave da função hepática,
- se tem níveis baixos de potássio, de sódio ou níveis elevados de cálcio que não podem ser corrigidos com tratamento,
- se sofre de gota,
- se tiver mais do que três meses de gravidez. (Também é preferível não tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen no início da gravidez – Ver secção Gravidez),
- se tem compromisso grave da função renal ou se os seus rins não estão a produzir urina,
- se tem diabetes ou função renal diminuída e está a ser tratado com um medicamento que contém aliscireno para diminuir a pressão arterial.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen:

Deve informar o seu médico se pensa que está (ou pode vir a estar) grávida. Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen não está recomendado no início da gravidez e não pode ser tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura (ver secção Gravidez).

É importante que diga ao seu médico antes de tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen:

- Se já sofreu de inchaço na face, lábios, garganta ou língua
- Se toma diuréticos (comprimidos para urinar)
- Se está a fazer dieta de restrição de sal
- Se tem ou teve vômitos e/ou diarreia graves
- Se tem insuficiência cardíaca
- Se a sua função do fígado está comprometida (ver secções 2 "Não tome Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen")
- Se tem estreitamento das artérias que chegam aos rins (estenose arterial renal) ou tem apenas um rim em funcionamento, ou se foi recentemente submetido a transplante renal
- Se tem estreitamento das artérias (aterosclorose), angina de peito (dor no peito devido a mau funcionamento do coração)
- Se tem "estenose das válvulas aórtica e mitral" (estreitamento das válvulas do coração) ou "cardiomiopatia hipertrófica" (uma doença que causa espessamento do músculo cardíaco)
- Se é diabético(a)
- Se teve gota
- Se tem ou teve um problema alérgico, asma ou uma doença que causa dor nas articulações, erupções na pele e febre (lúpus eritematoso sistémico)
- Se tem níveis elevados de cálcio ou níveis baixos de potássio ou se está a fazer dieta pobre em potássio

- Se precisa de uma anestesia (mesmo no dentista) ou antes de uma cirurgia, ou se vai fazer análises para avaliação da função da paratiroide, tem de informar o seu médico ou os profissionais de saúde envolvidos que está a tomar comprimidos de Losartan de potássio e Hidroclorotiazida
- Se sofre de hiperaldosteronismo primário (uma síndrome associada ao aumento da secreção da hormona aldosterona pela glândula suprarrenal, causada por uma anomalia da glândula).
- Se está a tomar algum dos seguintes medicamentos para tratar a pressão arterial elevada:
 - um inibidor da ECA (por exemplo enalapril, lisinopril, ramipril), em particular se tiver problemas nos rins relacionados com diabetes.
 - aliscireno
- Se sentir uma diminuição na visão ou dor ocular. Estes podem ser sintomas de acumulação de líquido na camada vascular do olho (efusão coroidal) ou um aumento da pressão no olho e podem ocorrer dentro de horas até uma semana depois de tomar Losartan+Hidroclorotiazida Tecnigen. Se não for tratada pode levar à perda permanente da visão. Se já teve alergia à penicilina ou sulfonamidas pode ter maior risco de desenvolver estes sintomas.
- Se já teve problemas respiratórios ou pulmonares (incluindo inflamação ou líquido nos pulmões) após a toma de hidroclorotiazida. Se desenvolver qualquer falta de ar grave ou dificuldade em respirar após tomar Losartan+Hidroclorotiazida Tecnigen, procure assistência médica imediatamente.

O seu médico pode verificar a sua função renal, pressão arterial e a quantidade de eletrólitos (por exemplo, o potássio) no seu sangue em intervalos regulares.

Ver também a informação sob o título “Não tome Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen”.

Crianças e adolescentes

Não existe experiência da utilização do losartan + hidroclorotiazida em crianças. Por isso, Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen não deve ser dado a crianças.

Hidroclorotiazida

- caso tenha tido cancro da pele ou se desenvolver uma lesão cutânea inesperada durante o tratamento. O tratamento com hidroclorotiazida, no caso particular da utilização de doses elevadas a longo prazo, pode aumentar o risco de alguns tipos de cancro da pele e do lábio (cancro da pele não-melanoma). Proteja a sua pele contra a exposição solar e a radiação ultravioleta, enquanto estiver a tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen.

Outros medicamentos e Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Os medicamentos diuréticos como a hidroclorotiazida existente no Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen podem interagir com outros medicamentos.

As preparações que contêm lítio não devem ser tomadas com Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen sem uma cuidadosa supervisão do seu médico.

Podem ser necessárias medidas de precaução especiais (ex. análises ao sangue) se tomar suplementos de potássio, substitutos do sal contendo potássio ou medicamentos poupadores de potássio, outros diuréticos (comprimidos para urinar), alguns laxantes, medicamentos para o tratamento da gota, medicamentos para controlar o batimento cardíaco ou para a diabetes (medicamentos orais ou insulinas).

Também é importante que o seu médico saiba se está a tomar:

- Outros medicamentos para reduzir a sua pressão arterial
- Esteroides
- Medicamentos para tratar o cancro
- Analgésicos
- Medicamentos para o tratamento de infeções fúngicas
- Medicamentos para a artrite
- Resinas usadas para o colesterol elevado como a colestiramina
- Medicamentos relaxantes musculares
- Comprimidos para dormir
- Medicamentos opioides como a morfina
- "Aminas vasopressoras" como a adrenalina ou outros medicamentos do mesmo grupo
- Medicamentos orais para a diabetes ou insulinas

O seu médico pode necessitar de alterar a sua dose e/ou tomar outras precauções: Se está a tomar um inibidor da ECA ou aliscireno (ver também informações sob os títulos “Não tome Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen” e “Advertências e precauções”).

Se estiver planeada a aplicação de um meio de contraste com iodo num procedimento radiográfico, informe também o seu médico que toma Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen com alimentos e bebidas
Não deve beber álcool enquanto toma este medicamento: o álcool e o Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen podem aumentar o efeito um do outro.

O sal da dieta em quantidades excessivas pode contrariar o efeito dos comprimidos de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen.

Os comprimidos de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen podem ser tomados com ou sem alimentos.

Gravidez e amamentação

Gravidez

Deve informar o seu médico se pensa que está (ou pode vir a estar) grávida. O seu médico normalmente aconselha-la-á a interromper Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen, antes de engravidar ou assim que souber que está grávida, e a tomar outro medicamento em vez de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen. Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen não está recomendado durante a gravidez e não pode ser

tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura.

Amamentação

Informe o seu médico de que se encontra a amamentar ou que está prestes a iniciar o aleitamento. Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen não está recomendado em mães a amamentar e o seu médico poderá indicar-lhe outro tratamento mais indicado.

Utilização em idosos

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen atua igualmente bem e é igualmente bem tolerado pela maioria dos doentes adultos idosos e mais jovens. A maioria dos doentes com mais idade necessita da mesma dose que os doentes mais novos.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Ao começar o tratamento com este medicamento, não deve realizar tarefas que possam requerer especial atenção (por exemplo, conduzir um automóvel ou operar máquinas perigosas) até que perceba como tolera este medicamento.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen contém lactose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. O seu médico decidirá qual a dose adequada de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen dependendo do seu problema e de outros medicamentos que estiver a tomar. É importante que continue a tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen durante o tempo que o seu médico considerar necessário, a fim de manter o controlo da sua pressão arterial.

Pressão Arterial Elevada

A dose habitual de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen para a maioria dos doentes com pressão arterial elevada é de 1 comprimido de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 50 mg/12,5 mg por dia para controlar a pressão arterial durante um período 24 horas.

Esta dose pode ser aumentada para 2 comprimidos, uma vez por dia, de Losartan + Hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg comprimidos revestidos por película, ou alterada para 1 comprimido, uma vez por dia de Losartan + Hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg comprimidos revestidos por película (uma dose mais forte). A dose diária máxima é de 2 comprimidos por dia de Losartan + Hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg comprimidos revestidos por película ou de 1 comprimido por dia de Losartan + Hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg comprimidos revestidos por película.

Se tomar mais Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen do que deveria

No caso de uma dose excessiva deve contactar o seu médico imediatamente para que lhe seja prestada assistência médica imediata. A dose excessiva pode causar uma

diminuição da pressão arterial, palpitações, pulso fraco, alterações na composição do sangue e desidratação.

Caso se tenha esquecido de tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen
Tente tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen como receitado pelo seu médico.
No entanto, se se esquecer de uma dose, não tome uma dose adicional. Retome o esquema habitual.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Se sentir algum dos seguintes efeitos, pare de tomar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen comprimidos e informe imediatamente o seu médico ou dirija-se às urgências do hospital mais próximo:

Uma reação alérgica grave (erupção na pele, comichão, inchaço da face, lábios, boca ou garganta, que pode causar dificuldade a engolir ou a respirar).

Este é um efeito secundário grave mas raro, que afeta mais de 1 em 10.000 doentes, mas menos de 1 em 1.000 doentes. Pode necessitar de assistência médica urgente ou hospitalização.

Foram comunicados os seguintes efeitos indesejáveis:

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas):

- Tosse, infeção das vias respiratórias superiores, congestão nasal, sinusite, perturbações dos seios nasais
- Diarreia, dor abdominal, náuseas, indigestão
- Dores ou câibras musculares, dores nas pernas, dores nas costas
- Insónia, dor de cabeça, tonturas
- Fraqueza, cansaço, dor no peito
- Aumento dos níveis de potássio (que pode causar anomalia do ritmo cardíaco), diminuição dos níveis de hemoglobina
- Alterações na função do rim incluindo insuficiência renal
- Açúcar muito baixo no sangue (hipoglicemia)

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas):

- Anemia, pontos vermelhos ou acastanhados na pele (por vezes especialmente nos pés, pernas, braços e nádegas, com dor nas articulações, inchaço das mãos e pés e dor de estômago), nódoas negras, diminuição dos glóbulos brancos, problemas de coagulação, número de plaquetas reduzido
- Perda de apetite, aumento dos níveis de ácido úrico ou manifestação de gota, aumento dos níveis de açúcar no sangue, níveis anómalos de eletrólitos no sangue
- Ansiedade, nervosismo, síndrome do pânico (ataques de pânico recorrentes), confusão, depressão, sonhos anormais, alterações do sono, sonolência, perda de memória

- Formigueliro ou sensaço semelhante, dor nas extremidades, tremores, enxaqueca, desmaio
- Viso desfocada, ardor ou picadas nos olhos, conjuntivite, perda de viso, ver as coisas em tom amarelado
- Apitos, zumbidos, rudos ou estalos nos ouvidos, vertigens
- Presso arterial baixa, que pode estar associada a mudanas de posio (sentir-se tonto(a) ou fraco(a) quando est de p), angina (dor no peito), pulsao anmala, AVC (acidente vascular cerebral), ataque cardaco, palpitaes
- Inflamao dos vasos sanguneos, que  frequentemente associada a erupo na pele ou ndoas negras
- Garganta irritada, falta de ar, bronquite, pneumonia, gua nos pulmes (que causa dificuldade em respirar), hemorragia nasal, corrimento nasal, congesto
- Priso de ventre, gases, mal-estar no estmago, espasmos no estmago, vmitos, boca seca, inflamao da glndula salivar, dor de dentes
- ictercia (amarelecimento dos olhos e da pele), inflamao do pncreas
- Erupo na pele com comicho (urticria), comicho, inflamao da pele, erupo na pele, vermelhido da pele, sensibilidade  luz, pele seca, rubor, transpirao, perda de cabelo
- Dores nos braos, ombros, ancas, joelhos ou outras articulaes, inchao nas articulaes, rigidez, fraqueza muscular
- Urinar frequentemente, mesmo de noite, funo renal anmala incluindo inflamao dos rins, infeo no aparelho urinrio, acar na urina
- Diminuio do apetite sexual, impotncia
- Inchao da face, inchao localizado (edema), febre.

Raros (podem afetar at 1 em 1.000 pessoas)

- Hepatite (inflamao do fgado), anomalia nas anlises ao fgado

Desconhecido (a frequncia no pode ser calculada a partir dos dados disponveis)

- Sintomas gripais
- Dor muscular inexplicvel com urina escura (cor de ch) (rabdomilise)
- Nveis baixos de sdio no sangue (hiponatremia)
- Sensao geral de mal-estar
- Alterao do paladar (disgeusia)

Hidroclorotiazida:

Muito raros:

- Insuficincia respiratria aguda (os sinais incluem falta de ar grave, febre, fraqueza e confuso).

Desconhecido:

- Cancro da pele e do lbio (cancro da pele no-melanoma).
- Diminuio da viso ou dor nos olhos devido a presso elevada (possveis sinais de acumulao de lquido na camada vascular do olho (efuso coroidal) ou glaucoma agudo de ngulo fechado).

Comunicao de efeitos indesejveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejveis, incluindo possveis efeitos indesejveis no indicados neste folheto, fale com o seu mdico, farmacutico ou enfermeiro. Tambm poder comunicar efeitos indesejveis diretamente ao INFARMED, I.P. atravs dos

contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 50 mg + 12,5 mg comprimidos revestidos por película

Não conservar acima de 30°C.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 12,5 mg comprimidos revestidos por película

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Conservar Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen na embalagem de origem. Manter o blister na embalagem exterior. Não abra o blister antes da altura de tomar o medicamento.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 25 mg comprimidos revestidos por película

Não conservar acima de 30°C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após "Val". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen

As substâncias ativas são o losartan de potássio e a hidroclorotiazida.

Cada comprimido contém 50 mg de losartan de potássio e 12,5 mg de hidroclorotiazida (HCTZ).

Cada comprimido contém 100 mg de losartan de potássio e 12,5 mg de hidroclorotiazida (HCTZ).

Cada comprimido contém 100 mg de losartan de potássio e 25 mg de hidroclorotiazida (HCTZ).

- Os outros componentes são:
50 mg + 12,5 mg e 100 mg + 25 mg:

Núcleo:
Lactose mono-hidratada
Celulose microcristalina
Hidroxipropilcelulose
Amido de milho pré-gelificado
Estearato de magnésio

Revestimento:
Hipromelose
Macrogol 400
Dióxido de titânio (E171)

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 50 mg/12,5 mg contém 4,24 mg (0,108 mEq) de potássio.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg/25 mg contém 8,48 mg (0,216 mEq) de potássio.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 12,5 mg:
Celulose microcristalina (E460), lactose mono-hidratada, amido de milho pré-gelificado, estearato de magnésio (E572), hidroxipropilcelulose (E463), Opadry Y-1-1700 branco (hidroxipropilmetilcelulose, dióxido de titânio (E171) e polietilenoglicol 400).

Qual o aspeto de Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen e conteúdo da embalagem

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 50 mg/12,5 mg está disponível sob a forma de comprimidos revestidos por película, brancos, oblongos com ranhura numa das faces, acondicionados em blisters de PVC /Alumínio. Cada embalagem contém 10, 14, 28, 56 ou 60 comprimidos.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 12,5 mg está disponível sob a forma de comprimidos revestidos por película, brancos e oblongos acondicionados em blisters brancos e opacos de PVC/Alumínio selados com folha de alumínio, nas seguintes apresentações: embalagens de 10, 14, 28 e 60 comprimidos.

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg/25 mg está disponível sob a forma de comprimidos revestidos por película, brancos, oblongos biconvexos com ranhura numa das faces, em embalagens de 10, 28 e 60 comprimidos.

A ranhura do comprimido destina-se unicamente a facilitar a sua divisão, de modo a ajudar a deglutição, e não a divisão em doses iguais.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal S.A.
Rua da Tapada Grande, nº2, Abrunheira
2710-089 Sintra

Fabricante:

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 50 mg + 12,5 mg
Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 25 mg

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A.
Rua da Tapada Grande, nº. 2 - Abrunheira
2710-089 Sintra
Portugal

Losartan + Hidroclorotiazida Tecnigen 100 mg + 12,5 mg

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A.
Rua da Tapada Grande, nº. 2 - Abrunheira
2710-089 Sintra
Portugal

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B, Queluz de Baixo,
2730-055 Barcarena
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em.