

Folheto Informativo: Informação para o utilizador

Nimesulida Jabasulide 100 mg Comprimidos

Nimesulida Jabasulide 100 mg Granulado para solução oral

Nimesulida

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

- 1- O que é Nimesulida Jabasulide e para que é utilizado
- 2- O que precisa de saber antes de tomar Nimesulida Jabasulide
- 3- Como tomar Nimesulida Jabasulide
- 4- Efeitos secundários possíveis
- 5- Como conservar Nimesulida Jabasulide
- 6- Conteúdo da embalagem e outras informações

1- O que é Nimesulida Jabasulide e para que é utilizado

Nimesulida Jabasulide é um anti-inflamatório não esteroide (AINEs), com propriedades analgésicas.

Nimesulida Jabasulide é usado para tratamento da dor aguda e para tratamento das dores menstruais.

Antes de prescrever Nimesulida Jabasulide, o seu médico irá avaliar os benefícios que o medicamento lhe pode trazer em comparação com os riscos que corre de desenvolver efeitos secundários.

2- O que precisa de saber antes de tomar Nimesulida Jabasulide

Não tome Nimesulida Jabasulide se:

- tem alergia à nimesulida ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- já teve algum dos seguintes sintomas após tomar aspirina ou outros AINEs:
  - respiração ofegante, aperto no peito, falta de ar (asma)
  - bloqueio nasal devido a inchaços no revestimento do nariz (pólipos nasais)
  - erupção na pele / erupção da pele com comichão (urticária)
  - inchaço súbito da pele ou mucosa, tal como inchaço em redor dos olhos, rosto, lábios, boca ou garganta, possivelmente com dificuldade em respirar (edema angioneurótico);
- após terapêutica anterior com AINEs e história de:

- hemorragia estomacal ou intestinal,
- orifícios (perfurações) no estômago ou intestinos;
- história atual ou recente de úlcera ou hemorragia estomacal ou intestinal (ulceração ou hemorragia que tenha ocorrido pelo menos duas vezes);
- hemorragia cerebral (AVC);
- qualquer outro problema hemorrágico ou devido ao seu sangue não coagular;
- função hepática comprometida;
- está a tomar outros medicamentos conhecidos por afetarem o fígado, por ex., paracetamol ou outros analgésicos ou AINEs,
- é tocodependente, ou desenvolveu hábitos que o tornam dependente de medicamentos ou outras substâncias;
- consome regularmente bastante álcool;
- teve no passado uma reação hepática à nimesulida;
- insuficiência renal grave, sem diálise;
- insuficiência cardíaca grave;
- tem febre ou gripe (sente-se dorido, indisposto, com arrepios ou tremores ou tem febre);
- está no terceiro trimestre da gravidez;
- está a amamentar.

Nimesulida Jabasulide não deve ser administrado a crianças com idade inferior a 12 anos.

#### Advertências e precauções

Os medicamentos, como o Nimesulida Jabasulide podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC). O risco é mais provável com doses elevadas e tratamento prolongado. Não deve ser excedida a dose recomendada nem o tempo de duração do tratamento. Se tem problemas cardíacos, sofreu um AVC ou pensa que pode estar em risco de vir a sofrer destas situações (por exemplo, se tem pressão sanguínea elevada, diabetes, elevados níveis de colesterol ou se é fumador) deverá aconselhar-se sobre o tratamento com o seu médico ou farmacêutico.

Se desenvolver reações alérgicas graves, deve interromper o tratamento com Nimesulida Jabasulide na primeira ocorrência de erupção cutânea, lesões dos tecidos moles (lesões da mucosa), ou qualquer outro sintoma de alergia, e contactar o seu médico.

Interrompa imediatamente o tratamento com Nimesulida Jabasulide logo que se aperceba de sinais de hemorragia (que causa fezes escuras) ou ulceração do trato digestivo (que causa dor abdominal).

Tome especial cuidado com Nimesulida Jabasulide:

Se durante o tratamento com nimesulida desenvolver sintomas que sugiram problemas hepáticos, deve interromper a toma de nimesulida e informar imediatamente o seu médico. Os sintomas que sugerem problemas hepáticos incluem perda de apetite, náusea, vômitos, dor abdominal, cansaço persistente ou urina escura.

Se já sofreu de úlcera péptica, hemorragia estomacal ou intestinal, ou de condições inflamatórias dos intestinos como colite ulcerosa ou doença de Crohn, deve informar o seu médico antes de tomar Nimesulida Jabasulide.

Se durante o tratamento com Nimesulida Jabasulide, desenvolver febre e/ou sintomas tipo gripe (dores no corpo inteiro, indisposição e arrepios ou tremores), deve interromper o tratamento e informar o seu médico.

Se sofre de doença cardíaca ligeira, pressão sanguínea elevada, problemas circulatórios ou renais, informe o seu médico antes de tomar Nimesulida Jabasulide.

No caso de doentes idosos, o médico poderá querer consultá-los a intervalos regulares para garantir que Nimesulida Jabasulide não está a causar problemas estomacais, renais, cardíacos ou hepáticos.

Se está a planear uma gravidez, deve informar o seu médico, porque Nimesulida Jabasulide pode diminuir a fertilidade.

Se tem intolerância a alguns açúcares, deve informar o seu médico antes de tomar este medicamento.

#### Outros medicamentos e Nimesulida Jabasulide

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

- corticosteroides (medicamentos usados no tratamento de condições inflamatórias),
  - medicamentos para fluidificar o sangue (anticoagulantes como varfarina, agentes antiplaquetários, ácido salicílico ou outros salicilatos),
  - antihipertensores ou diuréticos (medicamentos para controlar a pressão sanguínea ou problemas cardíacos),
  - lítio, usado para tratar depressões e condições similares,
  - inibidores seletivos da recaptção da serotonina (medicamentos para tratar a depressão).
  - metotrexato (medicamento usado para o tratamento da artrite reumatoide e cancro),
  - ciclosporina (medicamento usado após transplantes ou para o tratamento de distúrbios do sistema imunitário),
- certifique-se de que o seu médico ou farmacêutico sabe que está a tomar estes medicamentos antes de começar a tomar Nimesulida Jabasulide.

#### Gravidez, amamentação e fertilidade

Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico antes de iniciar o tratamento com Nimesulida Jabasulide ou com qualquer outro medicamento.

- Nimesulida Jabasulide não deve ser utilizado durante os últimos 3 meses de gravidez. pode causar problemas ao bebé e ao desenvolvimento do trabalho de parto.
- Se está a planear engravidar deve informar o seu médico porque Nimesulida Jabasulide pode diminuir a fertilidade.
- Se se encontra no primeiro ou segundo trimestres de gestação, não exceda a dose nem a duração do tratamento que lhe foram prescritos pelo seu médico.

Nimesulida Jabasulide não deve ser utilizado durante o período de amamentação.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

Doentes que tenham tonturas ou sonolência, após tomarem Nimesulida Jabasulide, não devem conduzir ou utilizar máquinas.

#### Informações importantes sobre os excipientes de Nimesulida Jabasulide

As formulações de Nimesulida Jabasulide, comprimidos e granulado contêm açúcares. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

### 3. Como tomar Nimesulida Jabasulide

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Os efeitos secundários podem ser reduzidos se usar a dose mínima eficaz durante o menor período de tempo possível para controlar os sintomas.

A posologia recomendada é de 1 comprimido ou 1 saqueta de Nimesulida Jabasulide (100mg), duas vezes por dia, após as refeições.

Tome Nimesulida Jabasulide durante o menor período de tempo possível e durante não mais de 15 dias em qualquer regime de tratamento individual.

Os comprimidos deverão ser tomados inteiros com água.

O granulado deverá ser dissolvido em meio copo de água e ingerido logo após a dissolução.

Se tomar mais Nimesulida Jabasulide do que deveria

Se tomar, ou pensar que pode ter tomado mais Nimesulida Jabasulide do que deveria (sobredosagem) contacte o seu médico ou dirija-se ao Serviço de Urgência mais próximo. Leve a restante medicação consigo. Em caso de sobredosagem provavelmente desenvolverá um dos seguintes sintomas: sonolência, náuseas, dor no estômago, hemorragia gástrica ou dificuldades respiratórias.

Caso se tenha esquecido de tomar Nimesulida Jabasulide

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

### 4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Se ocorrer algum dos sintomas mencionados a seguir, interrompa a toma do medicamento e informe imediatamente o seu médico, pois estes podem indicar efeitos secundários graves raros que requerem tratamento médico urgente:

- desconforto gástrico ou dor, perda de apetite, náuseas (indisposição), vômitos ou hemorragia gástrica ou abdominal ou fezes escuras
- problemas na pele como erupção cutânea ou vermelhidão

- respiração ofegante ou falta de ar
- amarelecimento da pele ou do branco do olho (icterícia)
- alteração imprevista da quantidade ou cor da urina
- inchaço do rosto, pés ou pernas
- cansaço persistente

Efeitos secundários de caráter geral causados por medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs):

O uso de alguns medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) pode estar associado a um pequeno aumento do risco de oclusão dos vasos arteriais (eventos trombóticos arteriais), por ex., ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) ou AVC (apoplexia), particularmente com doses elevadas e durante tratamentos prolongados.

A retenção de líquidos (edema), pressão sanguínea elevada (hipertensão) e insuficiência cardíaca foram notificadas em associação com o tratamento com AINEs.

Os efeitos secundários observados com mais frequência afetam o trato digestivo (eventos gastrointestinais):

- úlceras do estômago e secção superior do intestino delgado (úlceras pépticas/gastroduodenais)
- orifício na parede dos intestinos (perfuração) ou hemorragia do trato digestivo (por vezes fatal, particularmente nos idosos).

Os efeitos secundários que podem ocorrer com Nimesulida Jabasulide, são:

- Frequentes (podem afetar mais de 1 em 100 pessoas): diarreia, mal-estar, vômitos, alterações menores nas análises laboratoriais da função hepática.
- Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas): falta de ar, tonturas, aumento da pressão arterial, prisão de ventre (obstipação), gases, inflamação do estômago (gastrite), comichão, erupção cutânea, suores, inchaço (edema), hemorragia gástrica ou intestinal, úlceras duodenais ou gástricas e úlceras perfuradas.
- Raros (podem afetar até 1 em 1.000 pessoas): anemia, diminuição de glóbulos brancos no sangue, aumento de um tipo de glóbulos vermelhos (eosinofilia) no sangue, alterações da pressão arterial, hemorragia, dificuldade ou dor ao urinar ou retenção urinária, sangue na urina, aumento de potássio no sangue, ansiedade ou nervosismo, pesadelos, visão turva, aumento da pulsação, vermelhidão da pele, eritema, dermatite, mal-estar e fraqueza.
- Muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas): reações graves da pele (conhecidas como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica) que podem causar bolhas e grande desconforto; insuficiência renal ou inflamação do rim (nefrite), perturbação das funções cerebrais (encefalopatia), diminuição do número de plaquetas no sangue provocando hemorragias subcutâneas ou em outros locais do corpo; fezes escuras devido a hemorragia, inflamação do fígado (hepatite) por vezes muito grave provocando icterícia e retenção biliar; alergias incluindo reações alérgicas graves com colapso e falta de ar, asma, diminuição da temperatura corporal, vertigens, dores de cabeça, sonolência; dores de estômago, indigestão; inflamação da boca;

erupção da pele com comichão (urticária); inchaço da face e regiões circundantes; perturbações da visão.

Os medicamentos tais como Nimesulida Jabasulide podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco (enfarte do miocárdio) ou AVC.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 7373

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: +351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

#### 5. Como conservar Nimesulida Jabasulide

Conservar a temperatura inferior a 25°C. Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

#### 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Nimesulida Jabasulide

- A substância ativa é nimesulida. Cada comprimido ou saqueta com granulado para solução oral contém 100 mg de nimesulida.

Os outros componentes dos comprimidos são: celulose microcristalina, lactose, carboximetilamido sódico, estearato de magnésio, docusato sódico.

Os outros componentes do granulado para solução oral são: ceteth-20, maltodextrina, sacarose, aroma de laranja, ácido cítrico anidro.

Qual o aspeto de Nimesulida Jabasulide e conteúdo da embalagem

Nimesulida Jabasulide 100 mg comprimidos apresenta-se sob a forma de comprimidos amarelos, circulares, biconvexos, insípidos e inodoros, em embalagens contendo 10, 20 ou 30 comprimidos.

Nimesulida Jabasulide 100 mg Granulado para solução oral apresenta-se sob a forma de granulado para solução oral, amarelado, com aroma e odor a laranja, em embalagens contendo 10, 20 e 30 saquetas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Jaba Recordati, S.A.  
Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3  
2740-245 Porto Salvo  
Portugal  
Tel: +351 214 329 500  
Fax: +351 219 151 930  
E-mail: geral@jaba-recordati.pt

Fabricantes

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A.  
Rua da Tapada Grande, 2  
2710-089 Sintra  
Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.  
Rua Comandante Carvalho Araújo, EN 374  
Sete Casas  
2670-540 Loures  
Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.  
Rua João de Deus, nº 19, Venda Nova  
2700-487 Amadora  
Portugal

APROVADO EM  
11-08-2017  
INFARMED

Este folheto foi revisto pela última vez em: