

## Folheto informativo: Informação para o utilizador

### Ogluo 0,5 mg solução injetável em seringa pré-cheia Ogluo 1 mg solução injetável em seringa pré-cheia glucagom

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.**

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico. Ver secção 4.

#### **O que contém este folheto:**

1. O que é Ogluo e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Ogluo
3. Como utilizar Ogluo
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Ogluo
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

#### **1. O que é Ogluo e para que é utilizado**

Ogluo contém a substância ativa glucagom, que pertence a um grupo de medicamentos denominados hormonas glicogenolíticas.

É utilizado no tratamento da hipoglicemia grave (níveis muito baixos de açúcar no sangue) em pessoas com diabetes. Destina-se a ser utilizado em adultos, adolescentes e crianças com idade igual ou superior a 2 anos.

Ogluo é uma seringa pré-cheia pronta a utilizar que contém uma dose única da substância ativa glucagom. Trata-se de uma injeção subcutânea, ou seja, o medicamento é administrado sob a pele com uma agulha.

O glucagom é uma hormona natural produzida pelo pâncreas, com o efeito contrário ao da insulina no corpo humano. Ajuda o fígado a converter o açúcar armazenado no fígado (chamado «glicogénio») em glicose (açúcar). A glicose é então libertada na corrente sanguínea, o que faz com que o nível de glicemia no sangue aumente, reduzindo os efeitos da hipoglicemia.

#### **Informações sobre a hipoglicemia**

Os primeiros sintomas de hipoglicemia (níveis baixos de açúcar no sangue) incluem:

- transpiração
- sonolência
- tonturas
- distúrbios do sono
- palpitações
- ansiedade
- tremores
- visão turva
- fome
- fala arrastada
- humor depressivo
- sensação de formigueiro nas mãos, nos pés, nos lábios ou na língua

- irritabilidade
- vertigens
- comportamento anormal
- dificuldade de concentração
- oscilações no movimento
- dor de cabeça
- alterações de personalidade

**Se não for tratado, o doente pode progredir para hipoglicemia grave, que pode incluir:**

- confusão
- convulsões
- perda de consciência
- morte

## **2. O que precisa de saber antes de utilizar Ogluo**

### **Informações importantes**

- Certifique-se de que tem informações sobre Ogluo e de que os seus familiares, as pessoas com quem trabalha e os amigos próximos também estão informados. Informe-os de que, se apresentar sinais de hipoglicemia grave, incluindo confusão, convulsões ou perda de consciência (desmaio), devem utilizar imediatamente Ogluo. Deve sempre transportar Ogluo consigo.
- É importante que tanto o doente como as pessoas próximas saibam como utilizar Ogluo antes de ser necessário. Mostre aos seus familiares e a outras pessoas o local onde guarda Ogluo e como utilizá-lo. Caso perca a consciência, essas pessoas devem atuar rapidamente, pois um longo período nesse estado pode ser prejudicial. O doente, ou a pessoa que administra Ogluo ao doente, deve seguir as instruções constantes da secção 3 deste folheto: «Como utilizar Ogluo».
- É importante que armazene Ogluo corretamente para garantir que pode ser utilizado de imediato, caso seja necessário. Consulte a secção 5 para obter mais informações sobre a conservação adequada deste medicamento.

### **Não utilize Ogluo se:**

- Tem alergia ao glucagom ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Tem um tumor na glândula suprarrenal (feocromocitoma).

### **Advertências e precauções**

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Ogluo.

Ogluo pode não funcionar adequadamente se:

- Tiver estado em jejum ou se os seus níveis de glicemia estiverem baixos durante muito tempo
- Tiver níveis baixos de adrenalina
- Tiver um nível de glicemia baixo causado pelo consumo excessivo de álcool
- Tiver um tumor que liberta glucagom ou insulina

Se alguma destas situações se aplicar a si, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Tenha em consideração que, no ensaio principal, aproximadamente 15 % dos doentes alcançaram uma recuperação dos níveis de glicose após 20 minutos ou mais.

Após a utilização de Ogluo, coma o mais rapidamente possível para prevenir a recorrência de níveis baixos de açúcar no sangue. Tome açúcar de uma fonte de ação rápida, como um sumo de fruta ou um refrigerante que contenha açúcar.

### **Crianças**

Ogluo não é recomendado para crianças com menos de 2 anos de idade, já que o medicamento não foi estudado neste grupo etário.

### **Outros medicamentos e Ogluo**

Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Os seguintes medicamentos podem afetar a forma como Ogluo funciona:

- Insulina – utilizada no tratamento da diabetes. A insulina tem o efeito contrário ao do glucagom no nível de glicemia.
- Indometacina – utilizada no tratamento da dor e rigidez nas articulações. A indometacina reduz o efeito do glucagom.

Ogluo pode afetar a forma como os seguintes medicamentos funcionam:

- Varfarina – utilizada para prevenir a formação de coágulos sanguíneos. Ogluo pode aumentar o efeito de diluição do sangue da varfarina.
- Bloqueadores beta – utilizados no tratamento da hipertensão arterial e do batimento cardíaco irregular. Ogluo pode aumentar a sua tensão arterial e pulsação, mas apenas durante um curto espaço de tempo.

Se alguma das situações acima se aplica a si (ou se tiver dúvidas), fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Ogluo.

### **Gravidez, amamentação e fertilidade**

Pode utilizar Ogluo se tiver níveis muito baixos de açúcar no sangue e está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar.

Se estiver grávida, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

### **Condução de veículos e utilização de máquinas**

Após um acontecimento hipoglicémico grave, a sua capacidade de concentração e reação poderá estar reduzida, deve esperar até que os efeitos dos níveis muito baixos de açúcar no sangue tenham desaparecido e que se sinta melhor, antes de conduzir ou utilizar quaisquer ferramentas ou máquinas.

## **3. Como utilizar Ogluo**

Utilize (ou administre) sempre este medicamento exatamente de acordo com as indicações deste folheto ou do seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Ogluo é administrado por injeção por baixo da pele (injeção subcutânea). É fornecido numa seringa pré-cheia, ou seja, contém uma quantidade medida de medicamento. Se seguir estas instruções, é administrada a dose inteira.

### **Preparar**

Verifique o prazo de validade impresso na bolsa.


### **Importante:**

Não utilize este medicamento se o prazo de validade tiver expirado. Caso este medicamento esteja fora do prazo de

**Figura 1**

validade, elimine-o de acordo com os requisitos locais e utilize um novo.

Rasgue a bolsa na linha pontilhada e retire a seringa pré-cheia (ver Figura 1).



### Inspecionar a solução

Inspecione o medicamento líquido através da seringa. Deve ser transparente e incolor, ou amarelo pálido (ver Figura 2).

É normal observar bolhas de ar no medicamento.

#### **Importante:**

Não tente eliminar as bolhas de ar antes de injetar.


Não utilize nem injete este medicamento se o líquido estiver descolorado ou se tiver grumos, flocos ou partículas.

Não injete se a solução não for visível na seringa.

Após a injeção, solicite imediatamente um serviço de emergência médica.

Cada seringa contém uma dose única de glucagon e não pode ser reutilizada.

Figura 2



### Injetar

Escolha o local da injeção e deixe a pele exposta.

Escolha a parte inferior do abdômen, a parte exterior da coxa ou a parte superior do braço para administrar a injeção (ver Figura 3).

Retire qualquer peça de vestuário que esteja a cobrir o local da injeção (ver Figura 4). A injeção deve ser administrada diretamente na pele.

#### **Importante:**

Não administre a injeção através da roupa.

Figura 3



Figura 4



---

Retire a tampa da agulha da seringa (ver Figura 5).

**Importante:**

Não coloque o polegar, os dedos ou a mão na agulha para evitar picadas acidentais com a agulha.

**Figura 5**



---

Faça uma prega de pele, insira a agulha e empurre para iniciar a injeção

Faça uma prega de pele diretamente à volta do local da injeção escolhido e continue a apertar durante toda a injeção (ver Figura 6). Este procedimento é recomendado para assegurar que é administrada uma injeção subcutânea (por baixo da pele) e para prevenir a injeção no músculo.

Sem tocar no êmbolo, insira a agulha na pele no local da injeção, num ângulo de 90 graus (ver Figura 7).

Empurre o êmbolo totalmente para baixo até injetar todo o medicamento líquido na pele (ver Figura 8). Injete o medicamento rapidamente para ajudar a diminuir a dor.

Levante a seringa a direito do local da injeção.

**Importante:**

Não aspire (não puxe a haste do êmbolo para trás) depois de inserir a agulha.


Não levante o Ogluo até que a injeção esteja concluída. Não volte a colocar a tampa na seringa.

---

**Figura 6**



**Figura 7**



**Figura 8**



## **Prestar assistência**

Vire o doente de lado.

Quando uma pessoa inconsciente acorda, poderá sentir-se nauseada (vomitar). Se o doente estiver inconsciente, vire-o de lado para evitar que sufoque (ver Figura 9).

Chame imediatamente o serviço de emergência médica após a injeção de Ogluo. Quando o doente responder ao tratamento, dê-lhe açúcar de uma fonte de ação rápida, como um sumo de fruta ou um refrigerante que contenha açúcar, para prevenir a recorrência de níveis baixos de açúcar no sangue. Se o doente não responder no prazo de 15 minutos, pode ser administrada uma dose adicional de Ogluo com um novo dispositivo enquanto se aguarda pela ajuda de emergência.

Figura 9



## **Que dose deve utilizar**

Este medicamento contém 0,5 mg ou 1 mg da substância ativa numa dose fixa do medicamento. Ser-lhe-á prescrita a dosagem (dose) correta do medicamento para o seu uso pessoal.

A dose recomendada para adultos, adolescentes e crianças é indicada na tabela abaixo. Nas crianças com menos de 6 anos, a dose recomendada depende do peso corporal.

<b>Idade</b>	<b>Peso</b>	<b>Dose recomendada de Ogluo</b>
Crianças, entre os 2 e os 6 anos de idade	Inferior a 25 kg	0,5 mg
Crianças, entre os 2 e os 6 anos de idade	Igual ou superior a 25 kg	1 mg
Adultos e adolescentes, 6 anos ou mais	Não aplicável	1 mg

Após a utilização deste medicamento, coma o mais rapidamente possível para prevenir a recorrência de níveis baixos de açúcar no sangue. Tome açúcar de uma fonte de ação rápida, como um sumo de fruta ou um refrigerante que contenha açúcar.

## **Se utilizar mais Ogluo do que deveria**

Uma quantidade excessiva do medicamento pode fazê-lo sentir-se enjoado (náuseas ou vômitos). Normalmente, não é necessário um tratamento específico.

## **4. Efeitos indesejáveis possíveis**

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Contacte de imediato o seu médico ou um profissional de saúde se notar algum dos seguintes efeitos indesejáveis graves:

*Muito raros (podem afetar até 1 em cada 10.000 pessoas)*

- reação alérgica – os sinais podem incluir pieira, transpiração, batimentos cardíacos rápidos, erupção cutânea, face inchada (ou seja, inchaço da face, dos lábios, da língua e da garganta, o que pode causar dificuldade em engolir ou respirar) ou colapso. Não foram notificadas reações alérgicas com Ogluo, mas estas foram observadas com outros medicamentos injetáveis contendo glucagom. Deve procurar imediatamente ajuda se sentir sintomas de uma reação alérgica.

Outros efeitos indesejáveis podem incluir

*Muito frequentes (podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas)*

- sensação de enjoo (náuseas)
- vômitos

*Frequentes (podem afetar até 1 em cada 10 pessoas)*

- dor de cabeça
- batimento cardíaco rápido (taquicardia)
- desconforto ou reação no local da injeção
- edema no local da injeção (inchaço)
- diarreia

*Pouco frequentes (podem afetar até 1 em cada 100 pessoas)*

- dor abdominal
- hematoma no local da injeção
- eritema no local da injeção (vermelhidão)

### **Efeitos indesejáveis adicionais em crianças**

*Frequentes (podem afetar até 1 em cada 10 pessoas)*

- hiperglicemia
- dor abdominal
- urticária (inchaço/vermelhidão)
- lesões cerebrais
- tonturas

### **Notificação de efeitos indesejáveis**

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no [Apêndice V](#). Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

## **5. Como conservar Ogluo**

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na seringa, na bolsa e na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Este medicamento não deve ser conservado a uma temperatura superior a 25 °C.

Não refrigerar ou congelar. Não conservar a uma temperatura inferior a 15 °C.

Conservar na bolsa de alumínio antes de utilizar para proteger da luz solar e da humidade.

Não utilize este medicamento se verificar que a solução está descorada ou contém partículas.

Não deite fora quaisquer medicamentos no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

## **6. Conteúdo da embalagem e outras informações**

### **Qual a composição de Ogluo**

- A substância ativa de Ogluo é o glucagom.

#### Ogluo 0,5 mg solução injetável em seringa pré-cheia

Cada seringa pré-cheia contém 0,5 mg de glucagom em 0,1 mL.

#### Ogluo 1 mg solução injetável em seringa pré-cheia

- Cada seringa pré-cheia contém 1 mg de glucagom em 0,2 mL. Os outros componentes são trealose di-hidratada, dimetilsulfóxido (DMSO) e água para preparações injetáveis.

### **Qual o aspeto de Ogluo e conteúdo da embalagem**

Ogluo é uma solução transparente, incolor a amarela pálida. É produzido numa seringa pronta a utilizar, pré-cheia e de dose única, contendo 0,5 mg ou 1 mg de glucagom. Cada produto é acondicionado individualmente numa bolsa de alumínio. É fornecida abaixo uma lista completa dos medicamentos Ogluo disponíveis.

- Ogluo 0,5 mg solução injetável em seringa pré-cheia, embalagem com 1 ou 2 seringas pré-cheias de dose única.
- Ogluo 1 mg solução injetável em seringa pré-cheia, embalagem com 1 ou 2 seringas pré-cheias de dose única.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

### **Titular da Autorização de Introdução no Mercado:**

Tetris Pharma B.V  
Bargelaan 200  
Element Offices  
2333CW Leiden  
Holanda

### **Fabricante:**

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.  
Neptunus 12  
Heerenveen, 8448CN  
Holanda

**Este folheto foi revisto pela última vez em**