

FOLHETO INFORMATIVO

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

Neste folheto:

1. O que é OSSIN 500[®] e para que é utilizado.
2. Antes de tomar OSSIN 500[®].
3. Como tomar OSSIN 500[®].
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Conservação de OSSIN 500[®].

OSSIN 500[®] 500 mg cápsulas.

Condroitino Sulfato de Sódio.

- A substância activa é o Condroitino Sulfato de Sódio.

- Os outros ingredientes são: talco e estearato de magnésio.

Laboratório BASI – José Esteves Alves, Lda.
Rua do Padrão, 98
3000-312 COIMBRA
PORTUGAL

1. O QUE É OSSIN 500[®] E PARA QUE É UTILIZADO

OSSIN 500[®] cápsulas apresenta-se em caixas de 30 e 60 unidades.

1 cápsula OSSIN 500[®] contém 500 mg de Condroitino Sulfato de Sódio.

Grupo farmacoterapêutico:

X-2

Anti-reumatismais específicos

OSSIN 500[®] está indicado no tratamento sintomático de longa duração dos sinais e sintomas de todas as formas de doença articular degenerativa (osteoartrose).

2. ANTES DE TOMAR OSSIN 500[®]

Não deve tomar OSSIN 500[®] sem indicação médica se:

- tem hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos seus excipientes.
- tem hipersensibilidade cutânea e das vias respiratórias como acontece nos asmáticos, nos doentes com urticária crónica ou hipersensibilidade à aspirina.

Cuidados com OSSIN 500[®]:

- não está sujeito a qualquer precaução especial de emprego.

Gravidez e aleitamento

Embora os estudos de teratogenia e mutagenese excluam qualquer risco, devem ser observadas as normas gerais de actuação terapêutica em mulheres grávidas e durante o aleitamento. A terapêutica de OSSIN 500[®] durante a gravidez e o aleitamento não está contra-indicada embora a sua prescrição deva ser ponderada em função da relação risco/benefício.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas:

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Informações importantes sobre alguns ingredientes de OSSIN 500[®]

Não aplicável.

Tomar OSSIN 500[®] com outros medicamentos:

Não se conhecem interacções medicamentosas ou outras.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

3. COMO TOMAR OSSIN 500[®]

Adulto: 1 cápsula de 500 mg duas vezes por dia durante 3 meses. Estes ciclos de tratamento podem repetir-se 2 a 3 vezes por ano. Não está indicado em crianças com idade inferior a 15 anos.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que OSSIN 500[®] é demasiado forte ou demasiado fraco.

OSSIN 500[®] é administrado por via oral.

Se utilizar mais OSSIN 500[®] do que deveria:

Em casos de sobrecarga recomenda-se proceder às medidas gerais comuns a outras intoxicações, tais como lavagem gástrica e administração de carvão activado e utilizar as medidas de suporte consideradas adequadas.

Caso se tenha esquecido de tomar OSSIN 500[®]:

Caso se tenha esquecido de tomar uma dose de OSSIN 500[®] tome-a assim que se lembrar, contudo se a altura da próxima toma estiver próxima não tome a dose esquecida.

Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como os demais medicamentos, OSSIN 500[®] pode ter efeitos secundários.

Os efeitos indesejáveis são pouco frequentes e de intensidade ligeira:

- Pele e anexos: eritema difuso, reacções urticariformes, exantemas máculo-papulares pruriginosas, edema.
- Sistema digestivo: raramente náuseas e vómitos. Casos isolados: toxicidade hepática com elevação de transaminases.

Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. CONSERVAÇÃO DE OSSIN 500[®]

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Conservar OSSIN 500[®] na sua embalagem de origem, bem fechada, ao abrigo da luz directa e da humidade. Conservar a uma temperatura inferior a 25 °C.

APROVADO EM 28-04-2004 INFARMED

Não utilize OSSIN[®] após ultrapassado o prazo de validade indicado na embalagem.

Este folheto foi revisto pela última vez em Julho de 2004.

Outras informações

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o titular da autorização de introdução no mercado

Portugal

Laboratório BASI – José Esteves Alves, Lda.

Rua do Padrão, 98

P-3000-312 COIMBRA - PORTUGAL

Tel: + 351 - 239 827 021