

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Paracetamol Azevedos 1000 mg Comprimidos
Paracetamol

Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos indesejáveis se agravar ou se detetar quaisquer efeitos indesejáveis não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Paracetamol Azevedos e para que é utilizado.
2. Antes de tomar Paracetamol Azevedos.
3. Como tomar Paracetamol Azevedos.
4. Efeitos indesejáveis possíveis.
5. Como conservar Paracetamol Azevedos.
6. Outras informações.

1. O QUE É PARACETAMOL AZEVEDOS E PARA QUE É UTILIZADO

Paracetamol Azevedos é utilizado no tratamento de situações clínicas que requerem um analgésico (utilizado para eliminar ou aliviar a dor) e/ou um antipirético (utilizado para baixar a febre).

Grupo farmacoterapêutico:

2.10. Analgésicos e antipiréticos.

2. ANTES DE TOMAR PARACETAMOL AZEVEDOS

Antes de tomar Paracetamol Azevedos é importante que leia esta secção e esclareça quaisquer dúvidas que possa ter com o seu médico.

Não tome Paracetamol Azevedos

Este medicamento está contraindicado nas seguintes situações:

- se tem alergia ao paracetamol ou a qualquer outro componente de Paracetamol Azevedos.
 - se tem alguma doença do fígado.
- Tome especial cuidado com Paracetamol Azevedos.
- se tem insuficiência renal ou do fígado.
 - se tem doença de Gilbert (doença metabólica hereditária rara).
 - se tem febre há mais de 3 dias, febre alta (superior a 39°C) ou febre recorrente.
 - se está a tomar outros medicamentos contendo paracetamol.

Se alguma destas situações se aplicar a si fale com o seu médico antes de tomar Paracetamol Azevedos.

Ao tomar Paracetamol Azevedos com outros medicamentos

Confirme com o seu médico se está a tomar algum dos seguintes medicamentos:

- sedativos;
- antiepilépticos (utilizados para a epilepsia);
- anticoagulantes orais (utilizados para tornar o sangue mais fluido);
- rifampicina (utilizado para o tratamento da tuberculose);
- cloranfenicol (antibiótico);
- colestiramina (utilizado para controlar o colesterol). Tome Paracetamol Azevedos 1 hora antes ou 4 horas depois de tomar colestiramina;
- zidovudina (utilizado no tratamento de doenças virais);
- medicamentos que atrasam ou aceleram o esvaziamento gástrico, tais como propantelina, metoclopramida ou domperidona;
- flucloxacilina (antibiótico), devido a um risco grave de anomalias no sangue e fluidos (acidose metabólica com hiato aniônico aumentado) que deve ter tratamento urgente e que pode ocorrer particularmente em caso de compromisso grave da função renal, sépsis (quando as bactérias e as suas toxinas circulam no sangue levando a lesões nos órgãos), malnutrição, alcoolismo crónico, e se forem utilizadas as doses diárias máximas de paracetamol.

A toma destes medicamentos com Paracetamol Azevedos pode aumentar a ocorrência de efeitos indesejáveis ou alterar o efeito terapêutico do paracetamol ou dos medicamentos referidos.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Ao tomar Paracetamol Azevedos com alimentos e bebidas

A toma de Paracetamol Azevedos a seguir às refeições atrasa o início da ação deste medicamento.

Gravidez e amamentação

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Se necessário, Paracetamol Azevedos pode ser tomado durante a gravidez. Deve tomar a dose mais baixa possível para aliviar a dor e/ou diminuir a febre e a duração da terapêutica deve ser limitada ao menor período de tempo possível. Contacte o seu médico se a dor e/ou febre não diminuírem ou se precisar de tomar o medicamento com mais frequência.

Aleitamento

Pode tomar Paracetamol Azevedos durante o aleitamento.

Paracetamol Azevedos é excretado no leite materno mas em quantidades insignificantes para o bebé que está a amamentar

Condução de veículos e utilização de máquinas

Paracetamol Azevedos pode provocar sonolência ligeira e vertigens.

No entanto, não se espera que estes efeitos afetem a capacidade de conduzir veículos ou de utilizar máquinas.

3. COMO TOMAR PARACETAMOL AZEVEDOS

Tome sempre Paracetamol Azevedos de acordo com as indicações do seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Engula os comprimidos inteiros ou desfeitos num copo de água.

Adultos

A dose habitual é de 1 comprimido, 2 a 4 vezes por dia, com intervalos mínimos de 4 horas.

A dose máxima é de 4 comprimidos, por dia.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se achar que Paracetamol Azevedos é demasiado forte ou demasiado fraco.

Crianças

O uso de Paracetamol Azevedos 1000 mg comprimidos não é recomendado em crianças.

Duração do tratamento

O seu médico indicar-lhe-á a duração do tratamento.

Não tome Paracetamol Azevedos por mais de 10 dias, salvo indicação em contrário do seu médico.

Se tomar mais Paracetamol Azevedos do que deveria

Contacte imediatamente o serviço de urgência do hospital mais próximo se tomou, acidentalmente, demasiados comprimidos ou se outra pessoa ou criança tomou o seu medicamento. Leve consigo a embalagem de Paracetamol Azevedos.

Em caso de sobredosagem podem ocorrer os seguintes sintomas:

- náuseas;
- vómitos;
- transpiração;
- sonolência;
- mal estar;
- dores fortes no abdómen.

Caso se tenha esquecido de tomar Paracetamol Azevedos

Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Se se esquecer de tomar uma dose tome-a assim que se lembrar e depois continue a tomar o seu medicamento como habitualmente. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose não tome a dose em falta e siga os horários normais a partir daí.

4. EFEITOS INDESEJÁVEIS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Paracetamol Azevedos pode causar efeitos indesejáveis, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Em casos muito raros este medicamento pode provocar uma reação alérgica grave que se caracteriza por:

- inchaço localizado;
- espasmos musculares no trato respiratório;
- dificuldades respiratórias;
- transpiração;
- náuseas;
- descida da pressão arterial.

Se sentir algum destes sintomas, pare de tomar Paracetamol Azevedos e recorra à urgência do hospital mais próximo.

Efeitos indesejáveis frequentes (entre 1 e 10 em cada 100 pessoas tratadas):

- sonolência ligeira;
- náuseas;
- vómitos.

Efeitos indesejáveis pouco frequentes (entre 1 e 10 em cada 1.000 pessoas tratadas):

- vertigens;
- sonolência;
- nervosismo;
- sensação de ardor na faringe;
- diarreia;
- dor abdominal;
- obstipação;
- dores de cabeça;
- transpiração;
- hipotermia (descida da temperatura do corpo abaixo dos 36°C).

Efeitos indesejáveis raros (entre 1 e 10 em cada 10.000 pessoas tratadas):

- vermelhidão da pele.

Efeitos indesejáveis muito raros (menos do que 1 em cada 10.000 pessoas tratadas):

- perturbações da formação do sangue (trombocitopenia, leucopenia, casos isolados de agranulocitose, pancitopenia);
- broncoespasmo (asma alérgica).

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. COMO CONSERVAR PARACETAMOL AZEVEDOS

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.

Não utilize Paracetamol Azevedos após o prazo de validade impresso na embalagem. O Prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Paracetamol Azevedos

A substância ativa deste medicamento é o paracetamol. Cada comprimido de Paracetamol Azevedos contém 1000 mg de paracetamol.

Os outros componentes são: amido pré-gelatinizado, povidona e ácido esteárico.

Qual o aspeto de Paracetamol Azevedos e conteúdo da embalagem

Paracetamol Azevedos apresenta-se na forma de comprimidos estando disponível em embalagens de 9, 18, 20, 27, 36 ou 60 comprimidos.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.
Estrada Nacional 117-2, Alfragide
2614-504 Amadora
Portugal

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Avenida das Indústrias, Alto do Colaride, Agualva
2735-213 Cacém
Portugal

Este folheto informativo foi aprovado pela última vez em