

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Paracetamol Fuzix 1000 mg comprimidos
Paracetamol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Paracetamol Fuzix e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Paracetamol Fuzix
3. Como tomar Paracetamol Fuzix
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Paracetamol Fuzix
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Paracetamol Fuzix e para que é utilizado

Paracetamol Fuzix é um medicamento para o alívio da dor e diminuição da febre (analgésico e antipirético).

É utilizado para o tratamento sintomático de situações clínicas tais como:

- estados gripais ou febre devida a infeções
- reações febris associadas à vacinação
- cefaleias (dores de cabeça) e enxaquecas
- dores de dentes, de ouvidos, menstruais, traumáticas, musculares, articulares e osteoartrose
- alívio da dor antes e após intervenções cirúrgicas.

2. O que precisa de saber antes de tomar Paracetamol Fuzix

Não tome Paracetamol Fuzix

- se tem alergia (hipersensibilidade) ao paracetamol ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6)
- se sofre de doença grave do fígado.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Paracetamol Fuzix.

Tome especial cuidado:

- se tem uma doença no fígado (por exemplo, inflamação do fígado causada por abuso de bebidas alcoólicas) ou nos rins
- se está a tomar outros medicamentos que contenham paracetamol

- se tem anemia hemolítica grave (diminuição anormal do nº de glóbulos vermelhos no sangue)
- se tem uma doença metabólica hereditária e rara denominada doença de Gilbert que é acompanhada por um aumento dos níveis de bilirrubina no sangue

Nestas circunstâncias deve consultar o médico antes de usar o medicamento.

Não deve utilizar Paracetamol Fuzix frequentemente por um longo período de tempo, uma vez que a utilização prolongada pode causar problemas no fígado. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver intenção de tomar paracetamol por um longo período de tempo.

O paracetamol deve ser usado com precaução em situações de desidratação e de má-nutrição crónica.

Se sofrer de alcoolismo ou se tiver uma doença no fígado, não utilize paracetamol exceto se prescrito pelo seu médico e não tome paracetamol em simultâneo com bebidas alcoólicas. O paracetamol não potencia o efeito do álcool.

Se está a tomar simultaneamente outros medicamentos para as dores, que contenham paracetamol, não tome Paracetamol Fuzix sem primeiro falar com o seu médico ou farmacêutico.

Após o uso incorreto de analgésicos a longo prazo e em doses elevadas, podem ocorrer dores de cabeça que podem não ser tratadas com doses elevadas deste medicamento.

De um modo geral, a ingestão habitual de medicamentos para as dores, em particular em combinação com várias substâncias analgésicas, pode conduzir a lesões nos rins permanentes com risco de insuficiência do rim (nefropatia analgésica).

O paracetamol não deve ser usado em situações de febre alta (superior a 39°C), febre de duração superior a 3 dias ou febre recorrente, exceto se prescrito pelo médico, pois estas situações podem necessitar de avaliação e tratamento médico.

Efeitos em doentes com patologias especiais

Se sofrer de doença do fígado ou do rim ou doença de Gilbert, fale com o seu médico que lhe recomendará a dose e os intervalos de administração adequados de paracetamol.

Crianças e adolescentes

Paracetamol Fuzix destina-se a ser tomado por adultos com idade igual ou superior a 18 anos.

Outros medicamentos e Paracetamol Fuzix

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

É especialmente importante nos seguintes casos:

- cloranfenicol (para tratar infeções)

- zidovudina (para tratar a SIDA). Os doentes que estão a tomar este medicamento ao mesmo tempo que o paracetamol poderão estar mais sensíveis para desenvolver uma redução do número de glóbulos brancos
- rifampicina (para tratar infecções, por ex. a tuberculose)
- cimetidina (para tratar a azia)
- metoclopramida ou domperidona (para tratar náuseas e vômitos)
- colestiramina (para diminuir o colesterol). Tome o paracetamol uma hora antes ou 4 horas depois de tomar colestiramina
- anticoagulantes (medicamentos para tornar o sangue menos espesso, por exemplo varfarina), no caso de ser necessário tomar um medicamento para o alívio das dores diariamente durante um longo período de tempo
- carbamazepina, fenobarbital e fenitoína (para tratar a epilepsia).

Paracetamol Fuzix com alimentos, bebidas e álcool

A utilização simultânea de paracetamol com o consumo de grandes quantidades de bebidas alcoólicas deve ser evitada.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Durante a gravidez, o paracetamol não deve ser utilizado por longos períodos de tempo, em doses elevadas ou em combinação com outros medicamentos.

Doses terapêuticas de paracetamol podem ser usadas durante a gravidez e o aleitamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

O paracetamol não interfere com a capacidade de condução ou utilização de máquinas. No entanto, deve ter-se em consideração que durante o tratamento com paracetamol podem ser observados como efeitos secundários sonolência ligeira e vertigens.

3. Como tomar Paracetamol Fuzix

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Posologia

Paracetamol Fuzix destina-se a ser tomado por adultos.

A dose recomendada de Paracetamol Fuzix é de 1 comprimido, 2 a 4 vezes por dia. A administração pode ser repetida a intervalos de 4 – 8 horas, conforme a situação clínica.

Não exceda a dose recomendada.

A dose máxima diária é de 4 comprimidos.

Grupos especiais de doentes:

Doentes idosos: não é necessário ajustar a dose em doentes idosos.

Se sofre de doença do fígado ou do rim, ou doença de Gilbert, fale com o seu médico que lhe recomendará a dose e os intervalos de administração adequados de Paracetamol Fuzix.

Modo de administração

Os comprimidos são para administrar por via oral.

Os comprimidos podem ser tomados inteiros ou desfeitos em água.

A ranhura existe apenas para o ajudar a partir o comprimido, caso tenha dificuldade em engoli-lo inteiro.

A administração após as refeições pode atrasar o início de ação.

Se tomar mais Paracetamol do que deveria

Em caso de sobredosagem, deverá procurar de imediato a assistência médica, mesmo que se sinta bem, uma vez que corre o risco de surgirem lesões graves no fígado algumas horas mais tarde.

Os primeiros sinais de sobredosagem podem ser náuseas, vômitos e dores fortes no abdómen. Mesmo que estes sinais melhorem temporariamente, consulte imediatamente o seu médico.

Caso se tenha esquecido de tomar Paracetamol Fuzix

Se se esqueceu de tomar uma dose, tome-a logo que se lembrar, e depois continue o tratamento como anteriormente. No entanto, não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Paracetamol Fuzix

A paragem repentina da toma de paracetamol após a utilização a longo prazo pode conduzir a dores de cabeça, fadiga, dor muscular, nervosismo, tonturas e desmaios. Estes sintomas desaparecem após alguns dias. Até esta altura, deve evitar a utilização adicional de analgésicos e não deve reiniciar o tratamento com estes medicamentos sem um aconselhamento médico.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Normalmente o paracetamol é bem tolerado nas doses recomendadas.

Efeitos secundários frequentes (podem afetar entre >1/100 e < 1/10 doentes):

- Sonolência ligeira, náuseas, vômitos

Pouco frequentes (podem afetar entre >1/1000 e <1/100 doentes):

- Vertigens, sonolência, nervosismo
- Sensação de ardor na faringe
- Diarreia, dor abdominal (incluindo cólicas e ardor), obstipação (prisão de ventre)
- Dores de cabeça
- Transpiração/sudação, hipotermia

Raros (podem afetar entre >1/10 000 e <1/1000 doentes):

- Vermelhidão da pele

Muito raros (podem afetar <10 000 doentes):

- Perturbações do sangue (alteração na contagem das células sanguíneas)
- Broncospasmo (estreitamento das vias aéreas) em pessoas predispostas
- Reações alérgicas, reações de hipersensibilidade exacerbadas ao paracetamol, espasmos musculares das vias aéreas que provocam dificuldade na respiração, inchaço da face, transpiração, náuseas e descida da tensão arterial (incluindo choque).

Ao aparecimento dos primeiros sinais de reações alérgicas interrompa o tratamento e procure imediatamente o conselho do seu médico.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: + 351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio

da

internet:

<http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Paracetamol Fuzix

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blister, após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Paracetamol Fuzix

A substância ativa é o paracetamol. Paracetamol Fuzix contém 1000 mg de paracetamol.

Os outros componentes (excipientes) são amido pré-gelificado, povidona e ácido esteárico.

Qual o aspeto de Paracetamol Fuzix e conteúdo da embalagem

Comprimidos brancos, oblongos com uma ranhura numa das faces.

A ranhura existe apenas para o ajudar a partir o comprimido, caso tenha dificuldade em engoli-lo inteiro.

Os comprimidos são acondicionados em blisters de PVC/Alumínio, em embalagens de 18, 20, 40 ou 60 comprimidos.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

GP - Genéricos Portugueses, Lda.
Rua Henrique de Paiva Couceiro, nº 29
Venda Nova, 2700-451 Amadora
Portugal

Fabricante

Farmalabor – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Zona Industrial de Condeixa-a-Nova
3150-194 Condeixa-a-Nova
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em: