

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Pedicol 100 mg/ml Solução cutânea  
Ácido salicílico

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.  
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Pedicol com precaução para obter os devidos resultados.  
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.  
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.  
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.  
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Pedicol e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Pedicol
3. Como utilizar Pedicol
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Pedicol
6. Outras informações

### 1. O QUE É PEDICOL E PARA QUE É UTILIZADO

Pedicol é um medicamento pertencente ao Grupo farmacoterapêutico: 13.8.3 - Medicamentos usados em afecções cutâneas. Outros medicamentos usados em dermatologia. Preparações para verrugas, calos e condilomas.

O Pedicol, 100 mg/ml, solução cutânea está indicado na remoção de calos, calosidades e verrugas. Possui na sua constituição ácido salicílico, uma substância que, nas concentrações utilizadas, possui propriedades queratolíticas, sendo utilizada frequentemente no tratamento de hiperqueratoses.

### 2. ANTES DE UTILIZAR PEDICOL

Não utilize Pedicol

- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao ácido salicílico ou a qualquer outro componente.

Tome especial cuidado com Pedicol

A utilização de Pedicol implica uma precaução especial, dada a corrosão que este produto pode provocar, deve ser aplicado única e exclusivamente na verruga e não na pele sã circundante. Este cuidado deve ser redobrado em zonas com pele mais fina.

Não deve ser aplicado na zona das mucosas e na face.

Se for diabético, aconselha-se uma utilização sob aconselhamento do seu médico ou farmacêutico.

Ao utilizar Pedicol com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. Não são conhecidos quaisquer tipos de interacções.

#### Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. Não se recomenda a utilização deste medicamento em caso de gravidez ou aleitamento.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

Não relevante.

### 3. COMO UTILIZAR PEDICOL

#### Uso cutâneo.

Utilizar Pedicol sempre de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

O medicamento destina-se à aplicação tópica sobre o calo, calosidade ou verruga, evitando a aplicação na pele normal. A tampa possui um aplicador que auxilia a aplicação no local.

Aplicar a solução, deixar secar e, se necessário, cobrir com um penso protector.

Salvo indicação médica em contrário, aplicar duas a três vezes ao dia. Repetir a operação por vários dias consecutivos. Salvo indicação em contrário, poderá utilizar Pedicol por períodos que oscilam entre as quatro e as seis semanas.

Para ajudar a remover mais facilmente os calos, calosidades ou verrugas, poderá mergulhá-las em água quente durante uns minutos (5 minutos), e posteriormente limar com lima adequada ou pedra - pomes.

#### Se utilizar mais Pedicol do que deveria

Não foram descritos casos de sobredosagem ou intoxicação. No entanto, em caso de ingestão accidental, poderão ocorrer dores, náuseas, vômitos e diarreia devido à corrosão provocada pelo produto nas mucosas. Nestes casos, e enquanto não for possível efectuar uma lavagem gástrica, deve-se ingerir água adicionada de um óleo vegetal ou carvão activado.

#### Caso se tenha esquecido de utilizar Pedicol

Não aplique uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de aplicar. Volte a aplicar a solução na regularidade prevista.

#### Se parar de utilizar Pedicol

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos medicamentos, o medicamento Pedicol pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

A maior parte dos efeitos secundários são fracos e de curta duração. Poderá ocorrer, ocasionalmente, em indivíduos mais sensíveis uma sensação de queimadura, nomeadamente após a aplicação. Poderá ocorrer uma coloração esbranquiçada na zona circundante à verruga devido a oclusão provocada pelo produto.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

## 5. COMO CONSERVAR PEDICOL

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Manter o frasco bem fechado para proteger da luz e da humidade.

Não utilize Pedicol após o prazo de validade impresso no frasco e na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

## 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Pedicol

A substância activa é o ácido salicílico. Cada mililitro de solução cutânea contém 100 mg de ácido salicílico.

Os outros componentes são: colofónia, colódio elástico e verde malaquite.

Qual o aspecto de Pedicol e conteúdo da embalagem

Ácido Salicílico 100 mg/ml, solução cutânea apresenta-se na forma farmacêutica de solução cutânea, acondicionado em frasco de Vidro Tipo III âmbar, fechado com tampa de plástico com aplicador. Embalagem com 1 frasco com 15 ml de solução cutânea.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Labialfarma - Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.  
Felgueira  
3450-336 Sobral, Mortágua  
Portugal

Este folheto foi aprovado pela última vez em