

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Perindopril + Indapamida Generis 2 mg + 0,625 mg comprimidos  
Perindopril tert-butilamina + indapamida

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Perindopril + Indapamida Generis e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Perindopril + Indapamida Generis
3. Como tomar Perindopril + Indapamida Generis
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Perindopril + Indapamida Generis
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

#### 1. O que é Perindopril + Indapamida Generis e para que é utilizado

Perindopril + Indapamida Generis é uma associação de duas substâncias ativas, perindopril e indapamida. É um anti-hipertensor e é utilizado no tratamento da pressão sanguínea elevada (hipertensão) em adultos.

O perindopril pertence a uma classe de medicamentos chamada inibidores da enzima de conversão da angiotensina (inibidores da ECA). Estes atuam dilatando os vasos sanguíneos, o que torna mais fácil para o seu coração bombear o sangue através deles. A indapamida é um diurético. Os diuréticos aumentam a quantidade de urina produzida pelos rins. Contudo, a indapamida é diferente de outros diuréticos, porque só provoca um ligeiro aumento na quantidade de urina produzida. Cada um dos componentes ativos reduz a pressão sanguínea e trabalham juntos para controlar a sua pressão sanguínea.

#### 2. O que precisa de saber antes de tomar Perindopril + Indapamida Generis

Não tome Perindopril + Indapamida Generis :

- se tem alergia ao perindopril ou a qualquer outro inibidor da ECA, à indapamida ou a qualquer outra sulfonamida ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6),
- se já teve sintomas tais como respiração ofegante, inchaço da face ou língua, comichão intensa ou graves erupções cutâneas com um tratamento prévio com um inibidor da ECA ou se já teve ou um membro da sua família já teve estes sintomas em qualquer outra circunstância (uma condição chamada angioedema),
- se tem diabetes ou função renal diminuída e está a ser tratado com um medicamento que contém aliscireno para diminuir a pressão arterial,

- se tem uma doença grave do fígado ou sofre de encefalopatia hepática (doença degenerativa do cérebro),
- se tem uma doença grave dos rins ou se está a fazer diálise,
- se tem valores de potássio no sangue baixos,
- se houver suspeita de insuficiência cardíaca descompensada não tratada (grave retenção de água, dificuldade em respirar),
- se tiver mais de três meses de gravidez. (Também é preferível não tomar Perindopril + Indapamida Generis no início da gravidez - Ver secção "Gravidez e Aleitamento"),
- se está a amamentar.
- se tomou ou está a tomar sacubitril / valsartan, um medicamento utilizado em adultos para tratar um tipo de insuficiência cardíaca de longa duração (crónica), porque aumenta o risco de angioedema (inchaço rápido sob a pele numa área como a garganta).

Se está a tomar algum dos seguintes medicamentos, o risco de angioedema pode estar aumentado:

- Racecadotril, um medicamento utilizado no tratamento da diarreia;
- Medicamentos utilizados para prevenir a rejeição de órgãos transplantados e para o cancro (por exemplo, temsirolimus, sirolimus, everolimus).
- Vildagliptina, um medicamento utilizado para tratar a diabetes.

#### Advertências e precauções

Se algum dos seguintes casos se aplicar a si, fale com o seu médico antes de tomar Perindopril + Indapamida Generis :

- se tem estenose da aorta (estreitamento do maior vaso sanguíneo que parte do coração) ou cardiomiopatia hipertrófica (doença do músculo cardíaco) ou estenose da artéria renal (estreitamento da artéria que fornece sangue ao rim),
  - se tem qualquer outro problema cardíaco ou problemas renais,
  - se tem problemas do fígado,
  - se sofre duma doença colagénica (doença da pele), tal como lúpus eritematoso sistémico ou esclerodermia,
  - se tem aterosclerose (endurecimento das artérias),
  - se sofre de hiperparatiroidismo (hiperatividade da glândula paratiroide),
  - se sofre de gota,
  - se tem diabetes,
  - se tem uma dieta restrita em sal, usa substitutos do sal que contêm potássio, ou outros medicamentos que podem aumentar o potássio no seu organismo (tal como a heparina e o cotrimoxazol também conhecido como trimetoprim/sulfametoxazol),
  - se toma lítio ou diuréticos poupadores de potássio (espironolactona, triamtereno) ou suplementos de potássio, o uso com Perindopril + Indapamida Generis deve ser evitado (ver "Ao tomar Perindopril + Indapamida Generis com outros medicamentos"),
  - se for idoso
  - se já sofreu de reações de fotossensibilidade
- se teve uma reação alérgica grave com inchaço da face, lábios, boca, língua ou garganta, o que pode causar dificuldade em engolir ou respirar (angioedema). Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o tratamento. Se desenvolver estes sintomas, deverá interromper o tratamento e consultar um médico imediatamente.
- se está a tomar algum dos seguintes medicamentos para tratar a pressão arterial elevada:

- um antagonista dos recetores da angiotensina II (ARA) (também conhecidos como sartans – por exemplo valsartan, telmisartan, irbesartan) em particular se tiver problemas nos rins relacionados com diabetes;
- aliscireno.

O seu médico pode verificar a sua função renal, pressão arterial e a quantidade de eletrólitos (por exemplo, o potássio) no seu sangue em intervalos regulares.

Ver também a informação sob o título "Não tome Perindopril + Indapamida Generis "

- se é de raça negra - este medicamento pode não ser tão eficaz para si na redução da pressão arterial, ou pode estar em maior risco de ocorrência de angioedema
- se é um doente em hemodiálise, dialisado com membranas de fluxo elevado

#### Angioedema

Angioedema (uma reação alérgica grave com inchaço da face, lábios, língua ou garganta com dificuldade em engolir ou respirar) foi reportado em doentes tratados com inibidores da ECA, incluindo o perindopril + indapamida. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o tratamento. Se desenvolver estes sintomas, pare de tomar Perindopril + Indapamida Generis e consulte um médico imediatamente. Ver secção 4.

Em particular, fale com o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar algum dos seguintes medicamentos:

- Suplementos de potássio (incluindo substitutos do sal), diuréticos poupadores de potássio e outros medicamentos que podem aumentar a quantidade de potássio no seu sangue (por exemplo trimetoprim e cotrimoxazol para infeções causadas por bactérias; ciclosporina, um medicamento imunossupressor usado para prevenir a rejeição de órgãos transplantados; e heparina, um medicamento usado para diluir o sangue para prevenir coágulos)

Deve informar o seu médico se pensa estar grávida (ou planeia engravidar). Perindopril + Indapamida Generis não está recomendado no início da gravidez e não deve ser tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura (ver "Gravidez e aleitamento").

Durante a toma de Perindopril + Indapamida Generis , deve também informar o seu médico ou um profissional de saúde:

- se for submetido a anestesia e/ou cirurgia,
- se teve recentemente diarreia, ou vômitos, ou está desidratado,
- se for submetido a diálise ou a aferese das LDL (remoção do colesterol do seu sangue por uma máquina),
- se for submetido a tratamento de dessensibilização para reduzir os efeitos de alergia a picada de abelha ou vespa,
- se for submetido a um teste médico que necessite de injeção dum agente de contraste iodado (uma substância que torna os órgãos como os rins ou estômago visíveis aos raios X),
- se sentir uma diminuição na visão ou dor ocular. Estes podem ser sintomas de acumulação de líquido na camada vascular do olho (efusão coroidal) ou um aumento da pressão no olho e podem ocorrer dentro de horas a semanas depois de tomar Perindopril + Indapamida Generis . Isto pode levar à perda permanente da visão, se não for tratado. Se tiver antecedentes de alergia a sulfonamidas ou penicilinas,

poderá ter maior risco de desenvolver isto. Pare de tomar Perindopril + Indapamida Generis e contacte o seu médico.

Os desportistas deverão ter em atenção que Perindopril + Indapamida Generis contém uma substância ativa (indapamida) que pode provocar uma reação positiva nos controlos antidoping.

Crianças e adolescentes:

Perindopril + Indapamida Generis não deve ser dado a crianças.

Outros medicamentos e Perindopril + Indapamida Generis

Informe o seu médico ou o farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não deve tomar Perindopril + Indapamida Generis com:

- lítio (usado para tratamento da depressão),
- aliscireno (medicamento utilizado no tratamento da hipertensão arterial), se não tiver diabetes mellitus ou doenças renais,
- diuréticos poupadores de potássio (triamtereno, amilorida), sais de potássio, outros medicamentos que podem aumentar o potássio no organismo (tais como heparina e cotrimoxazol, também conhecido como trimetoprim/sulfametoxazol),
- outros medicamentos utilizados para tratar a hipertensão arterial: inibidores da ECA e antagonistas dos recetores da angiotensina,
- estramustina (usada no tratamento do cancro).

O tratamento com Perindopril + Indapamida Generis pode ser afetado por outros medicamentos. O seu médico pode necessitar de alterar a sua dose e/ou tomar outras precauções. Fale com o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos pois podem ser necessários cuidados especiais:

- outros medicamentos para tratar a pressão sanguínea alta, como um antagonista dos recetores da angiotensina II (ARA) ou aliscireno (ver também informações sob os títulos "Não tome Perindopril + Indapamida Generis " e "Advertências e precauções") ou diuréticos (medicamentos que aumentam a quantidade de urina produzida pelos rins),
- medicamentos poupadores de potássio utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca: eplerenona e espironolactona em doses entre 12,5 mg a 50 mg por dia,
- medicamentos utilizados com maior frequência para tratar diarreia (racecadotril) ou evitar a rejeição de órgãos transplantados (sirolimus, everolimus e outros medicamentos que pertencem à classe dos inibidores de mTOR). Consulte a secção "Advertências e precauções",
- anestésicos
- meios de contraste iodados
- moxifloxacina, ou esparfloxacina (antibióticos: medicamentos utilizados no tratamento de infeções),
- metadona (utilizada para tratar dependência)
- procainamida (para o tratamento do batimento cardíaco irregular),
- alopurinol (para o tratamento da gota),
- mizolastina, terfenadina ou astemizole (antihistamínicos para a febre dos fenos ou alergias),
- corticosteroides usados para tratar várias condições incluindo asma grave ou artrite reumatoide,

- imunossupressores usados para o tratamento de alterações autoimunes ou na sequência de uma cirurgia de transplante para prevenir rejeição (ex.: ciclosporina, tacrolímus),
- eritromicina injetável (um antibiótico),
- halofantrina (usado para tratar certos tipos de malária),
- pentamidina (usado para tratar pneumonia),
- ouro injetável (usado no tratamento da poliartrite reumatoide)
- vincamina (usado para tratar alterações cognitivas sintomáticas no idoso, incluindo perda de memória),
- bepridilo (usado para tratar angina de peito),
- sultoprida (tratamento de psicoses),
- medicamentos usados para problemas do ritmo cardíaco (ex.: quinidina, hidroquinidina, disopiramida, amiodarona, sotalol),
- cisaprida, difemanil (normalmente usados para problemas de estômago),
- digoxina ou outros glicosídeos cardíacos (para o tratamento de problemas do coração),
- baclofeno (para tratar a dureza dos músculos que aparece em doenças tal como a esclerose múltipla),
- medicamentos para tratar diabetes tais como insulina, metformina, ou gliptinas,
- cálcio, incluindo suplementos de cálcio,
- laxantes estimulantes (ex.: sene),
- medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (ex.: ibuprofeno) ou salicilatos em alta dose (ex.: aspirina),
- anfotericina B injetável (para tratar doença fúngica grave),
- medicamentos para tratar alterações mentais, tais como depressão, ansiedade, esquizofrenia. (ex.: antidepressivos tricíclicos, neurolépticos (tais como amisulprida, sulpirida, sultoprida, tiaprida, haloperidol, droperidol))
- tetracosactido (para tratar a doença de Crohn),
- trimetoprim (utilizado no tratamento de infeções),
- vasodilatadores, incluindo nitratos (utilizados para dilatar os vasos sanguíneos),
- heparina (utilizada para tornar o sangue mais fino),
- medicamentos utilizados no tratamento da pressão arterial baixa, choque ou asma (efedrina, epinefrina ou noradrenalina).

Perindopril + Indapamida Generis com alimentos e bebidas

É preferível tomar Perindopril + Indapamida Generis antes de uma refeição.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Gravidez

Deve informar o seu médico se pensa que está grávida (ou planeia engravidar). O seu médico normalmente aconselha-la-á a interromper Perindopril + Indapamida Generis antes de engravidar ou assim que souber que está grávida e a tomar outro medicamento em vez de Perindopril + Indapamida Generis . Perindopril + Indapamida Generis não está recomendado no início da gravidez e não deve ser tomado após o terceiro mês de gravidez, uma vez que pode ser gravemente prejudicial para o bebé se utilizado a partir desta altura.

Amamentação

Não deve tomar Perindopril + Indapamida Generis se estiver a amamentar. Informe de imediato o seu médico se está a amamentar ou vai começar a amamentar. Fale com o seu médico imediatamente.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

Habitualmente, Perindopril + Indapamida Generis não afeta a vigilância, mas em certos doentes podem surgir reações tais como tonturas e fraqueza relacionadas com a descida da pressão sanguínea. Nestes casos a sua capacidade para conduzir ou utilizar máquinas pode estar comprometida.

#### Perindopril + Indapamida Generis contém lactose

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

#### Perindopril + Indapamida Generis contém sódio

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é praticamente "isento de sódio".

### 3. Como tomar Perindopril + Indapamida Generis

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. A dose habitual é um comprimido por dia. O seu médico pode decidir aumentar a dose para dois comprimidos por dia ou modificar a posologia se tiver insuficiência renal. Tome o seu comprimido de preferência de manhã e antes duma refeição. Engula o comprimido com um copo de água.

#### Se tomar mais Perindopril + Indapamida Generis do que deveria

Se tomar muitos comprimidos, contacte o seu médico ou a urgência hospitalar mais próxima imediatamente.

O efeito mais provável, em caso de sobredosagem é a descida da pressão sanguínea. Se se verificar uma descida importante da pressão sanguínea (associada a náuseas, vômitos, câibras, tonturas, sonolência, confusão mental, alterações na quantidade de urina produzida pelos rins), deitar-se de costas com as pernas elevadas pode ajudar.

#### Caso se tenha esquecido de tomar Perindopril + Indapamida Generis

É importante tomar o seu medicamento todos os dias regularmente para o tratamento ser mais efetivo. Contudo se se esquecer de tomar uma dose de Perindopril + Indapamida Generis tome a dose seguinte à hora habitual. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

#### Se parar de tomar Perindopril + Indapamida Generis

Como o tratamento para a pressão sanguínea elevada é normalmente prolongado, deve falar com o seu médico antes de parar de tomar o medicamento.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Se sentir algum dos seguintes efeitos, potencialmente graves, pare de tomar o medicamento e fale imediatamente com o seu médico:

- tonturas graves ou desmaio devido a pressão arterial baixa (frequentes - pode afetar até 1 em 10 utilizadores),
- broncoespasmo - aperto no peito, pieira e falta de ar (pouco frequentes - pode afetar até 1 em 100 utilizadores).
- inchaço da face, lábios, boca, língua ou garganta, dificuldade em respirar (angioedema) (ver secção 2 "Advertências e precauções", (pouco frequentes - pode afetar até 1 em 100 utilizadores),
- reações cutâneas graves incluindo eritema multiforme (uma erupção cutânea que começa geralmente com manchas vermelhas e comichão na face, nos braços ou nas pernas), ou reação cutânea grave, urticária, vermelhidão generalizada da pele, comichão intensa, formação de bolhas, descamação e inchaço da pele, inflamação das membranas mucosas (síndrome de Stevens-Johnson) ou outras reações alérgicas (Muito raros - podem afetar até 1 em 10.000 utilizadores)
- problemas cardiovasculares (batimentos cardíacos irregulares, angina pectoris (dores no peito, mandíbula e costas, provocadas por esforço físico), ataque cardíaco) (Muito raros) (podem afetar até 1 em 10.000 utilizadores),
- fraqueza nos braços ou nas pernas, ou dificuldades em falar, o que podem ser sinais de ocorrência de um AVC (Muito raros) (podem afetar até 1 em 10.000 utilizadores),
- inflamação do pâncreas, o que pode causar dor abdominal intensa e dor nas costas, acompanhada de sensação de mal-estar (Muito raros) (podem afetar até 1 em 10.000 utilizadores)
- amarelecimento da pele e da parte branca dos olhos (icterícia), o que podem ser sinais de hepatite (Muito raros) (podem afetar até 1 em 10.000 utilizadores),
- batimentos cardíacos irregulares que põem a vida em risco (frequência desconhecida),
- doença no cérebro causada por uma doença do fígado (encefalopatia hepática) (frequência desconhecida).

Por ordem decrescente de frequência, os efeitos indesejáveis podem incluir:

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 utilizadores): reações cutâneas em indivíduos com uma predisposição para reações alérgicas e asmáticas, dores de cabeça, tonturas, vertigens, picadas e formigueiro, alterações da visão, zumbidos (sensação de barulhos nos ouvidos), tosse, falta de ar (dispneia), perturbações gastrointestinais (náuseas, vômitos, dor abdominal, alteração do paladar, dispepsia ou dificuldade de digestão, diarreia, obstipação), reações alérgicas (tais como erupções cutâneas, comichão), câibra muscular, sensação de fadiga.

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 utilizadores): alterações de humor, alterações de sono, urticária, purpura (pontos vermelhos na pele), aglomerado de bolhas, problemas renais, impotência, sudação, excesso de eosinófilos (um tipo de glóbulos brancos), alterações nos parâmetros laboratoriais: hipercaliemia, reversível após descontinuação, hiponatremia, sonolência, desmaios, palpitações (sensação de sentir o batimento do coração), taquicardia (frequência cardíaca rápida), hipoglicemia (níveis muito baixos de açúcar no sangue) no caso de doentes diabéticos, vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos), boca seca, reações de

fotossensibilidade (aumento da sensibilidade da pele ao sol), artralgia (dor nas articulações), mialgia (dor muscular), dor no peito, mal-estar, edema periférico, febre, aumento da ureia, aumento da creatinemia, queda.

Raros (podem afetar até 1 em 1000 utilizadores): agravamento da psoríase, alterações nos parâmetros laboratoriais: aumento das enzimas hepáticas, valores elevados de bilirrubina sérica, fadiga.

Muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 utilizadores): confusão, pneumonia eosinofílica (um tipo raro de pneumonia), rinite (obstipação nasal ou corrimento nasal), problemas renais graves, alterações nos parâmetros sanguíneos, tais como um número reduzido de glóbulos brancos e vermelhos, hemoglobina diminuída, número reduzido de plaquetas no sangue, níveis elevados de cálcio no sangue, função hepática alterada.

Frequência desconhecida (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis): registo anormal do ECG, alterações nos parâmetros laboratoriais: hipocaliemia, níveis elevados de ácido úrico e hiperglicemia, miopia, visão turva, insuficiência visual, diminuição da visão ou dor nos olhos devido a pressão elevada (possíveis sinais de acumulação de líquido na camada vascular do olho (efusão coroidal) ou glaucoma agudo de ângulo fechado). Se sofre de lúpus eritematoso sistémico (uma doença do colagénio), poderá piorar.

Efeitos indesejáveis associados ao Perindopril:

Frequência desconhecida: descoloração, dormência e dor nos dedos das mãos e pés (fenómeno de Raynaud).

Podem surgir alterações no sangue, nos rins, fígado ou pâncreas e nos parâmetros laboratoriais (análises ao sangue). O seu médico pode precisar de mandar fazer exames ao sangue para controlar a sua condição.

Nos casos de insuficiência hepática (problemas de fígado), há possibilidade de aparecimento de encefalopatia hepática (doença degenerativa no cérebro).

Se algum dos efeitos indesejáveis se agravar ou se detetar quaisquer efeitos indesejáveis não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Se tem os seguintes sintomas, que podem ser devidos à secreção inapropriada de ADH (hormona antidiurética) e podem ocorrer com IECAs, contacte o seu médico o mais rapidamente possível: urina concentrada (de cor escura), se se sente ou está doente, se tem espasmos musculares, se sente confusão mental e tem convulsões.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53  
1749-004 Lisboa  
Tel: +351 21 798 73 73  
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)  
E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

## 5. Como conservar Perindopril + Indapamida Generis

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não conservar acima de 30°C.

Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

## 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Perindopril + Indapamida Generis

-As substâncias ativas são perindopril tert-butilamina e indapamida. Um comprimido contém 2 mg de perindopril tert-butilamina (correspondente a 1,669 mg de perindopril) e 0,625 mg de indapamida.

-Os outros componentes são: estearato de magnésio, sílica coloidal anidra, bicarbonato de sódio, celulose microcristalina, lactose mono-hidratada.

Qual o aspeto de Perindopril + Indapamida Generis e conteúdo da embalagem

Perindopril + Indapamida Generis apresenta-se em comprimidos brancos, ovais, ligeiramente biconvexos.

Os comprimidos apresentam-se em embalagens blister PVC/PE/PVDC-Alu e OPA/Alu/PVC-Alu de 30 e 60 comprimidos.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Generis Farmacêutica, S.A.  
Rua João de Deus, 19  
2700-487 Amadora  
Portugal

Fabricante

APROVADO EM  
13-01-2022  
INFARMED

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, SA  
Av. das Indústrias – Alto do Colaride, Agualva  
2735-213 Cacém  
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em