

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Preclint, 240 mg/ml + 542 mg/ml, Solução oral
Fosfato dissódico dodeca-hidratado + Fosfato monossódico di-hidratado

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

O que contém este folheto:

1. O que é Preclint e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Preclint
3. Como tomar Preclint
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Preclint
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Preclint e para que é utilizado

Preclint foi-lhe receitado para limpeza intestinal antes de ser submetido a uma cirurgia do cólon, raio-X ou endoscopia. Nestas situações, o seu intestino deverá estar completamente limpo.

Preclint é um laxante osmótico que atua aumentando o conteúdo em água das fezes.

Este medicamento é para uso exclusivo nas situações acima referidas.

2. O que precisa de saber antes de tomar Preclint

Não tome Preclint:

- se tem alergia (hipersensibilidade) ao fosfato dissódico dodeca-hidratado, ao fosfato monossódico di-hidratado ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6)
- se está a utilizar outros laxantes contendo fosfato de sódio
- em caso de náuseas, vómitos ou dores abdominais
- se tem menos de 18 anos de idade
- se sabe ou suspeita que tem uma obstrução, perfuração ou paralisia do intestino (íleo gastrintestinal)
- se sofre de insuficiência cardíaca congestiva
- se tem uma dilatação congénita ou adquirida do intestino grosso (megacólon)
- se tem insuficiência renal
- se tem doença inflamatória do intestino ativa
- se tem ascite (acumulação de líquido no abdómen)
- se tem níveis de creatinina superiores a 1,5 – 2,0 mg/dl.

Informe o seu médico se sofre de qualquer uma das condições acima mencionadas. O seu médico decidirá se Preclint é adequado para si.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Preclint- se é idoso ou está debilitado

- se é doente cardíaco ou renal
- em caso de colostomia ou ileostomia
- se está em dieta com restrição de sal, se sofre de perturbações eletrolíticas (perturbações dos níveis de sais no organismo), ou se está em risco de sofrer estas alterações
- em caso de incapacidade de ingestão da quantidade adequada de líquidos.

Consulte o seu médico, mesmo que estas situações tenham ocorrido no passado. Poderá ter que ser vigiado com maior regularidade durante o tratamento. Preclint poderá alterar ligeiramente a frequência cardíaca como resultado dos desequilíbrios eletrolíticos, embora seja improvável que esta situação cause qualquer problema.

Após a ingestão de Preclint serão de esperar fezes líquidas e frequentes. Deve beber tantos líquidos quanto possível (ver Como tomar Preclint) para evitar a desidratação, tais como água, caldo, sumos de fruta passados sem a polpa, chá ou café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem gás.

Normalmente este medicamento funciona dentro de meia hora a 6 horas. Em caso de não ter havido evacuação após 6 horas da administração de Preclint, deve parar a sua utilização e contactar um médico imediatamente, pois pode ocorrer desidratação.

Outros medicamentos e Preclint

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

É necessária precaução se está a tomar medicamentos para o tratamento da pressão arterial alta (hipertensão) ou angina (antagonistas dos canais de cálcio), diuréticos, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), certos medicamentos para perturbações mentais (lítio), outros medicamentos que poderão afetar o equilíbrio da água e dos sais (potássio, sódio, fosfato) no seu organismo, ou medicamentos que alteram o frequência cardíaca (prolongam o intervalo QT).

A utilização de Preclint pode atrasar ou impedir a absorção de medicamentos que são tomados regularmente por via oral (por exemplo, contraceptivos orais, antiepiléticos, antidiabéticos, antibióticos).

Não deve utilizar outros medicamentos contendo fosfato de sódio enquanto toma Preclint.

Preclint com alimentos e bebidas

Ver Como tomar Preclint.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Se está grávida ou a amamentar não deve tomar Preclint.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Embora não existam efeitos diretos do Preclint sobre a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas, deverá manter-se próximo de uma casa-de-banho depois de tomar o medicamento.

Preclint contém sódio

Este medicamento contém 5,0 g de sódio (por cada frasco de 45 ml). Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio.

3. Como tomar Preclint

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

É importante que não coma alimentos sólidos durante todo o tratamento com Preclint.

Em vez de alimentos sólidos para o pequeno-almoço, almoço e jantar, deve beber água ou outros líquidos como caldo, sumos de fruta passados sem a polpa, chá ou café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem gás.

O Preclint destina-se apenas a adultos.

Deve começar a tomar Preclint no DIA ANTERIOR ao exame.

Verifique a hora do exame. Se este for antes das 12:00 horas siga as instruções sobre a posologia para "EXAMES A REALIZAR DE MANHÃ". Se for depois das 12:00 horas siga as instruções sobre a posologia para "EXAMES A REALIZAR À TARDE".

EXAMES A REALIZAR DE MANHÃ (08:00-12:00)

1. No DIA ANTERIOR AO EXAME proceda da seguinte forma:

Às 7:00 horas, isto é, à hora do pequeno-almoço, em vez do pequeno-almoço, beba pelo menos um copo cheio de líquidos tais como água, caldo, sumos de fruta passados sem a polpa, chá ou café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem gás. Pode beber mais se quiser.

Logo a seguir a este pequeno-almoço, tome a primeira dose de Preclint da seguinte forma: dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo de água fria (120 ml).

Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria (240 ml).

Se desejar pode beber mais água ou outro dos líquidos mencionados acima.

Às 13:00 horas, isto é, à hora do almoço, em vez do almoço, beba pelo menos três copos cheios de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. Pode beber mais se quiser.

Durante a tarde pode beber água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente à vontade.

Às 19:00 horas, isto é, à hora do jantar, em vez do jantar, beba pelo menos um copo cheio de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. Pode beber mais se quiser.

Logo a seguir ao jantar acima referido, tome a segunda dose de Preclint da seguinte forma: dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo de água fria (120ml). Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria (240 ml). Pode beber mais se desejar.

Até à meia-noite, sempre que sentir necessidade, pode beber mais água ou outro líquido (ver líquidos mencionados anteriormente).

2. Na MANHÃ DO EXAME não deve beber mais água nem nenhum outro líquido.

EXAMES A REALIZAR À TARDE (12:00 -17:00 horas)

1. No DIA ANTERIOR AO EXAME proceda da seguinte forma:

Às 13:00 horas, isto é, à hora do almoço, faça uma refeição ligeira, por exemplo, coma uma sopa e uma sanduíche. Depois do almoço não coma mais alimentos sólidos até à hora do exame.

Durante a tarde pode beber líquidos tais como água, caldo, sumos de fruta passados sem a polpa, chá ou café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem gás à vontade.

Às 19:00 horas, isto é, à hora do jantar, em vez do jantar, beba pelo menos um copo cheio de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. Pode beber mais se quiser.

Logo a seguir a este jantar, tome a primeira dose de Preclint da seguinte forma: dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo de água fria (120 ml). Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria (240 ml). Se desejar pode beber mais água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente.

Durante a noite, antes de se deitar, beba pelo menos três copos cheios de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente.

2. No DIA DO EXAME proceda da seguinte forma:

Às 7:00 horas, isto é, à hora do pequeno-almoço, em vez do pequeno-almoço, beba pelo menos um copo cheio de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. Pode beber mais se quiser.

Logo a seguir ao pequeno-almoço acima referido, tome a segunda dose de Preclint da seguinte forma: dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo de água fria (120 ml). Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria (240 ml).

Se desejar pode beber mais água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente.

Até às 8:00 horas, pode beber mais água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente.

Depois das 8:00 horas, não deve beber mais água nem nenhum outro líquido porque estes podem afetar o resultado do exame.

As respostas individuais aos laxantes variam. Preclint pode provocar várias evacuações. Normalmente começa a atuar em meia hora e pode continuar a atuar durante 6 horas. Mantenha-se perto de uma casa-de-banho até os sintomas pararem.

Se tomar mais Preclint do que deveria

Se tomar mais Preclint do que deveria, fale com um médico ou farmacêutico imediatamente. Pode sentir-se desidratado, ter problemas no coração e de circulação, dificuldades respiratórias, ansiedade ou dor (que podem ser cólicas).

Caso se tenha esquecido de tomar Preclint

No caso de não ser capaz de seguir as instruções acima descritas pode não ser possível proceder ao seu exame. Consulte o seu médico. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Efeitos secundários muito frequentes: náuseas, dores abdominais, distensão abdominal, diarreia, arrepios, fraqueza e tonturas.

Efeitos secundários frequentes: vômitos, dores de cabeça e dores no peito. Na colonoscopia, podem observar-se pequenos nódulos brancos rodeados por anéis vermelhos no interior do cólon (estes não são clinicamente significativos e desaparecerão sem tratamento).

Efeitos secundários pouco frequentes: desidratação.

Efeitos secundários muito raros: palpitações e arritmias cardíacas (batimentos cardíacos irregulares), enfarte do miocárdio (dor no peito), reações de hipersensibilidade (reações alérgicas), dermatite alérgica (erupção cutânea), alterações nos níveis de sais (eletrólitos) no sangue, acidose metabólica (perturbação do equilíbrio ácido-base do organismo), tetania (crises de contracturas musculares, sobretudo nas extremidades), espasmos, parestesia (sensação de formigueiro), perda de consciência e problemas nos rins.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Preclint

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após VAL.. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Preclint

- As substâncias ativas são fosfato dissódico dodeca-hidratado e fosfato monossódico di-hidratado. Cada mililitro de solução oral contém 240 mg de fosfato dissódico dodeca-hidratado e 542 mg de fosfato monossódico di-hidratado.
- Os outros componentes são: benzoato de sódio, sacarina sódica (E954), glicerol, essência de alperce e água purificada.

Qual o aspeto de Preclint e conteúdo da embalagem

Preclint é uma solução oral. Cada embalagem contém dois frascos, contendo cada um 45 ml de solução oral. Cada frasco contém uma dose.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua Manuel Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova
2700-547 Amadora
Portugal

Fabricante:

Farmalabor - Produtos Farmacêuticos, SA
Zona Industrial de Condeixa-a-Nova
3150-194 Condeixa-a-Nova
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em