

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Sentipra 5 mg comprimidos orodispersíveis  
Sentipra 10 mg comprimidos orodispersíveis  
Sentipra 15 mg comprimidos orodispersíveis  
Sentipra 20 mg comprimidos orodispersíveis  
Escitalopram

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

ConsERVE este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

O que contém este folheto:

- 1.O que é Sentipra e para que é utilizado
- 2.O que precisa de saber antes de tomar Sentipra
- 3.Como tomar Sentipra
- Efeitos secundários possíveis
- Como conservar Sentipra
- 6.Conteúdo da embalagem e outras informações

O que é Sentipra e para que é utilizado

Sentipra pertence a um grupo de antidepressores conhecidos como inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS). Estes medicamentos atuam no sistema serotoninérgico do cérebro ao aumentar o nível de serotonina. As perturbações no sistema serotoninérgico são consideradas um importante fator no desenvolvimento da depressão e das doenças relacionadas.

Sentipra contém escitalopram e é utilizado para tratar a depressão (episódios depressivos major) e perturbações de ansiedade (tais como perturbações de pânico com ou sem agorafobia, perturbação da ansiedade social, perturbação da ansiedade generalizada e perturbação obsessivo-compulsiva).

O que precisa de saber antes de tomar Sentipra

Não tome Sentipra:

se tem alergia (hipersensibilidade) ao escitalopram ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

se toma outros medicamentos que pertencem a um grupo denominado por inibidores da MAO, incluindo a selegilina (utilizada no tratamento da doença de Parkinson), a moclobemida (utilizada no tratamento da depressão) e a linezolida (um antibiótico).

Se nasceu com, ou se teve, um episódio de alteração do ritmo cardíaco (observado no ECG, um exame que serve para avaliar o funcionamento do coração)

Se toma medicamentos para problemas de ritmo cardíaco ou que possam afetar o ritmo cardíaco (ver secção 2 “Outros medicamentos e escitalopram”)

#### Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Sentipra.

Informe o seu médico se tem qualquer outra condição ou doença, uma vez que o seu médico pode precisar de ter isso em consideração. Em particular, informe o seu médico: se tem epilepsia. O tratamento com Sentipra deve ser interrompido, se ocorrerem convulsões ou se houver um aumento da frequência das convulsões (ver também secção 4, “Efeitos secundários possíveis”).

se tem problemas a nível da função hepática ou renal. O seu médico pode precisar de ajustar a sua dose.

se tem diabetes. O tratamento com Sentipra pode alterar o controlo glicémico.

se tem um nível reduzido de sódio no sangue.

se tem tendência para desenvolver facilmente hemorragias ou hematomas.

Se está a receber tratamento eletroconvulsivo.

se tem uma doença cardíaca coronária.

se tem ou teve problemas cardíacos ou teve recentemente um ataque cardíaco.

se tem um batimento cardíaco lento em repouso e/ou se sabe que tem depleção de sal em resultado de diarreia intensa e vômitos (má disposição) ou da utilização de diuréticos.

se tem um batimento cardíaco rápido ou irregular, desmaio ou tonturas ao levantar-se, o que pode ser indicativo de um funcionamento anómalo a nível de ritmo cardíaco.

Se tem problemas nos olhos, como certos tipos de glaucoma, ou antecedentes de glaucoma.

#### Nota

Alguns doentes com doença maníaco-depressiva podem entrar numa fase maníaca. Esta caracteriza-se por uma invulgar e rápida mudança de ideias, alegria inapropriada e excessiva atividade física. Se se sentir assim, contacte o seu médico.

Também podem ocorrer sintomas, tais como inquietação ou dificuldade em se sentar ou permanecer quieto, nas primeiras semanas de tratamento. Informe o seu médico imediatamente, se sentir estes sintomas.

#### Ideação suicida e agravamento da depressão ou perturbação da ansiedade

Se sofrer de depressão e/ou perturbações de ansiedade, pode ter, às vezes, pensamentos de autoagressão ou de suicídio. Pode haver um aumento destes sintomas no início do tratamento com antidepressivos, visto que estes medicamentos demoram algum tempo a atuar, normalmente cerca de duas semanas, mas, às vezes, mais tempo.

Poderá estar mais predisposto a ter estes pensamentos:

Se já tiver tido ideias de suicídio ou autoagressão anteriormente.

Se for um jovem adulto. As informações obtidas nos ensaios clínicos demonstraram um risco acrescido de comportamento suicida em adultos com menos de 25 anos e com problemas psiquiátricos, a serem tratados com um antidepressivo.

Se, em qualquer momento, tiver pensamentos de autoagressão ou suicídio, contacte o seu médico ou dirija-se a um hospital de imediato.

Poderá ser útil para si comunicar a um familiar ou a um amigo que se encontra deprimido ou que tem uma perturbação de ansiedade e dar-lhes este folheto a ler. Pode pedir-lhes para lhe dizerem se acham que a sua depressão ou ansiedade está a agravar-se, ou se estão preocupados com alterações no seu comportamento.

### Crianças e adolescentes

Sentipra não deve ser utilizado normalmente em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. Também deve ser realçado que os doentes com idade inferior a 18 anos correm um maior risco de sofrerem efeitos secundários, tais como, tentativa de suicídio, ideação suicida e hostilidade (predominantemente agressividade, comportamento de oposição e fúria), quando tomam esta classe de medicamentos. Apesar disso, o seu médico poderá prescrever Sentipra para doentes com idade inferior a 18 anos, quando decidir que isso é no melhor interesse do doente. Se o seu médico prescreveu Sentipra a um doente com menos de 18 anos e quiser discutir esta questão, volte a contactá-lo. Deve informar o seu médico, se algum dos sintomas acima mencionados se desenvolver ou piorar, quando os doentes com menos de 18 anos estiverem a tomar Sentipra. Além disso, ainda não foram demonstrados os efeitos de segurança a longo prazo de Sentipra, no que respeita ao crescimento, maturação e desenvolvimento cognitivo e comportamental neste grupo etário.

### Outros medicamentos e Sentipra

Informe o seu médico ou farmacêutico, se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:

“Inibidores não seletivos da monoamino oxidase (IMAO)” contendo fenelzina, iproniazida, isocarboxazida, nialamida e tranilcipromina como substâncias ativas. Se tomou algum destes medicamentos, terá de esperar 14 dias antes de iniciar a toma de Sentipra. Após a paragem de Sentipra, deve esperar 7 dias antes de tomar qualquer um destes medicamentos.

“Inibidores reversíveis seletivos da MAO-A” contendo moclobemida (usada para tratar a depressão).

“Inibidores irreversíveis da MAO-B” contendo selegilina (utilizada no tratamento da doença de Parkinson). Estes aumentam o risco de efeitos secundários.

O antibiótico linezolida.

Lítio (utilizado no tratamento da perturbação maníaco-depressiva) e triptofano.

Imipramina e desipramina (ambas utilizadas no tratamento da depressão).

Sumatriptano e medicamentos similares (utilizados no tratamento da enxaqueca) e tramadol (utilizado na dor intensa). Estes aumentam o risco de efeitos secundários.

Cimetidina e omeprazol (utilizados no tratamento das úlceras do estômago), fluvoxamina (antidepressivo) e ticlopidina (usada para reduzir o risco de trombose). Estes podem aumentar os níveis sanguíneos do Sentipra.

Hipericão (*Hypericum perforatum*), uma planta fitoterapêutica utilizada para a depressão. Ácido acetilsalicílico e medicamentos anti-inflamatórios não-esteróides (medicamentos utilizados para o alívio da dor ou para diluir o sangue, chamados anticoagulantes). Estes podem aumentar a tendência para as hemorragias.

Varfarina, dipiridamol e fenprocumom (medicamentos utilizados para diluir o sangue, os chamados anticoagulantes). O seu médico irá provavelmente verificar o tempo de coagulação do seu sangue, ao iniciar ou ao parar o tratamento com Sentipra, de modo a confirmar se a sua dose de anticoagulante ainda é adequada.

Mefloquina (utilizada no tratamento da malária), bupropiona (utilizada no tratamento da depressão) e tramadol (utilizado no tratamento da dor intensa) devido ao possível risco de limiar mais baixo para convulsões.

Neurolépticos (medicamentos utilizados para tratar a esquizofrenia, psicoses), devido ao possível risco de limiar mais baixo para convulsões, e antidepressivos.

Flecainida, propafenona e metoprolol (utilizados em doenças cardiovasculares), clomipramina e nortriptilina (antidepressivos) e risperidona, tioridazina e haloperidol (antipsicóticos). A dose de Sentipra pode necessitar de ser ajustada.

Medicamentos que reduzem os níveis de potássio ou magnésio no sangue, uma vez que estas condições aumentam o risco de uma perturbação do ritmo cardíaco que pode pôr a vida em perigo.

Não tome Sentipra, se tomar medicamentos para problemas de ritmo cardíaco ou medicamentos que possam afetar o ritmo cardíaco, como antiarrítmicos de Classe IA e III, antipsicóticos (como por exemplo, derivados da fenotiazina, pimozida, haloperidol), antidepressivos tricíclicos, certos agentes antimicrobianos (como por exemplo, esparfloxacina, moxifloxacina, eritromicina IV, pentamidina, tratamento antimalárico, particularmente a halofantrina) e certos anti-histamínicos (astemizol, mizolastina). Se tiver dúvidas, aconselhe-se com o seu médico.

Sentipra com alimentos, bebidas e álcool

Sentipra pode ser tomado com ou sem alimentos (ver secção 3, “Como Tomar Sentipra”).

Tal como acontece com muitos medicamentos, associar Sentipra a álcool não é aconselhável, apesar de não se esperar uma interação de Sentipra com o álcool.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. Não tome Sentipra se

estiver grávida ou a amamentar, a não ser que tenha discutido os riscos e benefícios envolvidos com o seu médico.

Se tomou Sentipra nos últimos 3 meses de gravidez, deve ter em atenção que podem ocorrer os seguintes efeitos no seu bebé recém-nascido: dificuldade em respirar, pele azulada, convulsões, alterações da temperatura corporal, dificuldade de alimentação, vômitos, baixo nível de açúcar no sangue, músculos rígidos ou flácidos, reflexos intensos, tremores, agitação, irritabilidade, letargia, choro constante, sonolência e dificuldades em dormir. Se o seu bebé recém-nascido apresentar algum destes sintomas, contacte o seu médico de imediato.

Se utilizado durante a gravidez, Sentipra nunca deverá ser parado abruptamente.

Certifique-se de que a sua parteira e/ou médico sabe de que está a tomar Sentipra. Quando tomados durante a gravidez, em particular nos últimos 3 meses, medicamentos como Sentipra podem aumentar o risco de um problema grave nos bebés chamado hipertensão pulmonar persistente no recém-nascido (HPPR), o que provoca uma respiração mais acelerada e um tom de pele azulado no bebé. Estes sintomas começam a manifestar-se normalmente nas primeiras 24 horas de vida do bebé. Se isto acontecer ao seu bebé, deve contactar a sua parteira e/ou médico de imediato.

O citalopram, uma substância idêntica ao escitalopram, demonstrou reduzir a qualidade do esperma nos estudos realizados em animais. Teoricamente, isto pode afetar a fertilidade, mas, até ao momento, ainda não foi observado impacto sobre a fertilidade humana.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

É aconselhável não conduzir nem utilizar máquinas até saber qual o efeito de Sentipra sobre si.

Sentipra também contém lactose.

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

#### Como tomar Sentipra

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Sentipra comprimidos orodispersíveis são tomados todos os dias, como uma única dose diária. Pode tomar Sentipra com ou sem alimentos.

Sentipra comprimidos orodispersíveis partem-se facilmente, pelo que os comprimidos devem ser manuseados com cuidado. Não mexa nos comprimidos com as mãos molhadas porque estes podem desfazer-se.

1. Segure no blister pelas extremidades e separe um compartimento do blister dos restantes, retirando-o suavemente pelas perfurações.
2. Retire cuidadosamente a película.
3. Coloque o comprimido na sua língua. O comprimido desintegrar-se-á rapidamente e poderá ser engolido sem água.

### Adultos

#### *Depressão*

A dose recomendada normalmente de Sentipra é de 10 mg, numa toma única diária. A dose pode ser aumentada pelo seu médico até um máximo de 20 mg por dia.

#### *Perturbações de pânico*

A dose inicial de Sentipra é de 5 mg como uma dose diária única na primeira semana antes de aumentar a dose para 10 mg por dia. A dose pode ser aumentada ainda mais pelo seu médico até um máximo de 20 mg por dia.

#### *Perturbação da ansiedade social*

A dose recomendada normalmente de Sentipra é de 10 mg, numa toma única diária. O seu médico pode diminuir a sua dose para 5 mg por dia ou aumentá-la para um máximo de 20 mg por dia, dependendo da sua resposta ao medicamento.

#### *Perturbação da ansiedade generalizada*

A dose recomendada normalmente de Sentipra é de 10 mg, numa toma única diária. A dose pode ser aumentada pelo seu médico até um máximo de 20 mg por dia.

#### *Perturbação obsessivo-compulsiva*

A dose recomendada normalmente de Sentipra é de 10 mg, numa toma única diária. A dose pode ser aumentada pelo seu médico até um máximo de 20 mg por dia.

#### *Doentes idosos (com mais de 65 anos de idade)*

A dose inicial recomendada de Sentipra é de 5 mg, numa toma única diária. A dose pode ser aumentada pelo seu médico até 10 mg por dia.

#### Utilização em crianças e adolescentes

Sentipra não deve administrado normalmente a crianças e adolescentes. Para mais informações, consulte a secção 2 “O que precisa de saber antes de tomar Sentipra”.

#### Duração do tratamento

Pode demorar duas semanas até começar a sentir-se melhor. Continue a tomar Sentipra mesmo que demore algum tempo a sentir uma melhoria do seu estado.

Não altere a dose da sua medicação sem falar primeiro com o seu médico.

Continue a tomar Sentipra enquanto o seu médico recomendar. Se parar o tratamento cedo demais, os sintomas podem voltar. É recomendado que o tratamento seja prolongado, pelo menos por 6 meses depois de voltar a sentir-se bem.

Se tomar mais Sentipra do que deveria

Se tomou mais do que a dose prescrita de Sentipra, contacte o seu médico ou a Urgência do hospital mais próximo de imediato. Faça-o mesmo se não houver sinais de desconforto. Alguns dos sinais de sobredosagem podem ser tonturas, tremor, agitação, convulsões, coma, náuseas, vômitos, alteração do ritmo do coração, diminuição da tensão arterial e alteração no equilíbrio de fluido/sais do corpo. Leve a embalagem de Sentipra quando for ao médico ou ao hospital.

Caso se tenha esquecido de tomar Sentipra

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Se se esquecer de tomar uma dose e se se lembrar antes de se deitar, tome-a de imediato. Continue a tomar a medicação como habitualmente no dia seguinte. Se só se lembrar durante a noite ou no dia seguinte, ignore a dose esquecida e continue a tomar a medicação como habitualmente.

Se parar de tomar Sentipra

Não pare de tomar Sentipra até o seu médico lhe dar indicação. Depois de acabar o tratamento, é geralmente recomendado que a dose de Sentipra seja gradualmente reduzida ao longo de algumas semanas.

Quando parar de tomar Sentipra, especialmente se for de repente, pode sentir sintomas de descontinuação. Estes são frequentes quando o tratamento com Sentipra é interrompido. O risco é mais elevado quando Sentipra tiver sido usado durante um longo período de tempo ou em doses elevadas, ou quando a dose é reduzida de forma demasiado rápida. A maioria das pessoas considera que os sintomas são ligeiros e que desaparecem por si em duas semanas. No entanto, em certos doentes, estes sintomas podem ser mais intensos ou prolongar-se (2-3 meses ou mais). Se tiver sintomas de descontinuação graves, quando parar de tomar Sentipra, contacte o seu médico. O seu médico pode pedir-lhe para voltar a tomar os comprimidos e deixar de tomá-los de forma mais lenta.

Os sintomas de descontinuação incluem: sensação de tonturas (instabilidade ou desequilíbrio), picadas e formigueiro, sensações de ardor e (menos frequentemente) sensação de choques elétricos, incluindo na cabeça, perturbações do sono (sonhos intensos, pesadelos, incapacidade de dormir), ansiedade, dores de cabeça, mal-estar (náuseas), suores (incluindo suores noturnos), inquietude ou agitação, tremores (movimentos involuntários), confusão ou desorientação, emotividade ou irritabilidade, diarreia (fezes soltas), perturbações visuais, batimento cardíaco agitado ou forte (palpitações).

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Os efeitos secundários desaparecem normalmente após algumas semanas de tratamento. Tenha em atenção que muitos dos efeitos também podem ser sintomas da sua doença e, por conseguinte, melhorarão quando começar a sentir-se melhor.

Consulte o médico se surgir algum dos seguintes efeitos secundários durante o tratamento:

Pouco frequentes (afetam 1 a 10 pessoas em 1.000):

Hemorragias involgares, incluindo hemorragias gastrointestinais

Raros (afetam 1 a 10 pessoas em 10.000):

Se sentir inchaço da pele, língua, lábios ou rosto, ou se tiver dificuldades em respirar ou engolir (reação alérgica), contacte o seu médico ou dirija-se ao hospital de imediato.

Se tiver febre alta, agitação, confusão, tremores e contrações abruptas dos músculos, podem ser sinais de uma situação rara denominada por síndrome da serotonina. Se se sentir assim, contacte o seu médico.

Se sentir os seguintes efeitos secundários, deve contactar o seu médico ou dirigir-se ao hospital de imediato:

Dificuldade em urinar

Convulsões (ataques); ver também secção “Advertências e precauções”

O amarelecimento da pele e da parte branca dos olhos são sinais de problemas na função hepática/hepatite

Ritmo cardíaco irregular e rápido e desmaio podem ser sintomas de uma situação que põe em risco a vida, conhecida por *Torsade de Pointes*

Além dos efeitos secundários acima mencionados, têm sido comunicados:

Muito frequentes (afetam mais de 1 pessoa em 10):

Sensação de mal-estar (náuseas)

Cefaleia

Frequentes (afetam 1 a 10 pessoas em 100):

Nariz entupido ou com corrimento (sinusite)

Perda ou aumento do apetite

Ansiedade, inquietação, sonhos anómalos, dificuldade em adormecer, sonolência, tonturas, bocejos, tremores, sensação de formigueiro na pele

Diarreia, prisão de ventre, vômitos, boca seca

Aumento da sudorese

Dor nos músculos e nas articulações (artralgia e mialgia)

Perturbações sexuais (atraso na ejaculação, problemas com a ereção, apetite sexual diminuído e as mulheres podem ter dificuldade em atingir o orgasmo)

Fatiga, febre

Aumento de peso

Pouco frequentes (afetam 1 a 10 pessoas em 1.000):

Urticária, erupção cutânea, comichão (prurido)

Ranger os dentes, agitação, nervosismo, ataques de pânico, estado de confusão

Perturbação do sono, alteração do paladar, desmaio (síncope)

Pupilas aumentadas (midríase), perturbação da visão, zumbido nos ouvidos (acúfeno)

Queda de cabelo

Hemorragia vaginal

Aumento de peso

Batimento cardíaco acelerado

Inchaço de braços ou pernas

Hemorragias nasais

Raros (afetam 1 a 10 pessoas em 10.000):

Agressão, despersonalização, alucinações

Batimento cardíaco lento

Alguns doentes notificaram (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

Pensamentos de autoagressão ou de suicídio (ver também secção 2 “Advertências e precauções”)

Níveis reduzidos de sódio no sangue (os sintomas são indisposição e mal-estar com fraqueza muscular ou confusão)

Tonturas ao levantar-se, devido a tensão arterial baixa (hipotensão ortostática)

Teste da função hepática anómalo (níveis aumentados de enzimas hepáticas no sangue)

Perturbações do movimento (movimentos involuntários dos músculos)

Ereções dolorosas (priapismo)

Perturbações hemorrágicas, incluindo hemorragias da pele e mucosas (equimoses) e baixo nível de plaquetas (trombocitopenia)

Inchaço súbito da pele e mucosas (angioedemas)

Aumento da quantidade de urina eliminada (secreção da ADH inadequada)

Produção de leite nas mulheres que não estão a amamentar

Mania

Foi observado um risco acrescido de fraturas ósseas em doentes tratados com este tipo de medicamentos.

Alteração do ritmo cardíaco (o chamado “prolongamento do intervalo QT”, observado no ECG, atividade elétrica do coração).

Adicionalmente, alguns efeitos secundários são conhecidos por ocorrerem com medicamentos que atuam de forma semelhante ao escitalopram (a substância ativa de Sentipra). Estes são:

Inquietação motora (acatisia)  
Anorexia

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 5. Como conservar Sentipra

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blister após “VAL”.

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Este medicamento não requer quaisquer condições especiais de temperatura de armazenamento. Conservar na embalagem original para proteger da humidade e da luz.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

#### 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Sentipra

A substância ativa é escitalopram.

Sentipra 5 mg: Cada comprimido orodispersível contém 5 mg de escitalopram, equivalente a 6,3875 mg de oxalato de escitalopram, ou

Sentipra 10 mg: Cada comprimido orodispersível contém 10 mg de escitalopram, equivalente a 12,775 mg de oxalato de escitalopram, ou

Sentipra 15 mg: Cada comprimido orodispersível contém 15 mg de escitalopram, equivalente a 19,1625 mg de oxalato de escitalopram, ou

Sentipra 20 mg: Cada comprimido orodispersível contém 10 mg de escitalopram, equivalente a 25,55 mg de oxalato de escitalopram.

Os outros componentes são: celulose microcristalina, lactose mono-hidratada, croscarmelose de sódio, polacrilina potássica, acessulfamo potássico, neo-hesperidina di-hidrocalcona, estearato de magnésio, aroma de hortelã-pimenta [contendo maltodextrina (amido), amido modificado E1450 (amido ceroso) e óleo de hortelã-pimenta (*mentha arvensis*)], ácido clorídrico concentrado (para ajuste do pH).

Qual o aspeto de Sentipra e conteúdo da embalagem

Sentipra 5 mg: comprimidos brancos a esbranquiçados, redondos, lisos, com os rebordos biselados, 7 mm de diâmetro e a impressão de "5" numa das faces

Sentipra 10 mg: comprimidos brancos a esbranquiçados, redondos, lisos, com os rebordos biselados, 9 mm de diâmetro e a impressão de "10" numa das faces

Sentipra 15 mg: comprimidos brancos a esbranquiçados, redondos, lisos, com os rebordos biselados, 11 mm de diâmetro e a impressão de "15" numa das faces

Sentipra 20 mg: comprimidos brancos a esbranquiçados, redondos, lisos, com os rebordos biselados, 12 mm de diâmetro e a impressão de "20" numa das faces

Blisters em embalagens de:

28 comprimidos orodispersíveis

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante:

SC Neola Pharma SRL

Str. Biharia. 67-77, body building F, sector 1, 013981, Bucareste

Romênia

Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico Europeu (EEE) sob as seguintes denominações:

Portugal Sentipra 5 mg comprimidos orodispersíveis

Sentipra 10 mg comprimidos orodispersíveis

Sentipra 15 mg comprimidos orodispersíveis

Sentipra 20 mg comprimidos orodispersíveis

Roménia Sentipra 5 mg comprimato orodispersabile

Sentipra 10 mg comprimato orodispersabile

Sentipra 15 mg comprimato orodispersabile

Sentipra 20 mg comprimato orodispersabile

Este folheto foi revisto pela última vez em: