

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Strepsils Limão Sem Açúcar 1,2 mg + 0,6 mg Pastilhas

Álcool diclorobenzílico + Amilmetacresol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

- 1.O que é Strepsils Limão Sem Açúcar e para que é utilizado
- 2.O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Limão Sem Açúcar
- 3.Como tomar Strepsils Limão Sem Açúcar
- 4.Efeitos secundários possíveis
- 5.Como conservar Strepsils Limão Sem Açúcar
- 6.Conteúdo da embalagem e outras informações

#### 1. O que é Strepsils Limão Sem Açúcar e para que é utilizado

Strepsils Limão Sem Açúcar apresenta-se na forma de pastilhas.

Strepsils Limão Sem Açúcar está indicado no tratamento sintomático da inflamação da boca e infeções da garganta, incluindo dor de garganta.

Strepsils pastilhas contém álcool diclorobenzílico e amilmetacresol que, pela sua ação desinfetante, aliviam os problemas da garganta e da boca, tendo uma ação calmante e suavizante da garganta irritada.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

#### 2. O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Limão Sem Açúcar

Não tome Strepsils Limão Sem Açúcar:

- se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- em crianças com menos de 6 anos, devido ao risco de asfixia.

Advertências e precauções

- se está grávida ou a amamentar.

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Strepsils Limão Sem Açúcar.

Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 3 dias consulte o seu médico ou farmacêutico.

Outros medicamentos e Strepsils Limão Sem Açúcar

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não há conhecimento de interações medicamentosas.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não existem dados ou existem dados limitados relativamente à utilização de amilmetacresol e álcool diclorobenzílico na gravidez.

Como com todos os medicamentos, devem ser tomadas precauções na toma do medicamento durante a gravidez.

Desconhece-se se as substâncias ativas e seus metabolitos são excretados no leite materno, pelo que não pode ser excluído o risco para os lactentes.

Não estão disponíveis dados relativamente aos efeitos na fertilidade.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Strepsils Limão Sem Açúcar contém Isomaltitol (E953) e Maltitol Líquido

Este medicamento contém isomaltitol (E953) e maltitol líquido. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Este medicamento contém isomaltitol (E953) e maltitol líquido. Pode ter efeito laxante moderado. O valor calórico do maltitol (isomaltitol) é de 2,3 kcal/g.

Este medicamento contém sódio. Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por pastilha ou seja, é praticamente "isento de sódio".

### 3. Como tomar Strepsils Limão Sem Açúcar

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é:

Adultos e crianças com mais de 6 anos de idade: dissolver 1 (uma) pastilha lentamente na boca cada 2 ou 3 horas conforme o necessário. Não tomar mais de 12 pastilhas num período de 24 horas.

Idosos: não é necessário redução da dose em idosos.

Crianças com menos de 6 anos de idade: não se recomenda a utilização em crianças com menos de 6 anos de idade.

Recomenda-se a toma deste medicamento por um período máximo de 3 dias.

Caso se tenha esquecido de tomar Strepisils Limão Sem Açúcar  
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Poderão ocorrer ocasionalmente reações de hipersensibilidade, dor abdominal, náuseas, desconforto oral (sensação de ardor ou formigueiro na boca ou garganta e inchaço da boca ou garganta), erupção (rash).

#### Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P, através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

#### INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do medicamento: 800222444 (gratuita)

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt).

#### 5. Como conservar Strepisils Limão Sem Açúcar

Não conservar acima de 25°C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

#### 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Strepsils Limão Sem Açúcar

- As substâncias ativas são: álcool diclorobenzílico e amilmetacresol. Cada pastilha contém 1,2 mg de álcool diclorobenzílico e 0,6 mg de amilmetacresol.
- Os outros componentes são: sacarina sódica (E954), ácido tartárico, maltitol líquido, isomaltitol (E953) e aroma de limão.

Qual o aspeto de Strepsils Limão Sem Açúcar e conteúdo da embalagem

Strepsils Limão Sem Açúcar apresenta-se na forma de pastilha redonda de cor branca a amarelada, com um sabor característico a limão, acondicionada em blister de PVC-PVDC/Alumínio.

Embalagens com 8, 12, 16, 24 e 36 pastilhas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.  
Rua D. Cristóvão da Gama nº 1 – 1ºC/D  
1400-113 Lisboa

Fabricante

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited  
1, Thane Road  
NG90 2DB Nottingham  
Reino Unido

Este folheto foi revisto pela última vez em