APROVADO EM 29-08-2005 INFARMED

FOLHETO INFORMATIVO

Supositórios de Glicerina lactente, 686 mg Glicerina

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar os Supositórios de Glicerina Lactente com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 8 dias, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é **Supositórios de Glicerina lactente** e para que é utilizado
2. Antes de utilizar **Supositórios de Glicerina lactente**
3. Como utilizar **Supositórios de Glicerina lactente**
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar **Supositórios de Glicerina lactente**
6. Outras informações

1. O QUE É SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA LACTENTE E PARA QUE É UTILIZADO

Este medicamento pertence ao grupo farmacoterapêutico dos laxantes de contacto.

A sua utilização está indicada na obstipação (prisão de ventre).

2. ANTES DE UTILIZAR SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA LACTENTE

As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais do que duas semanas, devem ser avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes. Se ocorrer hemorragia rectal ou ausência de dejectão após a utilização do laxante deverá consultar o médico.

Não utilize os Supositórios de Glicerina Lactente:

- se tem alergia (hipersensibilidade) à glicerina ou a qualquer outro componente dos Supositórios de Glicerina Lactente.
- em caso de náuseas, vómitos e de dor abdominal.

Utilizar os Supositórios de Glicerina Lactente com outros medicamentos

APROVADO EM 29-08-2005 INFARMED

Não se conhecem interações, no entanto, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não aplicável.

3. COMO UTILIZAR OS SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA LACTENTE

Via Rectal.

No grupo etário dos lactentes (3 meses a 1 ano) a posologia é de 1 Supositório de Glicerina Lactente, doses superiores só com aconselhamento médico.

Neste grupo etário não deverá ser utilizado mais do que 3 dias sem aconselhamento médico.

Em caso de ingestão accidental de supositório de glicerina aconselha-se que seja provocada a emese e/ ou lavagem gástrica, considerando também o tratamento sintomático uma vez que a ingestão de glicerina provoca cefaleias, distúrbios ao nível do estômago e diarreia.

Se utilizar mais Supositórios de Glicerina Lactente do que deveria

Não foram observados casos de sobredosagem.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS

Como os demais medicamentos, os Supositórios de Glicerina Lactente pode causar efeitos secundários em algumas pessoas.

Foram descritos alguns sinais e sintomas, que regredem com a suspensão da utilização, nomeadamente, desconforto rectal, irritação, sensação de queimadura, cólica e tenesmo.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR OS SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA LACTENTE

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize os Supositórios de Glicerina Lactente após o prazo de validade impresso na embalagem exterior.

APROVADO EM 29-08-2005 INFARMED

Não conservar acima de 25°C.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Supositórios de Glicerina Lactente

- A substância activa é a glicerina.
- Os outros componentes são a gelatina e a água destilada.

Qual o aspecto de Supositórios de Glicerina Lactente e conteúdo da embalagem

Os Supositórios de Glicerina Lactente apresentam-se em embalagens de 12 unidades acondicionados em fita termossoldada.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Laboratórios BASI, Indústria Farmacêutica S.A.
Rua do Padrão, 98
3000-312 Coimbra
Tel. +351 239 827 021
Fax. +351 239 492 845
e-mail : basi@basi.pt

Este folheto foi aprovado pela última vez em