

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Tegretol 200 mg comprimidos  
Tegretol 400 mg comprimidos  
Tegretol CR 200 mg comprimidos de libertação prolongada  
Tegretol CR 400 mg comprimidos de libertação prolongada  
Tegretol 20 mg/ml suspensão oral

Carbamazepina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais da doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Tegretol e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Tegretol
3. Como tomar Tegretol
4. Efeitos indesejáveis
5. Como conservar Tegretol
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O que é Tegretol e para que é utilizado

Tegretol pertence a um grupo de medicamentos denominados antiepiléticos (medicamentos para crises convulsivas). Devido ao seu modo de ação, pode também ser utilizado noutras doenças.

Tegretol é utilizado no tratamento de determinados tipos de crises convulsivas (epilepsia). Tegretol é também utilizado no tratamento de algumas doenças neurológicas (tais como uma situação dolorosa da face chamada nevralgia do trigémeo), assim como de certas situações psiquiátricas (tais como uma situação caracterizada por episódios de mania nas perturbações de humor bipolares e um certo tipo de depressão). Não deve ser utilizado em dores comuns.

A epilepsia é uma perturbação que se caracteriza por duas ou mais crises convulsivas (ataques). As crises convulsivas ocorrem quando as informações do cérebro para os músculos não se processam devidamente através das vias nervosas do organismo. Tegretol ajuda a controlar o processamento dessas informações. Tegretol também regula as funções dos nervos nas outras doenças acima mencionadas.

Tegretol está igualmente indicado na síndrome da abstinência alcoólica, na neuropatia diabética dolorosa e na diabetes insípida central.

### 2. O que precisa de saber antes de tomar Tegretol





utilização de qualquer produto que contenha *Hypericum perforatum*. Pode haver um aumento dos níveis séricos de anticonvulsivante após a suspensão do *Hypericum perforatum*, pelo que a dose de anticonvulsivante pode necessitar de ser ajustada.

O efeito de indução enzimática do *Hypericum perforatum* pode persistir pelo menos durante duas semanas após a suspensão da sua utilização.

Contracetivos hormonais, como, por exemplo, comprimidos, pensos, injeções ou implantes Tegretol pode afetar a forma como os contracetivos hormonais funcionam e torná-los menos eficazes na prevenção da gravidez. Fale com o seu médico, que discutirá consigo o tipo de contraceção mais adequado a utilizar enquanto estiver a tomar Tegretol.

Outros medicamentos para a epilepsia

Progabida, ácido valproico, valnoctamida, valpromida, primidona, brivaracetam.

Tegretol com alimentos e bebidas

Não consuma bebidas alcoólicas enquanto estiver a tomar Tegretol.

Não deve tomar sumo de toranja ou comer toranjas, uma vez que tal poderá aumentar o efeito de Tegretol. Outros sumos, tais como o sumo de laranja ou o sumo de maçã, não têm este efeito.

Tegretol em crianças e idosos

Tegretol pode ser usado com segurança nas crianças e nos doentes idosos, de acordo com as instruções do médico. Se necessário, o médico fornecerá qualquer informação especial, tal como sobre os cuidados a ter na posologia e a observação cuidadosa necessária (ver também secção 3 e 4).

Gravidez, amamentação e fertilidade

Gravidez

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Tegretol pode causar malformações congénitas graves. Se tomar Tegretol durante a gravidez, o seu bebé tem até 3 vezes mais o risco de ter uma malformação congénita do que as mulheres que não tomam medicação antiepilética. Foram relatadas malformações congénitas graves, incluindo defeitos do tubo neural (abertura na coluna vertebral), malformações da face, tais como fenda do lábio superior e palatina, malformação congénita craniofacial, defeitos cardíacos, malformação congénita do pénis envolvendo a abertura urinária (hipospadia) e malformações dos dedos. O seu nascituro deve ser cuidadosamente monitorizado se tiver tomado Tegretol durante a gravidez.

Foram notificados problemas de desenvolvimento neurológico (desenvolvimento do cérebro) em bebés nascidos de mães que utilizaram Tegretol durante a gravidez. Alguns estudos mostraram que a carbamazepina afeta negativamente o desenvolvimento neurológico de crianças expostas à carbamazepina no útero, enquanto outros estudos não encontraram tal efeito. A possibilidade de um efeito no desenvolvimento neurológico não pode ser descartada.















Tegretol 400 mg comprimidos  
Embalagens de 60 comprimidos contendo 400 mg de carbamazepina.

Tegretol CR 200 mg comprimidos de libertação prolongada  
Embalagens de 20 e 60 comprimidos de libertação prolongada (comprimidos revestidos divisíveis) contendo 200 mg de carbamazepina.

Tegretol CR 400 mg comprimidos de libertação prolongada  
Embalagens de 60 comprimidos de libertação prolongada (comprimidos revestidos divisíveis) contendo 400 mg de carbamazepina.

Tegretol 20 mg/ml suspensão oral  
Frasco de vidro contendo 150 ml ou 200 ml de suspensão oral; cada 5 ml (1 colher medida cheia) de suspensão oral contém 100 mg de carbamazepina.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular de Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.  
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E  
Taguspark  
2740-255 Porto Salvo  
Portugal

Fabricantes

Tegretol 200 mg comprimidos  
Tegretol 400 mg comprimidos  
Tegretol CR 200 mg comprimidos de libertação prolongada  
Tegretol CR 400 mg comprimidos de libertação prolongada

Novartis Farma, S.p.A.  
Via Provinciale Schito, 131  
80058 Torre Annunziata, Napoli  
Itália

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.  
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10 E  
Taguspark  
2740-255 Porto Salvo  
Portugal

Novartis Farmacéutica SA  
Gran Via de les Corts Catalanes, 764  
08013 Barcelona  
Espanha

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8 - 10  
90429 Nuremberga  
Alemanha

Tegretol 20 mg/ml suspensão oral

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.  
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 10 E  
Taguspark  
2740-255 Porto Salvo  
Portugal

Novartis Farmacéutica SA  
Gran Via de les Corts Catalanes, 764  
08013 Barcelona  
Espanha

Novartis Pharma GmbH  
Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8 - 10  
90429 Nuremberga  
Alemanha

Este folheto foi revisto pela última vez em