

FOLHETO INFORMATIVO

Terbinafina Gp 250 mg Comprimidos

Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento. Conserve este folheto Informativo. Pode ter necessidade de o ler novamente. Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Este medicamento foi receitado para si e não deve dá-lo a outros. Pode ser-lhes prejudicial, mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

Neste folheto:

- 1-O que é a **TERBINAFINA GP** e para que se utiliza.
- 2-Antes de tomar **TERBINAFINA GP**.
- 3-Como tomar **TERBINAFINA GP**.
- 4-Efeitos secundários possíveis.
- 5-Conservação de **TERBINAFINA GP**.

A substância activa deste medicamento é o cloridrato de terbinafina.

Cada comprimido contém o equivalente a 250 mg de terbinafina. Os restantes componentes são: celulose microcristalina, hipromelose, carboximetilamido sódico, sílica coloidal anidra, talco, estearato de magnésio.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

gp, genéricos portugueses, Lda
Rua Alexandre Herculano, Edifício IV, nº 3, 3º C
2795-240 LINDA-A-VELHA

1- O QUE É A TERBINAFINA GP E PARA QUE SE UTILIZA

Forma farmacêutica e conteúdo; grupo farmacoterapêutico

A **TERBINAFINA GP** apresenta-se na forma de comprimidos em embalagens de 14 e 28 comprimidos.

A terbinafina é uma substância que pertence ao grupo das alilaminas que possui um largo espectro de actividade contra agentes fúngicos causadores de doenças da pele e unhas.

Classificação Farmacoterapêutica

1.2 Medicamentos antifúngicos

Indicações terapêuticas

A terbinafina é um antifúngico utilizado para combater onicomicoses (infecções

causadas por fungos nas unhas) e infecções fúngicas da pele.

2- ANTES DE TOMAR TERBINAFINA GP

Não tome TERBINAFINA GP

- se tem hipersensibilidade (alergia) à terbinafina ou a qualquer outro excipiente deste medicamento.

Tome especial cuidado com TERBINAFINA GP

- se tem uma doença hepática crónica ou activa;
- se tem insuficiência renal, o seu médico poderá reduzir-lhe a dose a utilizar.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Não tome este medicamento se estiver grávida, a não ser por indicação expressa do seu médico.

Comunique imediatamente o seu médico se engravidar durante o tratamento.

Não deve tomar este medicamento se estiver a amamentar.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não se conhecem efeitos da terbinafina sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

Tomar TERBINAFINA GP com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

Tome especial cuidado se estiver a tomar os seguintes medicamentos:

- ciclosporina (citostático);
- terfenadina (antialérgico);
- triazolam (ansiolítico);
- tolbutamida;
- contraceptivos orais;
- antidepressivos;
- bloqueadores- β .

3- COMO TOMAR TERBINAFINA GP

Tome sempre *TEREBINAFINA GP* de acordo com as indicações do seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A *TERBINAFINA GP* foi-lhe prescrita apenas para a sua situação actual. Não utilize este medicamento para outros problemas.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a sensação de que a *TERBINAFINA GP* é demasiado forte ou demasiado fraca.

A dose diária normal em adultos é de 250 mg.

As crianças não devem tomar terbinafina.

Duração do tratamento

A duração do tratamento varia de acordo com a indicação e a gravidade da infecção.

O seu médico indicar-lhe-á a duração do seu tratamento com *TERBINAFINA GP*.

Em algumas infecções o tratamento pode durar até 3 meses.

Não suspenda o tratamento antes do indicado pelo seu médico, uma vez que o tratamento poderá não ser eficaz.

Se tomar mais TERBINAFINA GP do que deveria

Suspenda a utilização do medicamento e consulte imediatamente seu médico ou seu farmacêutico.

Os sintomas de sobredosagem incluem: cefaleias, náuseas, dor epigástrica e tonturas.

Caso se tenha esquecido de tomar TERBINAFINA GP

Tente tomar diariamente o medicamento conforme indicado pelo seu médico. No entanto, se se esqueceu de tomar uma dose, deverá tomá-la assim que se lembrar.

Contudo, se faltar pouco tempo para a próxima toma, não tome a dose esquecida. Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

4- EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como os demais medicamentos, a *TERBINAFINA GP* poderá ter efeitos secundários.

Em geral a terbinafina comprimidos é bem tolerada. Os efeitos secundários são geralmente de grau ligeiro ou moderado e transitórios. Os mais frequentes são sintomas gastrointestinais (enfartamento, perda de apetite, dispepsia, náuseas, dor abdominal ligeira, diarreia), reacções cutâneas não graves (rash, urticária), reacções músculo-esqueléticas (dores musculares e das articulações).

Menos frequentemente foram relatados distúrbios do paladar, incluindo perda do paladar, os quais geralmente regridem várias semanas após a interrupção do

tratamento.

Raramente foram reportadas alterações hematológicas (diminuição das células sanguíneas) e reacções cutâneas graves.

Se ocorrer rash cutâneo progressivo deve interromper o tratamento com terbinafina e consultar o seu médico.

Se durante o tratamento com terbinafina apresentar sintomas persistentes e não explicados de náuseas, anorexia, fadiga, vômitos, dor abdominal superior e direita ou icterícia, urina escura ou fezes descoloradas, consulte imediatamente o seu médico.

Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5- CONSERVAÇÃO DE TERBINAFINA GP

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25º C Conservar ao abrigo da luz.

Não tome *TERBINAFINA GP* após o final do prazo de validade indicado na caixa.

Este folheto informativo foi elaborado em