

Folheto informativo: Informação para o utilizador

TONICÊ 10 mg/ml + 20 mg/ml + 30 mg/ml Solução oral

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Tônico Solução oral e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Tônico Solução oral
3. Como tomar Tônico Solução oral
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Tônico Solução oral
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Tônico Solução oral e para que é utilizado

TONICÊ é o nome de um preparado farmacêutico cuja ação principal é a estimulação psíquica e a normal integração das atividades psíquicas e físicas.

Situações de défice intelectual relacionadas com o stress em períodos de trabalho excessivo; estados de insuficiência cerebro-vascular crónica e de involução senil e pré-senil.

2. O que precisa de saber antes de tomar Tonicê Solução Oral

Não tome Tonicê Solução Oral

- se tem alergia à (ao) {substância(s) ativa(s)} ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

- se tem insuficiência renal grave, insuficiência respiratória grave, bloqueio cardíaco auriculo-ventricular ou intraventricular.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Tonicê Solução Oral

Em caso de insónia após a administração, recomenda-se a antecipação ou deve-se evitar a toma da noite.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico o farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Devido à inexistência de estudos controlados que permitam estabelecer a segurança da utilização de Tonicê durante a gravidez e lactação, não se recomenda a sua utilização naquelas circunstância. A administração de TONICÊ em doentes com litíase renal, só deverá ser feita sob estrita indicação médica.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não estão descritas alterações sobre a capacidade de condução de veículos e a utilização de máquinas.

Tonicê Solução Oral contém sacarose

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Contém parabenos.

Tonicê Solução Oral contém sorbitol

Este medicamento contém 1,750 mg de sorbitol em cada ampola.

Tonicê Solução Oral contém etanol

Este medicamento contém 1,599 mg de álcool (etanol) em cada ampola.

A pequena quantidade de álcool neste medicamento não terá quaisquer efeitos perceptíveis.

Tonicê Solução Oral contém sódio

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por ampola ou seja, e praticamente "isento de sódio"

3. Como tomar Tonicê Solução Oral

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Em média recomenda-se uma posologia de 2 a 3 ampolas bebíveis por dia. Podendo, no entanto, esta posologia ser alterada segundo indicação médica.

Diluir o conteúdo da ampola num pouco de água.

A administração é feita exclusivamente por via oral.

Se tomar mais Tonicê Solução Oral do que deveria

Não estão relatados casos de sobredosagem e/ou intoxicação com TONICÊ.

Caso se tenha esquecido de tomar Tonicê Solução Oral
Reiniciar o tratamento da forma habitual.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Foram registados alguns casos raros, de agitação e epilepsia em doentes com antecedentes psiquiátricos (psicóticos) ou neurológicos; havendo também referência a alguns casos raros de insónia, facilmente resolúveis evitando as tomas da noite.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram> (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Tonicê Solução Oral

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não conservar acima dos 25°C.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Tonicê Solução Oral

As substâncias ativas são:

Piroglutamato de Deanol..... 0,100 g

P-amino benzoato de magnésio..... 0,300 g

Vitamina C (sob a forma de ascorbato de sódio). 0,200 g

Os outros excipientes são:

Sacarose, Sorbitol a 70%, Sacarina sódica, Álcool a 95%, Nipagin M, Nipazol M, Glicerina, Aroma de mirabela, Ácido cítrico e Água

Qual o aspeto de Tonicê Solução Oral e conteúdo da embalagem

APROVADO EM
05-11-2021
INFARMED

Embalagem com 20 ampolas bebíveis, cada uma contendo 10 ml de solução oral.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Generis Farmacêutica, SA
Rua João de Deus, 19
2700-487 Amadora
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em